




14.10.270.

~~14.10.269~~

~~14.10.269~~

cl. XIV

B. 1. 1



STORIA
NATURALE,
GENERALE, E PARTICOLARE

DEL SIG.
DE BUFFON

INTENDENTE DEL GIARDINO DEL RE,
DELL' ACCADEMIA FRANCESE, E
DI QUELLA DELLE SCIENZE, ec.

Colla Descrizione

DEL GABINETTO DEL RE

DEL SIG.
DAUBENTON

CUSTODE E DIMOSTRATORE
DEL GABINETTO DI STORIA NATURALE.

Trasportata dal Francese.

TOMO XXVI.

IN MILANO. MDCCLXXII.
APPRESSO GIUSEPPE GALEAZZI
REGIO STAMPATORE.
Con licenza de' Superiori, e Privilegio.





LA GIRAFFA (a).

LA Giraffa è uno de' principali, de' più belli, de' più grandi animali, il quale senza essere nocevole, è tutto insieme uno de' più inutili: la sproporzione enorme delle sue gambe, di cui quelle davanti sono una volta più lunghe di quelle di dietro, impedisce l'esercizio delle sue forze, il suo corpo non ha veruna positura, il suo camminare è incerto, i suoi movimenti sono tardi, e stentati: esso non può nè fuggire da' suoi nemici nello stato di libertà, nè adoperarsi pe' suoi padroni

A 2

(a) *Giraffa*, nome derivato da *Giraffa*, *Siraphah*, *Zurnaba*, nome di questo animale in lingua Araba, e che gli Europei hanno adottato di più di due secoli, *Camelopardalis*, in Greco e in Latino. Plinio dà l'etimologia di questo nome composto: *Camelorum*, dic' egli, *aliqua similitudo in aliud transfertur animal*, Nabin, *Æthiopes vocant*, *Collo similem equo*, *pedibus & cruribus bovi*, *Camelo capite*; *albis maculis rutilum colorem distinguuntibus*, unde appellata *Camelopardalis*: *dictatoris Caesaris Circensibus ludis primum visa Romæ*; *ex eo subinde cernitur*, *aspectu magis quam feritate conspicua*: *quare etiam ovis feræ nomen invenit*. Hist. nat. lib. VIII. cap. XVIII.

Giraffa, che gli Arabi dicono *Zurnaba*, e che i Greci e i Latini appellano *Camelopardalis*. Belon, Observ. fenil. 119. fig. ibid. verso.

Camelopardalis, *Camelopardalin sacra litteræ vocant* Zamer. Deuter. 14. *Ubi Chaldaïca translatio habet*

nello stato di domestichezza ; pertanto la specie n'è poco numerosa , ed è sempre stata confinata nei deserti dell' Etiopia e in alcune altre Provincie dell' Africa meridionale e delle Indie . Siccome tai paesi erano incogniti ai Greci , così Aristotile non fa menzione di quell' animale ; ma Plinio ne parla , ed Oppiano (a) lo descrive in una maniera non equivoca . Il *camelopardalis* , dice questo autore , ha qualche somiglianza col cammello ; la sua pelle è *tigrata* come quella della pantera , e il collo è lungo come quello del cammello ; egli ha la testa e le orecchie piccole , i piedi larghi , le gambe lunghe , ma

Deba ; Arabica , Saraphah ; Persica , Seraphah ; septuaginta Camelopardalin . Hieronymus Camelopardum . Gesner , *Hist. quad.* 147. fig. pag. 149. Ubi Legitur , Camelopardalis , icon ex charta quadam nuper impressa Norimbergæ Surnapa novine altitudine ad summum verticem supra quinque orgyas , corniculis duobus ferrei coloris , pilo levi & composito pulchro ; diligenter & probe depictum Constantinopoli & in Germaniam transmissum , an. 1559.

Camelopardalis . Aldrov. *de quad. Bif.* pag. 927. fig. pag. 931.

Camelopardalis . Jonston. , *de quad.* pag. 102. fig. Tab. 39. 40. 45.

Camelopardalis . Prosper Alpin. *Hist. Ægypt. vol. II.* pag. 236. fig. 4. Tab. 14.

Camelopardalis . Cernus cornibus simplicissimis , pedibus anticis longissimis . Linn. *Syst. Nat.* edit. X. p. 66.

(a) Oppiano . *de Venat. lib. III.*

di altezza molto disuguale ; quelle dinanzi sono assai più alte di quelle di dietro, le quali sono assai corte, e pare, che inchinino a terra la groppa dell' animale ; sopra la testa vicino alle orecchie si alzano due escrescenze simili a due piccoli corni diritti ; del resto ha la bocca come un cervo , i denti piccoli , e bianchi , gli occhi brillanti , la coda corta e fornita di peli neri nella estremità . Aggiugnendo a questa descrizione di Oppiano quelle di Eliodoro e di Strabone ; si formerà una giusta idea della giraffa . Gli Ambasciatori di Etiopia , dice Eliodoro , condussero un animale della grandezza d' un cammello , la cui pelle era segnata di macchie vive e di colori brillanti , e le cui parti posteriori del corpo erano troppo basse , e le parti anteriori troppo alte : il collo era sottile , quantunque spuntasse da un corpo molto grosso ; la testa era simile nella forma a quella del cammello , e quanto alla grandezza era appena il doppio più grande dello struzzo ; gli occhi parevano tinti a diversi colori ; l' andatura di questo animale era diversa da quella di tutti gli altri quadrupedi , i quali camminando portano i piedi diagonalmente , cioè il piede dritto dinanzi col piede sinistro di dietro ; laddove la giraffa va d' ambiatura naturalmente portando i due piedi sinistri o i due destri insieme ; è questo un animale così mansueto , che si può condurre ovunque si

voglia con una sottil fune girata intorno alla testa (a). Vi è, dice Strabone, una gran bestia nell' Etiopia, che si chiama *Camelopardalis*, quantunque non abbia somiglianza alcuna colla pantera; perchè la pelle non è segnata alla stessa maniera; le macchie della pantera sono orbiculari, e quelle di questo animale sono lunghe e presso a poco simili a quelle di un cerviatto, il quale ha ancora la livrea: esso ha le parti posteriori del corpo assai più basse delle anteriori; talchè verso la groppa non è più alto di un bue, e verso le spalle ha più di altezza del cammello; a giudicare della sua leggerezza per questa sproporzione non dee esso correre con molta velocità; del rimanente è un animale mansueto, il quale non nuoce, e non si nutre, che d'erbe, e di foglie (b). Il primo de' moderni, che in appresso ha data una buona descrizione della giraffa è Belon. „ Ho veduto, dic' egli, nel castello del Cairo l'animale, che volgarmente si nomina *Zurnapa*; „ i Latini l'appellarono anticamente *Camelopardalis* da un nome composto di leopardo e cammello: perchè è screziato di macchie d'un leopardo, ed ha il collo lungo „ come un cammello, è una bestia assai bella „ di una natura la più dolce, che sia, quasi

(a) Eliodoro, lib. X.

(b) Strabone, lib. XVI. e XVII.

„ come una pecora , e amabile più di ogni
„ altra bestia selvatica ; ha la testa quasi si-
„ mile a quella di un cervo fuorchè nella
„ grandezza , ma con piccole corna spunta-
„ te , per la lunghezza di sei dita , coperte
„ di pelo , ma dove vi è distinzione del ma-
„ schio dalla femmina , quelle del maschio
„ sono più lunghe : ma del resto il maschio
„ e la femmina hanno le orecchie grandi
„ come quelle di una vacca , la lingua di
„ bue e nera ; non hanno denti di sopra al
„ mascellare : il collo è lungo , diritto e
„ sottile ; sottili i crini e rotondi , le gambe
„ parimenti sottili , alte e così basse in die-
„ tro , che pare sembra , che l'animale stia
„ diritto : i piedi sono simili a quelli di un
„ bue ; la coda gli pende fino al di sopra
„ dei garretti , è rotonda e rivestita di peli
„ tre volte più grossi di quelli del cavallo :
„ è molto sottile attraverso del corpo , il pelo
„ è bianco e rosso ; fugge alla stessa guisa
„ del cammello ; quando egli corre , i due
„ piedi anteriori vanno insieme ; si corica
„ col ventre contro alla terra , ed ha una
„ durezza al petto , ed alle cosce come un
„ cammello ; non potrebbe pascolare in ter-
„ ra stando diritto senza allargare grande-
„ mente le gambe dinanzi e tuttavia con
„ gran difficoltà ; per la qual cosa è cre-
„ dibile , che non viva nelle campagne se
„ non di rami di alberi , avendo il collo

„ lungo così, che potrebbe giugnere colla
„ testa all' altezza di una mezza picca (a) „
La descrizione di Gillio mi sembra miglio-
re di quella di Belion. „ Ho veduto (dice
„ Gillio, *cap. IX.*) tre giraffe nel Cairo; han-
„ no esse sopra alla fronte due corni di sei
„ pollici di lunghezza, e in mezzo un tu-
„ becorlo alto due pollici in circa, il quale
„ somiglia a un terzo corno, questo animale
„ ha sedici piedi di altezza quando solleva
„ la testa; il collo solo ha sette piedi, e
„ vi sono ventidue piedi dall' estremità della
„ coda fino all' estremità del naso; le gam-
„ be dinanzi, e di dietro sono a un di presso
„ di eguale altezza, ma le cosce dinanzi
„ sono così lunghe in paragone di quelle di
„ dietro, che il dorso dell' animale pare in-
„ clinato come un tetto; tutto il corpo è
„ segnato di macchie fulve, di figure presso
„ a poco quadrate..... ha il piede forcuto
„ come il bue, il labbro superiore più in-
„ noltrato dell' inferiore, la coda sottile con
„ pelo nell' estremità; ruminava come il bue,
„ mangia similmente l'erba; ha una chioma
„ come il cavallo dalla sommità della testa
„ fino sul dorso; quando cammina, pare che
„ zoppichi non pure delle gambe, ma dei
„ fianchi a destra e a sinistra alternativamen-.

(a) Observations de Belon, pag. 118. recto & verso.

„ te ; e quando vuol pascolare o bere in
 „ terra gli è mestieri allargare incredibilmen-
 „ te le gambe dinanzi. „

Gesner cita Belon per aver detto, che le corna cadono alla giraffa, come alla damma (a). Io protesto, che non ho potuto trovar questo fatto in Belon ; si vede, ch' egli qui dice soltanto, che le corna della giraffa sono rivestite di pelo ; e non parla di questo animale se non in un altro sito (b) all' occasione della damma *axis*, dove egli dice che „ la giraffa ha il campo bianco, e le „ macchie fenicee sparse per di sopra, assai „ larghe, ma non rosse come l' *axis* „. Non dimeno questo fatto, che non ho trovato in verun luogo, sarebbe uno de' più importanti per decidere della natura della giraffa ; perchè se le sue corna cadono ogni anno, ella è del genere dei cervi, ed al contrario, se le corna sono permanenti è di quello de' buoi o delle capre ; senza questa cognizione precisa non si può assicurare, come fanno i nostri Nomenclatori, che la giraffa sia del genere dei cervi, ed è cosa troppo strana, che Hasselquist, il quale ha data recentemente una lunghissima, ma sterilissima descrizione di questo animale, non ne abbia indicata la na-

A 5

(a) *Giraffis Et Damis cornua cadunt*, Belonius.
 Gesner, *Hist. quad.* pag. 148.

(b) *Observations de Belon*, pag. 120. *recto*.

tura, e che dopo di avere inzeppati metodicamente, cioè da scolaro, cento piccoli caratteri inutili non dica una parola della sostanza de' corni, e ci lasci ignorare se questi siano solidi o cavi, se cadano o no; se in una parola siano corni o legni. Io qui riferisco questa descrizione di Hasselquist (a) non per l'utilità, ma per la singolarità, e al tempo stesso per istimolare i Viaggiatori a servirsi de' loro lumi, e non rinunziare agli occhi loro per prendere l'occhialeto dagli altri: è necessario di premunirli contro l'uso di tai metodi, coi quali si ommette di ra-

(a) *Cervus camelopardalis*. Caput prominens, labium superius crassum, inferius tenue, nares oblongae, amplae, pili rigidi, sparsi in utroque labio anteriori & ad latera. Supercilia rigida, distinctissima, serie una composita. Oculi ad latera capitis, vertici quam rostro, ut & fronti quam collo propiores. Dentes, lingua, cornua simplicissima, cylindrica, brevissima, basi crassa in vertice capitis sita, pilosa basi pilis longissimis rigidis tecta, apice pilis longioribus erectis rigidissimis, apicem longitudine superantibus cincti. Apex cornuum in medio horum pilorum obtusus nudus. Eminentia in fronte, infra cornua, inferius oblonga humilior, superius elevatior, subrotunda, pistice parum depressa, inaequalis. Auricula ad latera capitis infra cornua pone illa posita. Collam erectum, compressum, longissimum, versus caput angustissimum, inferius latiusculum. Crura cylindrica anterioribus plus quam dimidio longioribus, Tuberculum crassum, durum in genuflexum. Ungues bisulci, angulati. Pili brevissimi universum corpus, caput & pedes tegunt.

gionare, e tanto più altri credesi letterato, quanto ha meno di spirito. Infatti abbiamo forse approfittato dopo di essersi annojati a leggere questa enumerazione di piccoli caratteri equivochi, inutili? E le descrizioni degli Antichi e dei Moderni, che abbiamo qui sopra citate non formano esse dell' animale, di cui si tratta, un' immagine più sensibile, ed idee più chiare? Alle figure appartiene supplire a tutti questi piccoli caratteri, e il discorso debb' essere riservato per gli grandi: una sola occhiata sopra una figura insegna più che una simile descrizione, la

A 6

Linea pilis rigidis longioribus per dorsum a capite ad caudam extensu Cauda teres, lumborum dimidia longitudine, non jubata. Color totius corporis, capitis ad pedum ex maculis fuscis & ferrugineis variegatum. Macula palmari latitudine, figurâ irregulari, in vivo animali ex lucidiori & obscuriore variantes. Magnitudo cameli minoris, longitudo totius a labio superiore ad finem dorſi spith. 24. Longitudo capitis spith. 4. Colli spith. 9. ad 10. pedum anter. spith. 11. ad 13. poster. spith. 7. ad 8. longit. cornuum vix spithamalis. Spatium inter cornua spith. $\frac{1}{2}$, longit. pilorum in dorso poll. 3., latitud. capitis juxta tuberculum vel eminentiam spith. $\frac{1}{2}$, prope maxillam spith. 1., colli utrinque prope caput spith. 1., in medio spith. 1 $\frac{1}{2}$, ad basin spith. 2. ad 3., latitud. Lat. abd. antierius spith. 4., poster. spith. 6. ad 7. Crassities pellis ut corii cervi vulgari Descriptio antecedens juxta pellem animalis factam, animal vero nudum vidi. Voyage d' Hasselquist. Rostock, 1762.

quale diventa tanto meno chiara, quanto è più minuta, massimamente non essendo accompagnata dalla figura, la qual sola può sostenere l'idea principale dell'oggetto in mezzo di tutti questi tratti variabili, e di tutte queste piccole immagini, le quali giovano piuttosto ad oscurarli, che a rappresentarli.

Fu trasmesso quest'anno (1764.) all' Accademia delle Scienze un disegno, e una relazione della giraffa, per cui si assicura, che questo animale, che si credeva particolare all' Etiopia (a) si trova pure nelle terre vicine al capo di Buona-Speranza; avremmo noi ben desiderato, che il disegno fosse stato un po' meglio delineato, ma non è, che uno schizzo informe, di cui non si può fare alcun uso. Quanto alla relazione, siccome essa contiene una specie di descrizione, abbiamo creduto di doverla qui riferire. „ In un viag-

(a) La giraffa trovasi solo nell' Etiopia. Ne ho vedute due nel palagio del Re, che n' erano addomesticate. Osservai, che quando volevano bere, e che loro si porgeva acqua o latte per giugnervi conveniva, che allargassero le gambe, altrimenti ficcome queste bestie sono troppo alte dinanzi, non potevano bere quantunque avessero il collo assai lungo. Ho veduto cogli occhi miei quanto qui riferisco. *Relation de Thevenot, pag. 10. de la description des animaux, &c. de Cosmas le Solitaire.*

„ gio, che si è fatto nel 1762. a due cento
„ leghe nelle terre al nord del capo di Buona-
„ speranza, si trovò il camelopardalis, il
„ cui disegno si è qui aggiunto; esso ha il
„ corpo simile a un bue, e nella testa e nel
„ collo somiglia il cavallo. Tutti quelli
„ che sonosi incontrati sono bianchi con mac-
„ chie brune. Ha due corni lunghi un pie-
„ de sul capo, ed ha le zampe divise. I due
„ che si sono uccisi, e la cui pelle è stata
„ mandata in Europa sono stati misurati,
„ come siegue: la lunghezza della testa un
„ piede otto pollici; l'altezza dell'estremità
„ del piede dinanzi fino al garrot, dieci
„ piedi; e dal garrot fino al disopra della
„ testa sette piedi, in tutto diciassette piedi
„ di altezza; la lunghezza dal garrot fino
„ ai reni è di cinque piedi sei pollici;
„ quella dai reni fino alla coda d'un piede
„ sei pollici; così la lunghezza del corpo
„ intero è di sette piedi, l'altezza dai piedi
„ di dietro fino ai reni è di otto piedi
„ cinque pollici. Egli pare, che questo ani-
„ male non possa essere di nessun servizio con-
„ siderata la sproporzione dell'altezza, e
„ della lunghezza; si alimenta di foglie degli
„ alberi più alti; e quando esso vuol bere
„ o prendere qualche cosa da terra, convie-
„ ne che s'inginocchi „.

Cercando ne' Viaggiatori ciò che hanno
detto della giraffa, gli ho trovati concordi

in fra di loro ; convengono tutti che può giugnere colla testa a sedici , o diciassette piedi (a) di altezza essendo nella sua postura naturale , cioè posata su quattro piedi ; e che le gambe dinanzi sono una volta più alte di quelle di dietro , tal che quando è assisa sulla groppa , pare che sia del tutto diritta (b) : convengono pure , che

(a) Prospero Alpino è il solo , che pare dia un' idea diversa della grandezza di questo animale paragonandolo a un piccolo cavallo. Anno 1581. *Alexandriae vidimus Camelopardalem quem Arabes zurnap & nostri giraffam appellant ; hæc equum parvum elegantissimumque representare videtur* , pag. 236. È probabile , che questa giraffa veduta da Prospero Alpino fosse assai giovane , e non avesse ancora acquistato tutto il suo aumento ; lo stesso è di quella , di cui Hasselquist ha descritto la pelle , e che paragona per la grandezza a un piccolo cammello .

(b) La giraffa ha i piedi anteriori della metà più alti di quelli di dietro , ed ha il corpo sottile , diritto , e lungo ; però è alta assai ; ha la testa quasi simile a quella del cervo , se non che i suoi piccoli corni spuntati non hanno che un mezzo piede di lunghezza ; le sue orecchie come quelle di una vacca , e non ha denti al di sopra delle mascelle ; i crini sono rotondi , e sottili , le gambe gracili e simili a quelle di un cervo , e i piedi a quelli d'un toro ; ella ha il corpo assai sottile , e il colore del pelo somiglia a quello di un lupo cerviero ; del resto la maniera d'agire è simile assai a quella del cammello . *Voyage de Villamont* . Lyon , 1620. , pag. 688. — Ho vedute due giraffe nel castello del Cairo , esse hanno il

a motivo di questa sproporzione non possa correre velocemente; ch'ella è di un naturale dolcissimo, e che per questa qualità come per tutte le altre abitudini fisiche, e parimente per la forma del corpo si accosta più alla figura e alla natura del cammello, che d'ogn' altro animale: ch'ella è del numero de' ruminanti, e ch'ella manca come quelli dei denti incivi alla mascella superiore; e si vede per testimonio di alcuni, che si trova nelle parti meridionali dell' Africa (a) siccome in quelle dell' Asia.

Egli è manifesto da tutto ciò, che abbiamo esposto, che la giraffa è di una specie

collo più grande del cammello, due corni di mezzo piede sopra la testa, un piccolo in fronte; le due gambe dinanzi grandi ed alte, e le due di dietro corte. *Cosmographie du Levant, par Thevet. Lyon, 1554. pag. 142.*

- (a) Nell' isola di Zanzibar nei contorni di Madagascar vi è una certa specie di bestia, che appellano *Graffe* o *Giraffe*, che ha il collo assai lungo quasi nove piedi, di cui le gambe dinanzi sono assai più lunghe di quelle di dietro; ha una piccola testa e di diversi colori, come pure il corpo; questa bestia è assai mansueta e domestica, che non nuoce a nessuno. *Description des Indes orientales, par Marc Paul. Paris, 1556. liv. III. pag. 116.* — *Girafa animal adeo sylvaticum ut raro videri possit homines videns in fugam fertur-tametsi non sit multa velocitatis.* Leon Afric. Descript. Afr. vol. II. pag. 745.

unica, e differentissima da ogni altra; ma se si volesse rassomigliarla ad altro animale, saria questo piuttosto il cammello, che'l cervo o il bue: è vero, che ha due piccoli corni, e che il cammello non ne ha: ma ha tante altre somiglianze con questo animale, ch'io non sono sorpreso, che alcuni Viaggiatori gli abbiano dato il nome di cammello delle Indie. Altronde s'ignora di quale sostanza sieno i corni della giraffa, e in conseguenza se per questa parte si accosti più ai cervi, che ai buoi, e forse non sono essi nè di legno come quelli dei cervi, nè cavi come quelli dei buoi e delle capre. Chi sa se non sieno essi composti di peli uniti come quelli dei rinoceronti, o se non sieno di una sostanza e di una tessitura particolare? mi è sembrato, che ciò che ha mosso i Nomenclatori a mettere la giraffa nel genere dei cervi sia 1.^o il preteso tratto di Belon citato da Gesner (a), il quale farebbe in fatti decisivo se fosse reale: 2.^o mi pare, che sienosi male interpretati gli Autori, o mal intesi i Viaggiatori quando hanno parlato del pelo di questi corni: si è creduto, che avessero voluto dire, che i corni della giraffa fossero pelosi, come i nuovi corni del cervo, e da ciò si è concluso, che fossero della stessa na-

(a) Gesner, *Hist. quad.* pag. 148. *linca antepennulina*.

tura; ma si vede al contrario per le note sopra citate; che questi corni della giraffa sono solamente circondati e soverchiati di grandi peli aspri, e non rivestiti da una lanugine, o da un velluto, come le nuove corna del cervo; e ciò è che potrebbe indurre a credere, che sieno composte di peli uniti presso a poco come quelli del rinoceronte; la loro estremità, la quale è spuntata, favorisce ancora questa idea: e se si riflette, che in tutti gli animali, che hanno legni in vece di corni, come le alci, i renni, i cervi, le damme e i capriuoli, tai legni sono sempre divisi in rami o cornicini, e che al contrario i corni della giraffa sono semplici, e non hanno che un tronco solo; di leggieri sarà persuaso, che non sono della stessa natura, senza di cui l'analogia sarebbe qui del tutto violata. Il tubercolo in mezzo della testa, il quale, secondo i Viaggiatori, pare, che formi un terzo corno appoggia questa medesima opinione: gli altri due che non sono acuti, ma spuntati nella estremità, non sono per avventura, che tubercoli simili al primo, e soltanto più rilevati: le femmine, dicono tutti i Viaggiatori, hanno le corna come i maschi, ma un po' più piccole: se la giraffa fosse in realtà del genere dei cervi, l'analogia si smentirebbe anche qui, perchè fra tutti gli animali di questo genere, non vi è

che la femmina del renne, che abbia un legno; tutte le altre femmine ne sono senza, e ne abbiamo data la ragione. Per altra parte siccome la giraffa a cagione dell' eccessiva altezza delle gambe non può pascere l'erba, che con pena, e difficoltà; e siccom' ella si nudrisce principalmente, e quasi unicamente di foglie, e di bottoni di alberi, si dee presumere, che i corni, i quali sono l'avanzo il più apparente del superfluo del nutrimento organico partecipino della natura di tale alimento, e siano in conseguenza di una sostanza analoga al legno, e simile a quella del legno di cervo. Il tempo confermerà l'una e l'altra di queste conghietture. Una parola di più nella descrizione di Hasselquist altronde così minuta, avrebbe sgombrate queste dubbiezze, e determinato chiaramente il genere di questo animale. Ma gli scolari i quali non hanno che la solfa del loro maestro in capo, o piuttosto nella faccoccia, non possono schifare dei difetti, degli errori, delle omissioni essenziali, perchè rinuanziano allo spirito, che dee essere di scorta ad ogni Osservatore, e non veggono che con un metodo arbitrario e difettoso, il quale non fa che impedirli a riflettere sulla natura, e su i rapporti degli oggetti, che incontrano, e di cui non fanno che formare la descrizione su un cattivo modello. Siccome nel reale tutto è differente l'uno dall' altro, così tutto

debb' essere ancora trattato diversamente ; un solo gran carattere ben colpito decide talora, e spesso giova più per la cognizione della cosa, che mille altri piccoli indizj : se sono in gran numero, diventano necessariamente equivochi e comuni, e in tal caso sono almeno superflui se non sono nocevoli alla cognizione reale della Natura, la quale si ride delle formole, sfugge ad ogni metodo, e non può essere ravvilata, che dalla immediata osservazione dello spirito, nè colta mai che da un colpo d'occhio del genio.



I L L A M A (a)

E

I L P A C O (b).

VI è esempio in tutte le lingue, che si danno talvolta al medesimo animale due nomi diversi, l'un de' quali si riferisce

(a) *Lama*, *Lbama*, *Glama*, nome che gli Spagnuoli hanno dato a questo animale del nuovo Mondo, e che noi abbiamo adottato. Lo chiamano pure nel Perù *Huanacus*, *Guanaco*, *Cornera de tierra*, montone di terra; *Guanapo*, secondo Gentil, *Tom. I. pag. 94.*, *Wianaque*, secondo Wood, *voyage de Dampier, Tom. V. pag. 181.* Altre volte si appellava nel Messico, *Pelon ichiatl Oquitli*; e nel Chily, *Hueque Cbillebueque*, cioè, *Hueque del Chily*, perchè i primi Viaggiatori dell' America scrivevano *Chillé* per *Chily*. Gl' Inglese hanno indicato il Lama colla denominazione di *Peruichcattle*, cioè *bestiame del Perù*. Mattiolo gli ha dato il nome composto d' *Elaphocamelus*, Camello-cervo.

Pelon ichiatl Oquitli, ovis Peruana. Hernand. *Hist. Max. pag. 660. fig. ibid.*

Ovis Peruana. Marcgrav. *Hist. nat. Brasil. pag. 243. fig. ibid.*

Lama. Voyage de Frézier, *pag. 138. fig. ibid.*

Camelus pilis brevissimis vestitus Camelus Peruanus, il Camello del Perù. Brisson, *Regn. animal. pag. 56.*

Glama. Camelus dorso laevi, topbo pectorali. Linn. *Syst. nat. Edit. X. pag. 65.*

(b) *Paco*, *Pacos*, nome di questo animale nel suo

al suo stato di libertà, e l'altro a quello di domestichezza: il cignale e il porco non sono che un animale, e questi due nomi non sono relativi alla differenza della natura, ma a quella della condizione di questa specie, una parte di cui è sottomesa all' uomo, e l'altra è indipendente. Lo stesso è dei lama, e dei Paco, i quali erano i soli animali domestici (a) degli antichi Americani. Questi nomi sono quelli dello stato loro di domestichezza: il lama selvatico si appella *huanacus* o *guanaco*, e il paco selvatico *vicuna* o *vigogna*. Ho creduta necessaria questa riflessione per evitare la confusione dei nomi.

pacse nativo nel Perù, e che noi abbiamo adattato: si chiama pure *Vigogne*, nome derivato da *Vicuna*, altro nome di questo animale nello stesso paese.

Ovis Peruana alia species ab incolis Pacos dicta.
Hernand. *Hist. Mex.* pag. 663.

Ovis Peruana, Paco dicta. Marcgr. *Hist. nat. Bras.*
pag. 244. fig. ibid.

Alpaque. Voyage de Frezier, pag. 139.

Camelus pilis prolixis corpore vestitus, la Vigogne.
Britton, *Regn. anim.* pag. 57.

Pacos Camelus tophis nullis, corpore lanato. Linn.
Syst. nat. Edit. X. pag. 66.

(a) Prima dell' arrivo degli Spagnuoli, gl' Indiani del Perù non conoscevano altri animali domestici, che il Pacos e gli Huanacus; ma traevano vantaggio dai selvaticchi, che erano in maggior numero, con grandi caccie. *Histoire des Indes*, pag. 265.

Questi animali non si trovano nell' antico continente, ma appartengono solo al nuovo; amano essi pure alcuni paesi, fuori dell' estensione de' quali non se ne trova nessuno; sembrano attaccati alla catena delle montagne, che si stende dalla nuova Spagna fino alle terre Magellaniche; abitano essi le regioni più elevate del globo terrestre, e sembrano aver bisogno per vivere di respirare un' aria più viva e più leggiera di quella delle nostre montagne.

Egli è ben singolare, che quantunque il lama, e il paco sieno domestici nel Perù, nel Messico, nel Chili, come lo sono i cavalli in Europa o i camelli in Arabia, noi li conosciamo appena, e che da più di due secoli, che gli Spagnuoli regnano in que' vasti paesi, ninno de' loro autori non abbia pubblicata la storia dettagliata, e la descrizione esatta di questi animali, di cui si servono tutto dì: essi pretendono, che non si possano trasportare in Europa, nè farli calare dalle loro alture senza perdergli o almeno senza rischio di vedergli al termine di breve tempo perire: ma nel Quito, a Lima, e in molte altre Città, in cui sono Letterati si farebbono potuti delineare, descrivere, e anatomizzare. Herrera (a) dice poco di questi animali;

(a) Si trova nelle montagne del Perù una specie di cammello, della cui lana si servono per fare

Garcilasso (a) non ne parla che in seguito agli altri ; Acoſta e Gregorio di Bolivar ſono quelli , che hanno radunata maggior copia di fatti ſopra l'utilità e i ſervigj che preſtano i lama e ſopra il lor naturale ; ma non ſi ſa ancora come ſieno formati interiormente , quanto tempo portino i figlj ; ſi ignora ſe queſte due ſpecie ſieno aſſolutamente ſeparate , ſe non poſſano miſchiarſi , ſe non vi ſiano razze intermedie fra di loro , ed altre coſe aſſai , che farebbono neceſſarie per rendere compinta queſta ſtoria .

Comechè ſi pretenda , che periscaſco quando ſi allontanano dal lor paefe nativo , è tut-

delle trafile . *Description des Indes occidentales , par Herrera . Amſt. 1622. pag. 244.*

(a) Il P. Blas Vallera dice , che il beſtiamе del Perù è sì manſueto , che i fanciulli ne fanno cìd , che vogliono : ve ne ha de' grandi , e de' piccoli , gli huanacus domeſtici (*Lamas*) ſono di diverſi peli , e i ſelvatichi ſono tutti baj bruni : queſti animali ſono dell' altezza dei cervi , e ſomigliano ai cammelli , fuori di quelli , che non hanno gobba ; il loro collo è lungo e terſo Lo ſteſſo beſtiamе ch' eſſi chiamano *Pacolamo* [*Paco*] , non è tanto pregiato Queſti paco più piccoli degli altri ſomigliano ai vicuna ſelvatichi , e ſono aſſai delicati , hanno poco di carne , e poco di lana ſommamente fina . Queſto animale ſerve in molte guiſe alla Medicina ſiccome molti altri animali di queſto paefe , come lo nota il P. Acoſta . *Histoire des Incas , Tom. II. pag. 260. juſqu' à 266.*

tavia certo, che ne' primi tempi dopo la conquista del Perù, e parimente ancora molto tempo dipoi si sono trasferiti alcuni lama nell' Europa. L'animale di cui parla Gesner sotto il nome di *Allocamelus*, e di cui dà la figura, è un lama, che fu condotto vivo dal Perù nell' Olanda nel 1558. (a), è lo stesso di cui Mattiolo (b) fa menzione sotto il nome di *Elaphocamelus*, e la descrizione, che ne dà, è fatta con diligenza. Sono si trasferite

(a) *Allocamelus* Scaligeri, apparet esse hoc ipsum animal cujus figuram proponimus ex charta quadam typis impressa mutuati cum hac descriptione. Anno Domini 1558. Junii die 19. animal hoc mirabile Mittelburgum Selandiae advectum est, antehac a principibus Germaniae nuquam visum, nec a Plinio aut antiquis aliis scriptoribus commemoratum. Ovem indicam esse dicebant è Piro [forte Peru] regione, sexies mille milliaribus fere Antuerpia distante. Altitudo ejus erat pedum sex, longitudo quinque: collum cigneo colore candidissimum. Corpus [reliquum] rufum vel puniceum. Pedes ceu struthocameli, cujus instar urinam quoque retrò reddit hoc animal [erat autem mas annorum etatis quatuor]. Gesner, *Hist. quadrup.* pag. 149. & 150.

(b) Longitudo totius corporis a cervice ad caudam 6. pedum erat: altitudo a dorso ad pedis plantam 4. tantum. Capite, collo, ore, superioris praesertim labii scissura ac genitali cam-lum fere refert; at caput oblongius est: aures habet cervinas, oculos bubulos, quin etiam ut ille anterioribus dentibus in superiore maxilla caret, sed molares utrinque habet; ruvinat, dorso est sensim prominente, sca-

sferite più di una volta delle vigogne, e fors'anche dei lama nella Spagna per tentare di naturizzarli (a): si dovrebbe adunque avere maggior contezza, di quella che si abbia sulla natura di questi animali, che potrebbero divenire utili per noi; perchè è probabile, che fiorirebbero così bene su i nostri Pirenei e sulle nostre Alpi (b), come sopra le Cordigliere.

Il Perù, secondo Gregorio di Bolivar, è
Tom. XXVI. B

pulis prope collum depressis, lateribus tumidis, ventre lato, clunibus altioribus & cauda brevi spithamæ fere longitudine; quibus omnibus ceruon fere refert, quemadmodum etiam cruribus præsertim posterioribus; pedes illi bisulci sunt; diducta anteriori parte diuisura. Ungues habet acuminatos qui circa pedis ambitum in cutem crassam abeunt, nam pedis planta, non ungue sed cuti, ut in multitudine & ipso camelo contegitur: retromingit hoc animal ut camelus & testes substrictos habet: pectore est amplo sub quo ubi thorax ventri conneditur, extuberat globus ut in camelo, vomica similis e quo nescio quid excrementi sensim manare videtur. P. And. Matthioli, Epist. lib. V.

(a) Il Re di Spagna ordinò, che si trasportassero delle vigogne nella Spagna, per farle moltiplicare nel paese; ma questo clima si trovò poco opportuno a questi animali, che tutti vi morirono. *Hist. des Avent. Elibustiers par Oexmelin, T. m. II. pag. 367.*

(b) Non v'è animale, che ammini tanto sicuramente come il lama sulle rupi, perchè si attacca con una specie di sperone, che ha naturalmente al piede. *Voyage de Coréal, T. I. p. 352.*

il paese nativo, la vera patria dei lama : si conducono da vero in altre provincie, come nella nuova Spagna, ma piuttosto per curiosità, che per vantaggio; laddove in tutta l'estensione del Perù dal Potosì fino a Caracas, questi animali sono in grandissimo numero; sono pure necessarissimi, essi soli formano tutta la ricchezza degl' Indiani, e contribuiscono assai a quella degli Spagnuoli. La loro carne è buona da mangiarsi, il loro pelo è una lana fina di un eccellente uso, e per tutta la loro vita servono costantemente a trasportare tutte le vettovaglie del paese; il loro carico ordinario è di cento cinquanta libbre, e i più forti ne portano fino due cento cinquanta; fanno essi viaggi lunghi assai in paesi impraticabili a tutti gli altri animali; camminano lentamente, e non fanno che quattro o cinque leghe per giorno; la loro andatura è grave e ferma, il loro passo accertato; discendono da burroni precipitosi, e poggiano su balze scoscese, dove gli uomini non possono accompagnarli; d'ordinario camminano quattro o cinque giorni seguiti, dopo cui vogliono riposare, e da se stessi si dimorano per ventiquattro o trent' ore prima di rimettersi in cammino. Si adoperano molto nel trasporto delle materie preziose, che si estraggono dalle miniere del Potosì: Bolivar dice, che a' suoi tempi se ne impiegavano tre cento mila in questo lavoro.

Il loro aumento è assai presto, e la lor vita non è molto lunga; sono essi in istato di produrre a tre anni, sono di pieno vigore fino ai dodici, quindi incominciano a declinare, tal che ai quindici sono affatto estenuati. Il loro naturale par modellato su quello degli Americani; sono mansueti e flemmatici, e fanno tutto con peso e misura. Quando viaggiano e fermare si vogliono per qualche momento, piegano le ginocchia colla maggior precauzione, e chinano il corpo in proporzione perchè non cada la loro carica o si scomponga; e tosto che ascoltano il fischio del lor condottiere, si rialzano colle medesime precauzioni e si rimettono in cammino: pascolano in viaggiando l'erba dovunque la trovino, ma non mangiano mai di notte, quand' anche avessero digiunato il giorno; imbiegano essi questo tempo a ruminare; dormono appoggiati sul petto, e coi piedi ripiegati sotto il ventre, e ruminano in questa positura. Quando si opprimono col travaglio, e che una volta caddero sotto il peso, non v'è mezzo da farli rialzare; si percuotono in vano; l'estremo rimedio è di strigner loro i testicoli; e sovente ciò ancora riesce vano; si ostinano essi a restare nel luogo stesso dove sono caduti; e se si seguita a maltrattarli, si disperano e si ammazzano percuotendo la terra a destra e a sinistra col capo. Non si difendono essi

nè co' piedi, nè co' denti, e non hanno per costì dire altr' armi fuori di quelle dell' ira; spuntano in faccia a quelli, che gl' insultano, e si pretende, che questa saliva che spargono nella collera sia acre e mordente a segno di far alzare delle vescichette sopra la pelle.

Il lama è alto quattro piedi in circa, e il suo corpo compreso il collo e la testa ne ha cinque o sei di lunghezza; il collo solo ne ha quasi tre piedi. Questo animale ha la testa ben fatta, gli occhi grandi, il muso un po' allungato, i labbri grossi, il superiore fesso e l' inferiore un po' pendente; manca dei denti incisivi e canini nella mascella superiore. Le orecchie sono lunghe quattro pollici, le porta innanzi, le dirizza e move con facilità. La coda è lunga otto pollici appena; è diritta, sottile e un po' rilevata. I piedi sono forcuti come quelli del bue, ma sono soverchiati da uno sperone in dietro, che ajuta l' animale a trattenerfi e ad attaccarsi nei passi scabrosi: è coperto d' una lana corta sul dorso, sulla groppa e sulla coda, ma lunga assai sopra i fianchi e sotto il ventre: del resto, i lama variano nei colori: ve n' ha di bianchi, di neri e di misti (a)

(a) I lama hanno la testa piccola a proporzione del corpo simile in qualche cosa a quella del cavallo e del montone; il labbro superiore, come quello della lepre è diviso nel mezzo, con esso

Il loro sterco è simile a quello delle capre ; il maschio ha il membro genitale sottile e curvo talchè orina all' indietro . E' un animale lascivissimo (a), e che tuttavia stenta a congiugnerli . La femmina ha l'orificio delle

B 3

sputano dieci passi lontano contro quelli , che li molestano , e se questo sputo cade sul volto , fa una macchia rossiccia , dove si forma spesso una galla : hanno il collo lungo , curvato al basso come i cammelli appena nati , e molto somigliano ad essi ; hanno una gobba sul dorso ; la loro altezza è circa quattro piedi e mezzo ; camminano colla testa alta , e d' un passo così regolato , che il batterli non giova ad affrettarli : non vogliono camminare di notte colla soma , si scaricano ogni sera per lasciarli mangiare : mangiano poco , e giammai gli si dà a bere , hanno il piede forcuta come i montoni , ed uno sperone al di sopra , che rende loro il piede sicuro per le rupi ; la loro lana ha un odor forte , è lunga , bianca , bigia e rossa a macchie e molto bella , quantunque assai inferiore a quella delle vigogne . *Voyage de Frezier , pag. 138.*

(a) *Salacissimum hoc esse animal id mihi conjecturam facit , quod cum sui generis femellis sit destitutum , magnâ cum prurigne capris se commisceat , non tamen erectis ut alias capræ hirco ascendente solent sed humi ventre accubantibus , ita cogente animuli anterioribus cruribus . Itaque super ascendens coit , non autem averfis clunibus . Adeo venere , vernali , autumnalique tempore , stimulatur hoc animal ut illud viderim humile quoddam præsepium avenâ refertum conscendisse , genitaleque illi magno cum murmure tamdiu confricasse quo usque semen redderet , plurimis unâ horâ replicatis vicibus . Non tamen concepere capræ hujusce animalis semine refertur . Matthioli . Epist. lib. V.*

parti della generazione piccolissimo; essa si prostra ad aspettare il maschio, e sospirando lo invita; ma passano sempre più ore e talvolta un giorno intero prima che possa l'uno godere dell'altra, e tutto questo tempo si passa in gemere, garrire e principalmente in sputarsi addosso: e siccome questi preludj gli stancano più che la cosa stessa, si porge loro la mano per finirla, e si ajutano a collocarsi. Non producono d'ordinario che un parto, e rarissimo due. La madre non ha che due poppe, e il parto la siegue appena nato. La carne de' giovani è buonissima da mangiarsi, quella de' vecchi è arida e dura: in generale quella dei lama domestici è migliore di quella dei selvatici, e la loro lana è pure assai più dolce. La loro pelle è assai soda: gl' Indiani ne facevano la caccia, e gli Spagnuoli l'usano in fare delle armature. Questi animali sì utili, ed anche sì necessari ne' paesi ch'essi abitano non costano nè mantenimento, nè cibo: siccome hanno il piede forcuta, non è necessario di ferrarli; la lana grossa di cui sono coperti non ha mestieri di essere battuta; non hanno essi bisogno nè di grano, nè di arena, nè di fieno; l'erba verde, che pascolano da se stessi è per loro sufficiente, e non ne mangiano che poco (a);

(a) La pelle degli huanacus è dura: gl' Indiani la preparavano con sevo per ammorbidirla, e ne facevano le femmine delle scarpe; ma siccome

sono ancora più sobri nel bere; si abbeverano della loro saliva, la quale in questo animale è più abbondante che in ogni altro.

L'huanacus o lama nello stato di natura è più forte, più vivo e più leggiere del lama domestico; corre come un cervo, e rampica come le camozze sulle sbalze più discoscese; la lana è meno lunga e tutta di color fulvo. Quantunque in piena libertà questi animali si uniscono in truppa, e sono talvolta due o trecento insieme; quando scoprono alcuno guardano con maraviglia senza dar sulle prime contrassegno nè di timore, nè di piacere; in appresso soffiano dalle nari,

B 4

questo cuojo non era pulito, si scalzavano in tempo di pioggia. Gli Spagnuoli ne fanno delle belle armature di cavallo: usano questi animali, come facevano gl' Indiani pel trasporto delle loro mercatanzie. Il loro viaggio più ordinario è dal Cozer fino al Potosì, d'onde si contano due cento leghe in circa, e la loro giornata è di tre leghe, perchè essi vanno lentamente, e se si fanno camminare più del loro consueto, si lasciano cadere senza che sia possibile farli alzare, anche scaricandoli, talchè si scorticano sul posto.... Quando camminano recando mercatanzie, vanno in truppe, e se ne lasciano sempre quaranta o cinquanta scarichi per caricarli tosto che se ne scorge alcuno affaticato.... La carne di questo animale è perfetta, perch' ella è sana e di buon sapore, sopra tutto quella dei giovani di quattro o cinque mesi di età.... Quantunque questi animali sieno numerosi, non costano quasi

e nitriscono presso a poco come i cavalli, e finalmente prendono la fuga tutti insieme verso la sommità delle montagne; preferiscono le parti del nord ed i paesi freddi; si arrampicano e soggiornano spesso al di sopra della linea delle nevi; viaggiando ne' ghiacci, e sotto alle brine stanno meglio che nella regione temperata; quanto sono numerosi e forti nei Sierras, che sono le parti elevate delle Cordigliere; tanto sono rari e stenuati nei Lanos, i quali sono al di sotto. Si fa caccia di questi lama salvatici per tostarli; i cani difficilmente li seguono; e se si dà loro tempo di guadagnare le rupi, il cacciatore e i cani sono costretti abbandonarli,

nulla al padrone pel vitto e pel mantenimento del loro arredo, perchè dopo la giornata si scaricano per lasciarli pascolare per la campagna; non è necessario ferrarli, perchè hanno il piede forcuta, nè imbastarli, perchè hanno lana sufficiente per non essere molestati dalla carica, e perchè il Veturale ha diligenza di riporla in guisa, che non la portino sulla spina del dorso, il che li farebbe morire.... I condottieri si accampano sotto le tende senza entrare nelle città per lasciarli pascolare; spendono quattro mesi interi per fare il viaggio da Cozer a Potosì, due per andare e due per ritornare.... I migliori lama si vendono a Cozer diciotto ducati ciascuno, e gli ordinarj dodici o tredici. La carne degli huanacus salvatici è buona, ma nondimeno è inferiore a quella dei domestici. *Histoire des Incas, Tom. II. pag. 260. & suiv.*

Pare ch' essi temano il peso dell'aria come il calore ; non se ne trovano mai nelle terre basse ; e come la catena delle Cordigliere, che è elevata più di tre mila pertiche al di sopra del livello del mare nel Perù si sostiene presso a poco a questa stessa elevazione nel Chili, e fino alle terre Magellaniche, così vi si trovano degli huanacus o lama selvatici in gran numero (a) ; laddove dalla parte della nuova Spagna, dove questa catena di montagne si abbassa considerabilmente non se ne trova più, e non si vedono che i lama domestici che si conducono.

I paco o vigogne sono una specie succursale ai lama presso a poco come l'asino lo è al cavallo ; sono essi più piccoli, e meno

B 5

(a) Nelle terre del Porto-desiderato a qualche distanza dallo stretto di Magellano vi era buon numero di queste bestie selvatiche o pecore selvatiche, che g' i Spagnuoli appellano *Wianagues*... Quantunque fossero molto accorte e paurose assai, ne abbiamo uccise sette nel tempo del nostro soggiorno, e si può dire che la loro lana sia la più fina, che v'abbia al mondo.... Elle vanno in truppe di sei o sette cento, e tosto che scoprono alcuno, ruotano colle loro nari, e nitriscono come cavalli *Voyage de Wood. Suite des voyages de Dampier, Tom. V. pag. 131.* — Si vedono nel Tucuman, provincia vicina al Perù, delle grosse pecore, che servono da bestie da soma, e la cui lana è fina quasi come la seta. *Voyage de Woodes Rogers, Tom. II. pag. 65.*

atti a servire , ma più utili per la spoglia loro ; la lana fina e lunga , onde sono ricoperti è una mercatanzià di lusso così cara e preziosa come la seta : i paco , che si chiamano pure *alpaques* , e che sono le vigogne domestiche sono spesso tutte nere , e talvolta d'un bruno misto di fulvo . Le vigogne opacselvatiche sono del colore della rosa secca , e questo color naturale è così talmente stabile e fisso , che non si altera punto sotto la mano dell' artefice ; si fanno de' bellissimi guanti e buonissime calze con questa lana di vigogna , si fanno pure delle eccellenti coperte , e dei tapeti di grandissimo valore . Questa sola derrata forma un ramo nel commercio delle Indie Spagnuole : il castoro del Canada , la pecora di Calmuchia , la capra di Siria non somministrano un pelo più vago ; quello della vigogna è caro come la seta . Questo animale ha molte cose comuni col lama ; è dello stesso paese , e com' esso lo è esclusivamente , perchè non si trova in niun luogo altrove fuorchè sopra le Cordigliere ; ha pure lo stesso naturale , e presso a poco gli stessi costumi e 'l medesimo temperamento . Nondimeno siccome la sua lana è assai più lunga e più folta di quella del lama , pare che tema ancor meno il freddo ; dimora più volentieri nella neve , su i ghiacci e nei siti più freddi : se ne trovano in

gran numero nelle terre Magellaniche (a).

Le vigogne somigliano pure per la figura ai lama, ma sono esse più piccole, le loro gambe sono più corte e il loro muso più raccolto; hanno la lana di color di rosa secca un po' chiara; non hanno corni; abitano e pascolano nei siti più alti delle montagne; la neve e'l ghiaccio pare, che le ricreino anzi che infastidirle; vanno in truppe, e corrono velocissimamente; sono timorose, e quando scorgono alcuno si mettono in fuga cacciandosi dinanzi i loro parti. Gli antichi Re del Perù ne aveano rigorosamente proibita la caccia, perchè non moltiplicano molto; ed al presente ve n'è assai meno, che al tempo dell'arrivo degli Spagnuoli. La carne di questi animali non è così buona come quella degli huanacus; non si cercano che pel vello e per gli belzuar che producono. La maniera con cui li prendono prova la loro estrema timidezza, o se vuolsi, la loro imbecillità. Molti uomini si aduna-

B 6

(a) La parte orientale della costa dei Patagoni presso al fiume della Plata è parimente assai popolata di vigogne, ma questo animale è così sospetoso, e così veloce al corso, che è malagevole il coglierlo. *Voyage de George Anson* pag. 57. — Gli animali terrestri più comuni del porto San Giuliano nelle terre Magellaniche sono i guanocos. *Histoire du Paraguay, par le P. Charlevoix, Tome VI., pag. 207.*

no per mettergli in fuga, ed obbligargli ad alcuni passi angusti, dove sono tese delle funi a tre o quattro piedi di altezza, lungo le quali si lasciano pendere dei pezzi di pannolino o di drappo; le vigogne, che arrivano a questi passi sono per modo intimorite pel movimento di questi stracci agitati dal vento, che non ardiscono di passar oltre, e si raccolgono e stanno unite talchè è facile ucciderne assai; ma se si trova nella truppa qualche huanacus, siccom' essi sono più alti di corpo e meno timorosi delle vigogne, saltano oltre le corde, e poichè ne hanno dato l'esempio le vicogne saltano anch' esse e fuggono dai cacciatori (a).

Riguardo alle vigogne domestiche o paco, se ne servono come dei lama per portare le cariche; ma oltre che essendo questi animali più piccoli portano assai meno, sono ancora più capricciosi e pertinaci; quando una volta si coricano colla loro soma, si lascierebbono piuttosto tagliare a pezzi, che rialzarsi. Gl' Indiani non hanno mai usato il loro latte, perchè ne hanno appena per nodrire i loro parti. L'utile grande, che si trae dalla loro lana avea stimolati gli Spagnuoli a procurare di naturalizzarli in Europa; ne hanno trasferiti nella Spagna per farli multipli-

(a) Voyage de Frézier, pages 128. & 129.

care, ma si trovò il clima così importuno, che tutti vi perirono (a). Nondimeno, come ho già detto, io sono persuaso, che questi animali più preziosi ancora dei lama, potrebbero vivere nelle nostre montagne, e massimamente ne' Pirenei; coloro, che gli hanno trasferiti nella Spagna non hanno riflettuto, che nel Perù stesso non vivono, che nella regione fredda, cioè nella parte più alta delle montagne; che non se ne trovano nelle pianure, e che muojono ne' paesi caldi; che per lo contrario sono ancora oggidì numerosissimi nelle terre vicine allo stretto di Magellano, dove il freddo è maggiore assai che nella nostra Europa meridionale, e che in conseguenza si conveniva per conservarli deporli non nella Spagna, ma nella Scozia, od anche nella Norvegia, e più sicuramente ancora ai piedi de' Pirenei, delle Alpi ec., dove avessero potuto montare e cercare la regione ad essi opportuna: io non insisto sopra di ciò se non perchè immagino, che questi animali farebbono un eccellente acquisto per l'Europa, e produrrebbono più beni reali, che tutto il metallo (b) del nuovo

(a) *Historie des Aventures des Flibustiers*, p. 367.

(b) *Nota*. Che utile hanno infatti prodotto queste ricche miniere del Perù? sono periti milioni d'uomini nelle viscere della terra per iscavarle: e il loro sangue, e le loro fatiche non hanno servito, che a caricarci di un peso molesto.

mondo, il quale non ha servito che a caricarci di un peso inutile, perchè ottenevasi prima per un grosso d'oro o d'argento ciò, che ci costa un'oncia di questi stessi metalli.

Gli animali, che si nutrono d'erbe, e che abitano le alte montagne dell'Asia e dell'Africa rendono i belzuar, che si chiamano *orientali*, le cui virtù sono le più commendate; quelli delle montagne dell'Europa, dove la qualità delle piante e dell'erbe è più temperata non producono, che gomitolli senza alcuna virtù, che si chiamano *pallottole*: e nell'America meridionale tutti gli animali, che frequentano le montagne sotto la zona torrida, rendono altri belzuar, che si chiamano *occidentali*, i quali sono ancora più solidi, e forse qualificati tanto come gli *orientali*. La vigogna sopra tutto ne somministra in gran numero, l'huanacus ne rende altresì, e se ne hanno dai cervi e dai capriuoli nelle montagne della nuova Spagna (a). I lama e i paco non rendono vaghi belzuar se non essendo huanacus e vigogne, cioè nello stato di libertà; quelli che producono nella condizione di schiavi-

(a) Noi sappiamo, che nella nuova Spagna si trovano delle pietre di belzuar, quantunque non vi sieno vigogne, nè guanacos, ma solo cervi, in alcuni de' quali trovasi questa pietra. *Histoire Naturelle des Indes occidentales par Acosta*, p. 207.

tudine sono piccoli , neri e senza virtù ; i migliori sono quelli , che hanno un colore di verde scuro , e sono d'ordinario delle vigogne , e massimamente di quelle , che abitano le parti piu alte della montagna , e che pascolano abitualmente nelle nevi : di queste vigogne montagnuole le femmine come i maschi producono dei belzuar , e questi belzuar del Perù tengono il primo rango dopo i belzuar orientali , e sono assai più pregiati dei belzuar della nuova Spagna , i quali sono dei cervi , e sono i meno efficaci di tutti .



L'UNAU (a) E L'AÏ (b).

SI è dato a questi due animali l'epiteto di *pigri* a cagione della lentezza del loro moto, e della difficoltà, che hanno a camminare; ma noi abbiám creduto di dover conservare ad essi il nome, che hanno nel

(a) *Unau*, nome di questo animale al Maragnone, e che noi abbiám adottato. Il P. d'Abbeville distingue due specie d'*Unaus*, il più grande di cui qui si tratta, ch'egli chiama *Unau ouassou*; e il più piccolo, che nomina semplicemente *Unau*, che è lo stesso animale dell'*Aï*. „ Ve „ n'ha di due forte, egli dice, alcuni sono grandi „ di come le lepri incirca, gli altri sono grandi „ quasi due volte di più. *Mission au Maragnon*, „ pag. 252. „ Si è dato talora all'*unau* il nome di *Lecca-piedi*, ma questo nome, che pareva fosse stato tolto dall'abitudine di questo animale, non ha fondamento, perchè non si lecca i piedi, nè altra parte del corpo.

Tardigradus Ceilonicus Catulus. Seba, Vol. I., pag. 54., Tav. 33., fig. 4. *Tardigradus Ceilonicus fumina*. *Idem. ibid. Tab. 34.* Queste figure sono molto buone.

Tardigradus pedibus anticis didactylis, posticis tri-dactylis. *Tardigradus Ceilonicus*. *Le paresseux de Ceilan*. Brill. *Regn. anim.* pag. 35.

Didactylus. *Bradypus manibus didactylis caudà nullà*. Linn. *Syst. nat.* edit. x., pag. 35.

(b) *Aï*, nome di questo animale nel Brasile, e che noi abbiám adottato: questo nome nasce dal suono lamentevole *a, i*, che ripete soventemente. *Ouikaré* nella Guiana, secondo Barrère; *Hay*,

loro paese nativo per non confonderli con altri animali quasi altrettanto pigri di loro, e per distinguerli altresì chiaramente l'uno dall'altro: perchè quantunque si rassomiglino per molti riguardi, sono tuttavia differenti così all' esterno, come all' interno per caratteri così distinti, che non è possibile, esaminati che si abbiano, di prendere l'uno

secondo de Lery; *Hau* o *Hautbi*, secondo Thevet; *Perillo ligero*, secondo Oviedo; *Unau*, secondo il Padre d' Abbeville; *Haut*, secondo Nieremberg.

Arctopithecus, Gefner, *Icon. anim.* pag. 96., fig. ibid. *Nota*. Questa denominazione *Arctopithecus* è stata mal applicata da Gefner a questo animale, che non partecipa nè dell' orso, nè della scimia. La figura è cattiva siccome il nome; rappresenta essa un volto umano, e non ha di vero che le tre unghie ad ogni piede; nondimeno questa cattiva figura è stata ricopiata da Nieremberg, da Jonston e da molti altri.

Ignavus, Clus. *Exot.* pag. 110., fig. pag. 111., *idem.* pag. 372., fig. pag. 373. Questa seconda figura esposta da Clusius è meno cattiva della prima.

Pigritia sive Haut. Euf. Nieremberg., *Hist. Nat.* pag. 163. & 164. *Nota*. Di tre figure, che propone Nieremberg di questo animale, non ve n' ha alcuna, la qual sia originale: la prima è copiata da Gefner: le altre due da Clusius, e tutte e tre sono cattive: tuttavia la terza, che è la seconda di Clusius si allontana un po' meno dalla natura, che le due prime, ed è stata rifatta non solo da Nieremberg, ma da molti altri.

per l'altro, nè parimente di dubitare, che non sieno di due diversissime specie. L'unau non ha la coda, e non ha che due unghie ai piedi davanti; l'aï ha una coda corta, e tre unghie ad ogni piede. L'unau ha il muso più lungo, la fronte più elevata, le orecchie più apparenti, che l'aï; ha pure

Unau. *Description des Indes occidentales*, par de Laët, pages 556. & 618., fig. ibid. Queste figure di Laët sono le medesime che quelle di Clusius.

Aï seu Ignavus: Marcgr. *Hist. Nat. Brasil.* p. 221. fig. ibid. Nota. Questa figura è la stessa che la terza di Nieremberg, cioè la seconda di Clusio.

Aï seu Ignavus. Pison, *Hist. Bras.* pag. 321. & 322. La figura pag. 322., è pur la stessa di quella di Clusius; ma vi è di più la figura di un piccolo aï strisciante, e lo scheletro d'un aï grande. Si vede pure nel frontespizio del suo libro una figura di questo animale, che si arrampica su un albero.

Aï seu Tardigradus, gracilis, Americanus. Seba, Vol. I., pag. 53., Tab. 33., fig. 2. Questa figura è molto buona.

Ignavus. Marcgr. *Ouaikaré*, le Pareffeux. Barrère, *Hist. Nat. de la France équin.* pag. 154.

Ignavus Americanus visum stetu miscens. Ignavus Marcgravii, Klein, de quadrup. pag. 43.

Tardigradus pedibus anticis & posticis tridactylis. Tardigradus, le Pareffeux. Brisson, *Regn. anim.* pag. 34.

The Sloth, le Pareffeux. Edwards *Glanures*, part. II., pl. 310. La prima figura non è cattiva, quantunque fatta su una pelle imbottita.

Tridactylus. *Bradypus manibus tridactylis, caudâ brevi.* Linn. *Syst. nat.* edit. x., pag. 34.

il pelame affatto diverso ; nell' interno le sue viscere sono altrimenti situate e formate diversamente in alcune delle loro parti ; ma il carattere più distintivo, e al tempo stesso più singolare si è, che l'unau ha quarantasei coste, mentre l'aï non ne ha che ventotto : ciò solo suppone due specie lontanissime l'una dall'altra ; e questo numero di quarantasei coste in un animale, di cui il corpo è sì corto, è una specie di eccesso, o di errore della Natura ; perchè fra tutti gli animali anche de' più grandi, e di quelli, il cui corpo è più lungo, relativamente alla loro grossezza niuno non ha tanti travicelli nella sua armatura. L'elefante non ha che quaranta coste, il cavallo trentasei, il tasso trenta, il cane ventisei, l'uomo ventiquattro, ec. Questa differenza nella costruzione dell'unau e dell'aï, suppone più distanza fra queste due specie, che non v'abbia fra quella del cane e del gatto, che hanno lo stesso numero di coste ; perchè le differenze esteriori non sono nulla al paragone delle differenze interiori ; queste sono, per così dire, le cagioni delle altre, che non ne sono, che gli effetti. L'interiore negli esseri viventi è il fondo del disegno della Natura, cioè la forma costituente, cioè la vera figura ; l'esteriore non è che la superficie, o il panneggiamento ; perocchè quanti non ne abbiamo veduti nell'esame di paragone, che abbia-

mo fatto degli animali, che questo esteriore sovente differentissimo, copre un interiore perfettamente somigliante; e che al contrario la minima differenza interiore ne produce delle grandissime all' esteriore, e cangia le abitudini naturali, le facoltà, gli attributi dell' animale? quanti non ve ne sono, che sono armati, coperti, corredati di parti eccedenti, e che tuttavia per l'organizzazione interiore somigliano interamente ad altri, che ne sono privi? Ma questo non è il luogo di estendersi su questo soggetto, il quale per essere ben trattato suppone non solamente un paragone riflesso, ma uno sviluppamento seguito di tutte le parti degli esseri organizzati. Noi diremo soltanto, per ritornare ai nostri due animali, che quanto vi è sembrata la Natura viva, attiva, affinata nelle scimmie, altrettanto è lenta, stentata, e racchiusa in questi pigri; e ciò è meno pigrizia, che miseria; ciò è difetto, privazione, vizio nella struttura; non denti incisivi, nè canini, gli occhi oscuri, e coperti, la mascella del pari deforme e grossa, il pelo piatto e simile all' erba secca, le cosce mal connesse, e quasi fuori delle anche, le gambe troppo corte, mal formate, e peggio terminate; nulla di piatto ai piedi, non pollici, non dita separatamente mobili; ma due o tre unghie eccessivamente lunghe, curve al disotto tal che non si possono muo-

vere, che tutte insieme, e più nuocciono nel camminare di quello che giovino ad arrampicare: la lentezza, la stupidità, l'abbandono del suo essere, e parimente il dolore abituale risultano da questa struttura stravagante e negletta; non armi per assalire o difendersi; niun mezzo di sicurezza per fino nel razzolare la terra; niuna risorsa di salute nella fuga: confinati, non dico nel paese, ma nella zolla di terra, nell'albero, sotto cui sono nati; prigionieri nell'aperto, non potendo trascorrere che una pertica in un' ora (a) arrampicandosi con istento, strascinandosi con dolore, una voce inoltre la-

(a) *Perillo ligero, sive canicula agilis, animal est omnium quae viderim ignavissimum; nam adeo lente movetur, ut ad conficiendum iter longum dumtaxat quinquaginta passus, integro die illi opus sit..... In ades translatus naturali sua tarditate movetur, nec a clamoratione ulla aut impulsione gradum accelerat.* Oviedo in *summario Ind. occid.* cap. xxiii., tradotto dallo Spagnuolo in latino da Clusius *Exotic.* lib. v. cap. xvi. *Tanta est ejus tarditas ut unius diei spatio vix quinquaginta passus pertransire possit.* *Hernand. Hist. Mex.* — I Portoghesi hanno dato il nome di *Pareffe* ad un animale stravagantissimo, è della grandezza del cerigon (*Carigüeyá*..... La parte posteriore della testa è coperta di una grossa chioma, e sì grosso è il ventre, che scopa la terra; non si alza mai su i piedi, e si striscia così lentamente, che in quindici giorni appena potrebbe fare il viaggio di un tratto di pietra.

mentevole e interrotta , che non osano alzar che di notte , tutto manifesta la loro miseria ; tutto ci ricorda questi mostri per difetto , questi abbozzi imperfetti mille volte ideati , ed eseguiti dalla natura , i quali avendo appena la facoltà di esistere , non hanno dovuto sussistere , che un tempo , e sono stati dipoi cancellati dal catalogo degli esseri ; e in fatti se le terre , che abitano e l'unau e l'ai non fossero deserte ; se gli uomini e gli animali forti vi si fossero anticamente moltiplicati , queste specie non sarebbero pervenute in sino a noi , ma sarebbero state distrutte dalle altre , come un giorno addi-

Histoire des Indes, par Maffé, trait de Depure, page 71. — L'animale , che i Portoghesi hanno appellato. *Pareffe* si striscia . . . senza mai alzarsi diritto , ed è sì tardo , che non si avvanza in due settimane che un tratto di pietra. *Descr. des Indes occid. par Herrera. Amsterd. 1622., page 252.* — *Tam lentus est illius gressus & membrorum motus ut quindecim ipsis diebus ad lapidis ictum continuo tractu vix prodeat.* Pison., *Hist. Bras.* pag. 322. *Nota.* Questa asserzione di Pison tolta dal Maffei e da Herrera è esaggeratissima . — Non v'è animale più lento di questo , non sono necessarj i levrieri per prenderlo al corso , basterebbe a ciò una tartaruga. *Desmarchais, Tome III., page 301. Nota.* Ciò è pure esagerato . — Spendono otto , o nove minuti per avanzare un piede in distanza di tre pollici , e non li muovono , che l'uno dopo l'altro colla stessa lentezza ; le percolle non giovano per far

verrà. Noi abbiamo detto, che pare che siaci tutto ciò, che può essere; ciò sembracene un indizio sensibile assai; questi pigri fanno l'estremo termine della esistenza nell'ordine degli animali che hanno carne e sangue; un difetto di più avrebbe impedito ad essi di sussistere; riguardare tali abbozzi siccome esseri assoluti al pari degli altri; ammettere cagioni finali per tali dissimili; e trovare, che la Natura vi brilla altrettanto che nelle sue belle opere, ciò è non vederla che per un tubo angusto, e prendere per suo scopo i fini del nostro spirito.

Perchè non vi saranno delle specie di animali creati per la miseria, poichè nella spe-

lero affrettare il passo. ne ho battuti io stesso alcuni per vedere se ciò gli stimolava ad affrettarsi, ma parevano insensibili, nè si saprebbe il modo di costringergli a camminare più velocemente. *Voyage de Dampier, Tome III., page 305.* — Il pigro non fa cinquanta passi in un giorno, il Cacciatore, che lo vuol prendere può andare a far caccia di altra cosa, che lo troverà ancora al suo posto, da cui non si sarà allontanato. *Voyage à Cayenne par Binet. Paris, 1664., page 341.* — *Perico ligero*, Pierrot coureur..... Se gli dà l'epiteto di corridore, perchè gli è necessaria una ben lunga giornata per fare un quarto di lega. *Histoire de l'Orenoque, par Gumilla, Tome II., page 13.* Nota. Questo Autore è il solo che sul fatto della lentezza di questo animale sembrami, che più siasi avvicinato al vero.

cie umana il maggior numero vi è sacrificato dalla nascita? il male in vero procede più da noi, che dalla Natura; per un infelice, che non è tale, se non perchè è nato debole, impotente o deforme, v'ha un milione d'uomini, che lo sono per la sola durezza dei loro simili. Gli animali sono in generale più felici, la specie nulla ha da temere dai suoi individui; il male non ha per essi che una sorgente: ve ne sono due per gli uomini, quella del mal morale, che egli stesso si è aperta, è un torrente, che è cresciuto come un mare, il cui straboccamento copre, ed affligge la faccia intera del mondo; nel fisco all'incontro il male è ristretto fra limiti angusti, di raro va solo, il bene è spesso al di sopra, o almeno a livello: si può dubitare del bene degli animali se sono liberi, se hanno la facoltà di procurarsi agevolmente la loro sussistenza, e se mancano meno di noi di salute, dei sensi, degli organi necessarij o relativi al piacere? ora il comune degli animali è per tutti questi riguardi in somma copia dotato; e le specie sgraziate dell'unau e dell'aï sono forse le sole, che la Natura abbia maltrattate, le sole, che ci offrano l'immagine della miseria innata.

Veggiamolo più da vicino; difetto di denti; quelli poveri animali non possono nè cogliere una preda, nè nodrirsi di carne, nè
meno

meno pascerli d'erbe ; ridotti a vivere di foglie e di frutti selvatici , essi consumano assai tempo a strascinarsi appiè di un albero , ne spendono assai di più (a) per arrampicarsi fino su i rami ; e durante questo lento e faticoso esercizio , che si protrae talvolta a più giorni , sono costretti a tollerare la fame , e forse a soffrire il più urgente bisogno ; giunti sul loro albero , non ne discendon più mai , si attaccano ai rami , gli spogliano per

Tom. XXVI.

C

(a) Alcuni avvisano , che questa bestia viva solo di foglie di un certo albero detto nel loro linguaggio *Anabut* : quest' albero è alto , oltre ogni altro di quel paese , le foglie molto piccole , e sciolte , e purchè sia su quest' albero è contenta . *Haute. Singul. de la France ant. par Thevet, page 100.* L'animale pigro non vive che di foglie d'alberi , di cui i rami più alti gli servono di asilo , spende due giorni per salirvi sopra . . . Gli stimoli , le minacce , e perfino le percosse non vagliono ad affrettarlo . *Histoire des Indes, par Muffé, pag. 71. Nota.* Herrera dice la stessa cosa , e nei termini stessi , *pag. 252.* — Il Sloth o pigro non è grosso come l'orso mangiatore di formiche [*Tamanoir*] , nè così riccio . . . si nutre di foglie . . . Questi animali nuocciono molto agli alberi , a cui si appigliano , e sono così lenti a muoversi che dopo di aver mangiate tutte le foglie di un albero impiegano cinque o sei giorni a discenderne , e a salire sopra di un altro per quanto sia vicino , e non hanno che la pelle , e le ossa prima di pervenire a questa seconda meta ; quantunque fossero grati , e passuti al discendere dal primo . Non abban-

parti, mangiano successivamente le foglie di ciascun ramo, passano così molte settimane senza potere stemperare questo arido cibo con alcuna bevanda; e quando l'albero è interamente spogliato e nudo, vi ci rimangono tuttavia per l'impossibilità di partirne; finalmente quando gli stimola il bisogno, e questo si fa maggiore in essi del timor della morte, non potendo discendere, si lasciano cadere, e cadono come un fasso, come una

donano essi mai un albero prima di averlo ridotto in pezzi, e spogliato come potrebb' essere nel cuore dell'inverno. *Voyage de Dampier, Tome III., page 305.* — Sale sugli alberi, ma v'impiega tanto tempo a poggiarvi, che si ha tutto l'agio da prenderlo; quando è preso non si difende, nè cerca di fuggire; se gli si porge una lunga pertica si dispone tosto a salire, il che fa così lentamente, che è cosa nojevole; quando è al fine vi li ferma, nè cerca di discendere. *Voyage de Cayenne par Binet, p. 341.* — Gli unan hanno quattro gambe, e non se ne servono, che per rampicare, e quando sono su un albero, non se ne partono finchè non ne hanno mangiate tutte le foglie, allora discendono e mangian della terra finchè rimontano su un altro albero per mangiarne le foglie come al precedente — Noi collocammo sulla vela più bassa questo animale, e v'impiegò oltre a due ore a salire sulla gabbia, dove una scimia farebbe giunta in meno di mezzo minuto; avreste detto, che camminava per virtù di molle come un pendolo. *Voyage de Woodes Rogers, Tom. I., pag. 343.*

massa senza elasticità; perchè le loro gambe affiderate e pigre non hanno tempo di stendersi per rompere il colpo.

A terra sono esposti a tutti i loro nimici: siccome la loro carne non è assolutamente cattiva, gli uomini e gli animali rapaci li cercano e gli uccidono; pare che moltiplichino poco, o almeno, che se producono frequentemente, sia piccolo il numero dei parti, perchè non hanno che due poppe. Tutto dunque concorre alla loro distruzione, ed è ben difficile, che si mantenga la specie: egli è vero, che quantunque sieno lenti, sconci e quasi inabili a muoversi, sono duri, forti di corpo e di lunga vita; che possono lungo tempo sostenersi (a) senza alcun vitto; che coperti di un pelo arido e grosso, e non potendo moverli poco distruggono, e s'ingrassano col riposo, quantunque magri sieno i loro cibi; e che sebbene non abbiano nè legna, nè corna sopra la testa, nè ugne ai piedi, nè denti incisivi alla mascella inferiore; sono tuttavia del numero degli animali ruminanti, ed hanno come quelli molti stomachi; che in conseguenza possono compensare ciò che manca alla qualità del nu-

C 2

(a) Mi fu donato un *baut* vivo, che io ho conservato per ventisei giorni, ne' quali non ha mai voluto nè bevere, nè mangiare. *Singul. de la France ant. par Thevet, page 99.*

drimento colla quantità, che per ogni volta ne prendono; e ciò che è pure singolarissimo si è, che in vece di avere, come i ruminanti gl'intestini lunghissimi, gli hanno piccolissimi e più corti degli animali carnivori. L'ambiguità della Natura pare che si riconosca in questo contrasto; l'unau e l'ai sono certamente degli animali ruminanti, hanno quattro stomachi, e tutto insieme mancano di tutti i caratteri tanto esteriori, che interiori, i quali generalmente appartengono a tutti gli altri animali ruminanti: un'altra ambiguità si è, che in vece di due aperture al di fuori, l'una per l'orina e l'altra per gli escrementi, in vece di un orificio esteriore e distinto per le parti della generazione, questi animali non ne hanno, che uno solo, al fondo del quale vi è una fogna comune, una cloaca come negli uccelli; ma farebbe un non finirla mai, se volessi estendermi su tutte le singolarità, che presenta la struttura di questi animali: si potranno vedere descritte nell'eccellente descrizione, che ne ha fatta il Sig. Daubenton (a).

Del resto, se la miseria, che risulta dal difetto del sentimento non è la maggiore, quella di tali animali quantunque apparentissima potrebbe non essere reale; perch'egli

(a) Vedi in seguito la Descrizione.

pare, che sentano molto poco o molto male; la loro aria malinconica, il loro sguardo lento; la loro resistenza indolente ai colpi, che ricevono senza commoversi, accennano la loro insensibilità; e ciò che la dimostra si è, che sottoponendosi alle scalpelle, loro svelle il cuore e le viscere non muojono all' istante: Pison (a) che ha fatta questa crudele esperienza dice, che il cuore separato dal corpo palpitava sensibilmente dopo mezz' ora, e che l' animale moveva continuamente le gambe, come se atato non fosse, che addormentato: per tai ragguagli, questo quadrupede somiglia non solo alla testuggine, di cui ha la lentezza, ma ancora ad altri rettili; e a tutti quelli, che non hanno

(a) *Secui femellam vivam habentem in se factum omnibus molis perfectum cum pilis, anguibus & dentibus amnioni more ceterorum animalium inclusum. Cor motum suum validissime retinebat postquam exemptum erat è corpore per semi horium; placenta uterina consistebat multis particulis carnis instar substantie renum, rubicundis magnitudinis variae; instar fabarum; in illas autem particulas carneas [tenuibus membranulis connexus]. per multos ramulos vasa umbilicalia instar funis contorta, inserta erant. Cor femelle duas habebat insignes auriculas cavas. Exempto corde ceterisque visceribus, multo post se movebat & pedes lente contraherebat sicut dormituriens solet. Mamillas duas cum totidem papillis in pectore femella & fetus gerebant. Pison, Hist. Bras.*
 pag. 322.

un centro del senso unico e ben distinto. Ora tutti questi esseri sono miserabili senza essere infelici; e nelle sue produzioni più neglette, la Natura par sempre più madre, che matrigna.

Questi due animali appartengono egualmente l'uno e l'altro alle terre meridionali del nuovo continente, e non si trovano in alcun sito dell'antico. Noi abbiamo già detto (a) che l'Editore del Gabinetto di Seba si era ingannato dando all'unau il nome di *pigro di Ceylan*; questo errore adottato dal Sig. Klein, da Linneo e da Brisson è ancora più evidente oggidì di quel che lo fosse allora; il Sig. Marchese di Montmirail ha un unau vivo, che gli è venuto da Surinam; quelli che noi abbiamo nel Gabinetto del Re vengono dallo stesso sito e dalla Guiana, e io sono persuaso, che si trovi l'unau siccome l'ai in tutta la estensione dei deserti dell'America dal Brasile (b) al Messico; ma che, siccome non ha mai frequentate le terre del nord, non ha potuto passare da un continente all'altro; e se veduti si sono alcuni

(a) Vedi nel Tomo XIV. di quest'Opera, i discorsi sugli animali dei due Continenti.

(b) L'ai, descritto e scolpito da M. Edwards veniva dal paese di Honduras. D. Antonio di Ulloa dice, che se ne trovano ne' contorni di Portobello.

di questi animali sia nelle Indie orientali, sia nelle coste dell' Africa, egli è certo, che vi furono trasportati. Non possono essi tollerare il freddo; temono la pioggia; le vicende dell' umidità, e dell' arsura alterano la loro pelliccia, che somiglia più alla canapa non purgata, che alla lana o al pelo.

Meglio non posso conchiudere questo articolo, che colle osservazioni, che mi sono state comunicate dal Sig. Marchese di Montmirail sopra un unau, che si manteneva da tre anni nel suo ferraglio. „ Il pelo dell' „ unau è assai più morbido di quello dell' ai.... „ è presumibile, che quanto si è detto dai „ Viaggiatori della tardità eccessiva dei pigri „ non si convenga, che all' ai. L' unau quantunque pesantissimo, e di una andatura „ assai importuna, salirebbe, e discenderebbe „ più volte in un giorno da un albero altissimo. Sul declinare del giorno e nella „ notte pare, che pigli vigore; il che potrebbe far sospettare, che mal ci vedesse „ di giorno, e che la sua vista non gli potesse servire, che all' oscuro. Quando comparai questo animale in Amsterdam, si nutriva con biscotto di mare, e mi fu detto, che nel tempo della verdura non si „ doveva alimentar che con foglie; si è „ fatta in effetto la prova di dargliene, e „ volentieri le mangiava, finchè erano ancora tenere, ma al momento, che inco-

„ minciavano ad inaridire, e ad essere toc-
„ che dai vermi, le rifiutava. Da tre anni
„ ch'io lo mantengo vivo nel mio ferraglio,
„ il suo nodrimento ordinario è stato pane,
„ qualche volta mele e radici, e la sua
„ bevanda latte; prende egli sempre colle
„ zampe anteriori ciò che vuol mangiare,
„ e la grossezza della cosa accresce la dif-
„ ficoltà, ch'egli prova ad afferrarla colle
„ sue due ugne. Grida di raro, e il suo
„ gridare è breve, e non si replica mai due
„ volte allo stesso tempo; tal grido, seb-
„ ben dolente non somiglia altrimenti a quel-
„ lo dell'aï, s'egli è vero, che questa pa-
„ rola aï sia il suono del suo grido. La po-
„ situra più naturale dell'unau, e ch'egli
„ siccome pare preferisce ad ogni altra, è di
„ attaccarsi a un ramo col corpo rovesciato
„ al basso: talvolta pur dorme in questa po-
„ situra, cioè colle quattro zampe attaccate
„ a uno stesso punto formando col suo corpo
„ un arco: la forza de' suoi muscoli è incre-
„ dibile; ma gli è inutile quando cammina,
„ perchè la sua andatura non è nè meno
„ stentata, nè meno vacillante: questa strut-
„ tura sola parmi, che sia una cagione della
„ tardità di questo animale, che altronde non
„ ha alcun appetito violento, e non ricono-
„ sce coloro, che ne hanno cura.

DE-

DESCRIZIONE

DELL' UNAU.

L'Unau [*tav. I.*], che ha servito di soggetto per questa descrizione , era quasi della grandezza d' un tasso , ma men alto di gambe , le quali non sembrano esser fatte per sostenere in piedi quest' animale , nè per andare da un luogo all' altro , ma solamente per attaccarsi ai luoghi d' appoggio , ai quali può arrivare. Esso ha la testa rotonda , il muso sporgente in fuori , il naso grosso e rotondo , le narici ovali , gli occhi rotondi , le palpebre gonfie a foggia di cordone , la fronte e la sommità della testa alzate , le orecchie assai corte , rotonde , molto grosse , e quasi nude , assai rivolte indietro , e del tutto nascoste sotto il pelo : il collo sembra grosso come la testa , perchè è coperto di lungo pelo sporgente indietro come quello del corpo ; il pelo della groppa è diretto in contrario , e forma una specie di chioma trasversale al disopra della groppa all' unione del pelo del dorso : i piedi sono a proporzione più lunghi che le gambe dopo la giuntura , ed il tallone fino all' estremità delle dita ; ai piedi d' avanti non ha che due dita , e tre ai piedi di dietro ; le unghie sono assai lunghe e curvate .

Allorchè quest' animale è fermo sulle gambe , la giuntura ed il tallone poggiano sul terreno ;

Tom. XXVI.

D

l'avan-braccio è diretto obbliquamente in avanti, il gomito si alza pochissimo da terra : la gamba propriamente detta è piegata , e forma un angolo retto colla coscia , di modo che la parte inferiore della groppa resta sempre più bassa che il ginocchio . L'andatura di questo animale è assai lenta ; per far un passo , invece di portar innanzi la gamba d'avanti , striscia solamente il piede senza stendere le dita , le unghie restano piegate indietro , ed il piede non agisce se non che sopra la sua convessità e sopra la giuntura , senza toccare la terra colla pianta : questo moto non si fa direttamente in avanti , ma un poco obbliquo in fuori . La gamba ed il piede di dietro sono ancora più scostate in fuori , di modo che il piede forma un arco di cerchio quando l'animale vuol portarlo avanti , e durante questo moto , le unghie restano piegate indietro , come quelle dei piedi d'avanti , il piede non operando che sopra la sua convessità e sopra il tallone , senza che la pianta tocchi la terra . Una tale andatura non può essere nè pronta , nè facile , onde l'animale sembra che non cammini che contro sua voglia , ed allorchè è costretto per soddisfare a' suoi bisogni ; nulladimeno è meno lento di quello che si possa immaginare , avendo egli una conformazione così impropria al moto progressivo : mi è sembrato ch'ei camminasse assai più presto che le testudini , e che la sua andatura abbia gli stessi rapporti come nei pipistrelli , allorchè camminano sopra

i loro quattro piedi, senza valersi delle loro ale (*).

L'unau ha affai più di facilità ad arrampicarsi, ed a gettarsi in aria che a camminar per terra, allora stende le sue unghie, e se ne serve come d'uncini, attaccandole in tutt' i luoghi dov' esso può fermarsi. Le sue unghie, essendo affai lunghe, aguzze, adunche e fortissime, con queste si sostiene così facilmente, che sembra compiacersi di stare così sospeso in alto co' piedi, ed ha piacere di starvi per molto tempo, anche per riposare; si attacca per metà, dirizzandosi sopra le sue natiche, ed incrocicchiando i piedi d'avanti e quelli di dietro ad una piccola altezza per sostenere il suo corpo in una situazione verticale, passando la notte in questa positura; ma s' egli non avesse un punto d'appoggio per attaccare i suoi piedi d'avanti, non potrebbe tener dritto il suo corpo; se si vuole far federe questo animale, le sue gambe di dietro sporgono in fuori da ciascuna parte, in modo di restar in linea perfettamente l'una all'altra. Qualunque facilità abbia d'arrampicarsi per la conformazione delle sue unghie, è affai pesante e molto poco destro al movimento delle gambe e del corpo. Quello, che ha servito di soggetto per questa descrizione, io l'ho veduto attaccarsi coi quattro piedi all'orlo ch'era vi intorno ad un tavolino da giuoco, e così sospeso girarvi all'intorno, senza però potere giammai montarvi sopra.

D 2

(*) Vedi il Tomo XV. di quest' Opera, pag. 240.

L'unau usa del piede d'avanti come di una mano , e se ne serve per mettere in bocca il cibo ; ma non è che una mano assai imperfetta , e non ha che due dita e due grand' unghie , come abbiamo già detto ; queste dita e queste unghie non operano che come un sol dito , perchè si toccano quasi l'uno con l'altro , si stendono , ed anche si piegano ; l'animale accostando la sua giuntura , coll' estremità delle sue unghie afferra le cose che vuol prendere , e le solleva . Quello che io ho veduto mangiava poco , e se gli dava del pane biscotto , e per bevanda dell' acqua mischiata col latte : stavasi per lo più sospeso con tre de' suoi piedi , e col quarto si serviva per mangiare , tenendo la testa al basso . Quand' era forzato a camminare per molto tempo , gettava de' gridi deboli e lagrimevoli . Era amante del caldo , e dormiva di più quando faceva minor caldo ; il suo sonno qualche volta durava diciott' ore : aveva poco odorato , e sembrava di vista debole . Quest' animale si trova vivo nel Serraglio del Sig. Marchese di Montmirail .

pied. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	1.	5.	6.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite ———	9.	3.	4.
Circonferenza dell' estremità del muso	0.	4.	0.
Circonferenza del muso presa al di-			

dell' Unau .

61

pied. poll. lin.

fotto degli occhi —————	o.	5.	4.
Contorno dell' apertura della bocca —	o.	3.	1.
Distanza tra i due nafali —————	o.	o.	5.
Distanza dall' estremità del mufo all' angolo anteriore dell' occhio ———	o.	1.	4.
Distanza tra l' angolo pofferiore e l' o- recchia —————	o.	2.	o.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro —————	o.	o.	5 $\frac{1}{2}$
Apertura dell' occhio —————	o.	o.	3 $\frac{1}{4}$
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi , fequendo la curvatura del frontale —————	o.	2.	o.
La fteffa diftanza in linea retta —	o.	1.	7 $\frac{1}{2}$
Circonferenza della tefta tra gli occhi e le orecchie —————	o.	9.	6.
Lunghezza delle orecchie —————	o.	o.	8.
Larghezza della bafe , mifurata fulla curvatura efferiore —————	o.	1.	8.
Diftanza tra le due orecchie prefa al baffo —————	o.	2.	2.
Lunghezza del collo —————	o.	1.	7.
Circonferenza del collo —————	o.	8.	6.
Circonferenza del corpo prefa dietro le gambe anteriori —————	o.	10.	10.
La fteffa circonferenza al fito più grosso —————	1.	4.	o.
La fteffa circonferenza d'avanti le gam- be pofferiori —————	1.	1.	4.

	pied. poll. lin.		
Lunghezza dell'avan-braccio fino alla giuntura —————	o.	5.	10.
Circonferenza della giuntura —————	o.	3.	4.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle unghie —————	o.	4.	9.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	o.	5.	5.
Circonferenza del metatarso —————	o.	3.	9.
Lunghezza dal tallone fino all'estre- mità delle unghie —————	o.	4.	8.
Larghezza del piede anteriore —————	o.	0.	9.
Larghezza del piede posteriore —————	o.	1.	0.
Lunghezza delle unghie più grandi —	o.	1.	7 $\frac{1}{2}$
Larghezza alla base —————	o.	0.	3 $\frac{1}{2}$

L'unau che ha servito di soggette per la seguente descrizione delle viscere e dello scheletro di questo animale è stato mandato da Surinam in Olanda, e d'Amsterdam a Parigi nell'acquavita: era molto più giovane e più piccolo di quello, le di cui misure sono descritte nella tavola precedente, perchè la sua lunghezza misurata in linea retta dall'estremità del muso fino all'ano non era che di nove pollici e dieci linee, il corpo aveva cinque pollici e quattro linee di circonferenza presa dietro le gambe anteriori, otto pollici e nove linee nel mezzo, e sette pollici d'avanti le gambe posteriori; quest'animale non aveva verun'apparenza di coda.

Ho trovato nell'apertura dell'addomine una gran

pancia , che ne occupava la maggior parte , principalmente la parte sinistra per intero fino alla regione iliaca ; eravi un altro stomaco più piccolo , il quale era situato sopra la pancia , e che occupava la parte anteriore del lato destro ; si trovava un lobo del fegato fra questi due stomachi .

Il duodeno usciva dalla parte anteriore dell' ultimo stomaco , e si stendeva lungo la parte destra , formando molti seni ; gl' intestini andavano avvolgendosi nella regione iliaca destra , nell' ipogastrica e nell' iliaca sinistra ; in questo sito il canale intestinale si andava ingrossando , si ripiegava nell' ipogastrico , formava un arco nella regione iliaca sinistra , stendendosi in avanti , si ricurvava in alto dalla parte sinistra , e si allungava indietro fino all' ano .

Esso aveva una grossa pancia [A B C D , *tav. II. fig. 1. e 2.* ; e *tav. III. , fig. 1.*] , ed altri stomachi più piccoli [E F , *tav. II. , fig. 1.* , dove si vede al disotto il groppo formato da tutti gli stomachi ; E F , *fig. 2.* , che rappresenta questi stomachi veduti al disopra ; ed E F , *tav. III. , fig. 1.* , ove gli stessi stomachi sono sviluppati] . La pancia [A B C D , *tav. II. , fig. 1. e 2.* , e *tav. III. , fig. 1.*] differiva da quella del bue , e della maggior parte degli altri animali ruminanti , non avendo essa che una sola convessità [C] alla parte posteriore , ed essendo le sue pareti inferiori [A B C D E , *tav. III. , fig. 2.*] lisce senza veruna papilla . Trovavasi un sacco [E , *tav. II. , fig. 1. e 2.* , e *tav. III. , fig. 1.*] che

corrispondeva alla berretta del bue , ma le sue pareti interiori [F G , *tav. III. , fig. 2.*] erano lisce come quelle della pancia , e non avevano segno di rete ; la pancia era in parte separata dalla berretta da un tramezzo [*il quale è stato tagliato nei fti HI e KL*] . L'unau non aveva al luogo del terzo stomaco dei ruminanti che una specie di borsa [G , *tav. II. , fig. 2. ; e tav. III. , fig. 1.*] o di gonfiatura nelle pareti interiori [M , *tav. III. , fig. 2.*] ov' erano lisce senz' alcuna apparenza di rassomiglianza del foglietto del bue . Si trovava negli stomachi dell' unau , come in quelli del bue , una grondaia [N O , *tav. III. , fig. 2.*] , che si stendeva dall' esofago [P Q] fino alla borsa [M] , la quale era al fto del foglietto del bue . Eravi un ristagnamento [H , *tav. II. , fig. 2. , tav. III. , fig. 1. ; e R S , fig. 2.*] tra questa borsa , e l' ultima parte [F , *tav. II. , fig. 2. ; e tav. III. , fig. 1.*] degli stomachi dell' unau , che corrispondeva al ventricolo del bue per la sua figura e per la sua posizione , ma non aveva veruna piegatura sulle pareti interiori [T , *tav. III. , fig. 2.*] . Quest' ultima parte era terminata nel piloro [I , *tav. II. , fig. 2. ; e tav. III. , fig. 1. ; e V. , fig. 2.*] .

Il canale intestinale non aveva che tre piedi di lunghezza dal piloro fino all' ano . Ma quando si è presa questa misura gl' intestini tenui non eran già stesi al lungo per linea retta , ma all' opposto formavano una quantità di giri [A B C , *tav. IV. , fig. 1. e 2.*] contro il mesenterio : il colon [D E]

ed il retto erano in linea retta; non eravi punto di cieco, ma solo una specie d'inferzione [F] tra l'ileo [A] ed il colon [D] al di fuori, ed una valvula al di dentro; si distingueva l'origine [D] del colon, perchè in questo sito il canale intestinale era più grosso che nel restante della sua estensione; questa grossezza diminuivasi insensibilmente fino all' ano.

Il fegato era intero nella parte destra, non aveva che due lobi, uno assai grande, ed attaccato alla parte destra del diaframma con un legamento sospensorio, che usciva in vicinanza del mezzo della faccia anteriore di questo lobo; l'altro era più piccolo e situato dietro al grande. Eravi qualche apparenza d'una vescichetta del fiele sopra la parte posteriore ed inferiore della faccia interna del fegato, ma questa situazione sarebbe straordinaria per la vescichetta del fiele; e siccome non si è trovata nell' ai alcun' apparenza di questa vescichetta del fiele, così si può credere che manchi all' unau.

La milza era situata in faccia al ventricolo, la sua parte inferiore era assai larga e rotonda, e la parte superiore era per l'opposto assai stretta.

I reni erano posti l'uno vicino all' altro, assai indietro sopra la faccia interna delle ossa dell' ileo dietro i testicoli; essi avevano la forma ordinaria de' reni.

Il centro nervoso del diaframma era di una mezzana grandezza; Ciascun polmone non aveva che

un fol lobo. Il cuore era quasi rotondo, e situato in mezzo ai due polmoni colla punta diretta obliquamente a sinistra. Sortivano tre rami dal tronco dell'aorta.

La lingua era assai grossa in tutta la sua lunghezza, e larga all'estremità anteriore. L'epiglottide aveva una scanalatura nel mezzo. Il palato era attraversato da dieci solchi assai irregolari.

Il cervelletto era situato dietro al cervello, eranvi dei rivolgimenti sopra il cervello, e delle scanalature sopra il cervelletto, come nella maggior parte degli altri quadrupedi.

Non ho scoperto che due capezzoli, uno sopra ciascuna parte del petto.

La vulva [A, tav. IV, fig. 3.] era situata assai vicina all'ano [B], ed innalzata dalla sua parte inferiore [A]. La matrice [C] era assai apparente; ma non ho potuto conoscere se vi fossero le corna e le trombe. Ho trovato da ciascuna parte due corpi [DEFG] che avevano ciascuno l'apparenza di un testicolo; ma tutte queste parti erano in istato troppo cattivo, e troppo ristrette dalla forza dello spirito di vino, per poter sapere quali di questi corpi fossero veramente i testicoli, e di conoscere se i filetti HHII fossero trombe. Al corpo F è stata tolta una membrana che lo involgeva, l'altro corpo D è rivestito di questa membrana. Si è rappresentato nella stessa figura il retto [KK], la vescica [L], l'uretra [MM], e i reni [NN]. I corpi EG erano situati avanti i reni sotto le

coste false; da questa situazione si può presumere che non fossero i veri testicoli.

L'osso frontale dell' unau è assai grande, le ossa proprie del naso sono assai corte, l'estremità della mascella superiore è grossa, principalmente nelle parti, che sono gonfiate dai denti canini; l'orlo osseo delle orbite degli occhi è interrorto indietro sopra le due settime parti della circonferenza delle orbite: l'osso della guancia non era attaccato all'osso temporale nello scheletro, che ha scrvito di soggetto per questa descrizione, aveva due linee di distanza tra le estremità delle apofisi zigomatiche di questi due ossi; non ho veduto questa conformazione in alcun altro animale, forse i due ossi si sarebbero avvicinati l'uno all' altro, quando l'individuo, di cui qui si parla, sarebbe stato avanzato in età; essendo esso così giovane, la maggior parte delle epifesi, le ossa dello sterno, quelle del carpo ec. non erano che di una sostanza cartilaginosa. I rami della mascella inferiore erano cortissimi; l'apofisi coronoidea era di poca altezza, al disotto dell'apofisi condiloidea trovavasi una terza apofisi, ch' era assai larga, sottile, e sporgente indietro.

L'unau non ha denti incisivi nella mascella superiore, nè in quella di sotto; ma vi sono nelle due mascelle dei denti canini e de' mascellari, uno canino e quattro mascellari da ciascuna parte della mascella superiore, uno canino e tre mascellari in ciascuna parte inferiore, che in tutto

sono diciotto denti. I canini rassomigliano per la loro figura ai mascellari, essi sono acuti, e quando la bocca è chiusa, non si toccano che dai loro lati.

Le apofisi delle vertebre e delle false vertebre non erano ancora formate, non vi si vedeva veruna traccia delle apofisi spinose delle ultime vertebre del dorso, delle vertebre lombari e delle false vertebre del sacro ec.

Aveva ventitre vertebre dorsali, e ventitre coste da ciascuna parte, dodici vere, ed undici false, cioè quarantasei in tutto. Io non ho veduto altro animale, che ne abbia in così gran numero.

Le vertebre lombari non erano che quattro, così pure vi è poca distanza tra l'ultima costa falsa e l'osso dell'anca.

L'osso sacro mi è sembrato composto di quattro false vertebre, ed il coccige di otto, la seconda e la terza delle quali sembrano essere contigue alle ossa ischie, allorchè l'ossificazione è compiuta.

L'unau ha delle clavicole; la base e la parte anteriore dell'omoplata non sono divise da un angolo, esse formano un arco di cerchio con una curvatura uniforme.

La parte inferiore dell'osso del braccio e dell'avam-braccio è appianata d'avanti e di dietro, e assai sottile. I due ossi della gamba sono assai lontani l'uno dall'altro nel mezzo della loro lunghezza.

Il metacarpo era composto di quatir'ossi, il

primo e l'ultimo de' quali erano assai più corti e meno grossi che i due altri . Eranvi cinque ossi nel metatarso , il primo e l'ultimo erano più corti e più piccoli che gli altri tre .

Le due dita de' piedi anteriori e le tre dita de' piedi posteriori non avevano ciascuno che due falangi, la prima delle quali era assai lunga , e l'ultima assai corta ed incastrata nell' unghia . L' unau non avendo che tre ordini d' ossi , gli uni situati all' estremità degli altri al luogo delle dita , e del metacarpo , o del metatarso , mi si potrebbe chiedere perchè io attribuisca il primo ordine di questi ossi al metacarpo ed al metatarso , in vece di considerarli come le prime falangi delle dita , le quali in questo caso avrebbero tre falangi come le dita degli altri animali . Con questa supposizione nell' unau non vi sarebbe nè metacarpo , nè metatarso , ma se vi sono tali parti in quest' animale, gli manca una terza falange a ciascun dito ; ciò che mi fa preferire quest' ultima opinione è che gl. ossi del second' ordine essendo molto più lunghi di quelli del primo , non sembrano esser falangi , perchè le prime dovrebbero esser più lunghe delle seconde . In un soggetto d' età più avanzata e più grande si potrebbero riconoscere a tri indizj per la vera denominazione di queste parti .

DESCRIZIONE

DELL' AÏ.

L' Aï rassomiglia all' unau per la forma del corpo e delle gambe; ma egli è diverso per la qualità, pe' colori del pelo, per la forma del muso, pel numero delle dita dei piedi d'avanti, e per la coda, la quale esso non ha che piccola, di modo che questa manca del tutto all' unau. La tavola V. rappresenta due aï giovani in differenti atteggiamenti; lo stesso animale è rappresentato nella tav. VI. in un' età più avanzata. L' aï che ha servito di soggetto a questa descrizione era assai piccolo; aveva la testa più allungata che l' unau, ed il muso assai più corto, di modo che l' unione del muso e della testa formava un gruppo più rotondo; la mascella inferiore aveva tanto di grossezza, che l' apertura della bocca si trovava nel mezzo della faccia anteriore del muso; era così corto, che la bocca, senz' essere eccessivamente grande, si estendeva da ciascuna parte quasi fino al di sotto dell' angolo posteriore dell' occhio; il naso era un poco sporgente in fuori; la fronte era meno alzata che quella dell' unau, e le orecchie ancora più corte, esse non apparivano al di fuori che per un orlo coperto di pelo. Aveva a ciascuno dei quattro piedi tre unghie simili a quelle dell' unau, le unghie dei piedi anteriori

Descrizione dell' Aï. 71

erano un poco più grandi di quelle de' piedi posteriori ; l' unghia di mezzo in ciascun piede era un poco più lunga che le due altre .

I peli dell' aï erano assai diversi da quelli dell' unau e degli altri animali ; essi rassomigliavano all' erba seccata ; ciascuno di questi peli era appianato , ed aveva assai più di larghezza che di grossezza . I peli della testa e del collo erano dritti in avanti , e non lasciavano scoperti che gli occhi ed il muso ; il colore di questi peli era mischiato di bruno e di biancastro ; il bruno era principalmente sopra la testa , sul petto , il ventre e le parti del corpo , e sul dorso era più biancastro che bruno .

pied. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	o. 7. 6.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite ———	o. 1. 10.
Circonferenza dell' estremità del muso	o. 2. 3.
Circonferenza del muso presa al di sotto degli occhi —————	o. 2. 11.
Contorno dell' apertura della bocca —	o. 1. 2.
Distanza tra le due narici —————	o. o. 1.
Distanza tra l' estremità del muso , e l' angolo anteriore dell' occhio ———	o. o. 6.
Distanza tra l' angolo posteriore e l' o- recchia —————	o. 1. 6.
Lunghezza dell' occhio da un angolo	

pied. poll. lin.

all' altro —————	o.	o.	3.
Apertura dell' occhio —————	o.	o.	2.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi , seguendo la curvatura del frontale —————	o.	1.	1.
La stessa distanza in linea retta —	o.	o.	8.
Circonferenza della testa tra gli oc- chi e le orecchie —————	o.	4.	6.
Lunghezza delle orecchie —————	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Larghezza della base , misurata se- condo la curvatura esteriore ———	o.	o.	5 ¹
Distanza tra le due orecchie presa al basso —————	o.	1.	2.
Lunghezza del collo —————	o.	1.	3.
Circonferenza del collo —————	o.	2.	6.
Lunghezza dell' avan-braccio , dal go- mito alla giuntura della mano —	o.	2.	1.
Circonferenza della mano —————	o.	1.	8.
Lunghezza dalla giuntura della mano all' estremità delle unghie ———	o.	2.	1.
Lunghezza della gamba , dal ginocchio fino al tallone —————	o.	1.	9.
Larghezza al sito del tallone ———	o.	1.	8.
Lunghezza dal tallone fino all' estre- mità delle unghie —————	o.	2.	o.
Larghezza del piede anteriore ———	o.	o.	6.
Larghezza del piede posteriore ———	o.	o.	6 $\frac{1}{2}$
Lunghezza delle unghie più grandi —	o.	o.	10.
Larghezza alla base —————	o.	o.	1 $\frac{1}{2}$

Trovansi nel Gabinetto due pelli d'aï; vi sono attaccate le ossa della testa ad una di queste pelli, la quale ha un piede e dieci pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda, la di cui lunghezza è di un pollice e mezzo; l'altra pelle è quasi della stessa grandezza della prima; vi manca la testa, ma vi sono le unghie. Il pelo di queste due pelli è della stessa qualità di quell' aï giovine, sopra del quale si è fatta la descrizione; esso ha fino a due pollici ed un quarto di lunghezza; i colori non sono del tutto uniformi sopra l'una e l'altra di queste pelli.

Nella prima, la faccia è contornata d'un pelo corto, rozzo, riccio, di color biancastro alla sua origine, e rosseggiante all' estremità; il rimanente della testa ed il collo sono coperti di pelo più lungo, morbido, bruno e nericcio. Avvi sul garrot una fascia longitudinale, formata da un pelo corto e d'un bel nero, ed unito in ciascuna parte con due macchie rossiccie; questi colori rossicci e neri danno all' aï il nome di *dorso bruciato*, perchè sembra in fatti che sia stato abbruciato sul dorso. Tutto il disopra di quest' animale, e le gambe sono mischiate di color bruno, rosseggiante e biancastro, il disotto del corpo è bruno mischiato di grigio.

I colori de' peli della seconda pelle sono diversi da quelli della prima, in quanto che il pelo, dal quale è contornata la faccia è gialliccio, quello della testa e del collo non è nericcio, ed ha più

di tinte grigie che di bruno ; le macchie che sono ai lati della fascia nera del garrot , hanno delle tinte rossiccie , non avvi verun' apparenza di questo colore sopra il corpo e sopra le gambe , il grigio ed il biancastro dominano sopra il bruno ; il difetto del corpo ha pure meno di bruno che di grigio : trovasi alla radice dei peli di queste due pelli una lanugine corta e fina dello stesso colore de' peli , tra i quali è situata .

Le unghie sono gialliccie ed assai strette l'una contro l'altra ; quelle dei piedi d'avanti hanno due pollici e nove linee di lunghezza prese secondo la loro curvatura , e quelle de' piedi posteriori solamente d'un pollice e tre linee ; non hanno le une alle altre che tre linee di larghezza alla base .

La situazione delle viscere dell' ai giovine , le di cui misure ho riferite nella tavola precedente , era diversa dalla situazione delle viscere dell' unau , a motivo che gli stomachi occupavano la parte sinistra interamente , e che i giri del canale intestinale trovansi tutti nella parte destra ; e perciò la porzione di questo canale , che corrisponde al colon degli altri animali , aveva la sua origine dalla regione iliaca destra , si stendeva in avanti nella parte destra , si ripiegava all' indentro verso il fegato , e prolungavasi indietro per congiungersi al retto .

L' ai aveva quattro stomachi come l' unau , ma la pancia (A B C D , *tav. VII. , fig. 1. , dove gli sto-*

macchi si vedono pel disotto, e fig. 2., ove si vedono pel di sopra] era diverso da quello dell' unau, attesa la convessità [C], la quale era assai più allungata, e formava un lungo prolungamento [CD]; la berretta [E, fig. 1. e 2.] era separata dalla pancia da una fenditura più profonda [G, fig. 2.]; il foglietto [H, fig. 1. e 2.] ed il ventricolo [F] rassomigliano al foglietto ed al ventricolo dell' unau: ma vi era una grande differenza nella forma del prolungamento [CD] della pancia dell' aï, paragonato alla convessità della pancia dell' unau: il prolungamento dell' aï era interiormente diviso da due tramezzi longitudinali, che si estendevano fino a tre quarti [I] della sua lunghezza, e che lo dividevano in tre parti; quella di mezzo s'estendeva fino all' estremità [D] del prolungamento, le parti posteriori e anteriori terminavano *[nel luogo segnato I]* a cinque linee di distanza dall' estremità del prolungamento.

Gl' intestini avevano due piedi e due pollici di lunghezza dal piloro fino all' ano.

Il fegato dell' aï era totalmente situato alla destra, ed aveva un legamento sospensorio come quello dell' unau, ma era di forma diversa; non era composto che di un sol lobo; aveva delle fenditure sopra la sua faccia posteriore, che formavano due piccoli lobi.

La milza era bislunga, ed un poco più larga solamente alla sua estremità dalla parte sinistra come nel rimanente della sua estensione; il suo

orlo posteriore era tagliato in due luoghi.

La trachea arteria [A B, (*tav. VII.*, *fig. 3.*)] s'estendeva fino all'estremità posteriore [C D] dei due polmoni, essa formava in questo sito un gomito [B], si ripiegava al basso, e si allungava in avanti della lunghezza [B E] d'un pollice, in appresso si ripiegava ancora al basso, e formava un altro gomito sopra il cuore [F] avanti di dividersi in due rami [G H].

I visceri dell'aï mi sono sembrati rassomiglianti a quelli dell'unau.

Le ossa proprie del naso, e le estremità delle due mascelle erano più corte nell'aï che nell'unau, l'apofisi coronioidea della mascella inferiore era più lunga.

Il numero dei denti era lo stesso nello scheletro dell'aï, come nello scheletro dell'unau, che io ho veduto; i denti della mascella inferiore si rassomigliavano per la figura e per la situazione, ma i due primi della mascella superiore erano situati a proporzione l'uno presso l'altro più nell'aï che nell'unau, e sembravano d'avere maggior rapporto agl'incisivi che ai canini: essi erano picciolissimi, di modo che i canini inferiori erano assai più grandi: il primo dei denti mascellari di sotto era situato più avanti che nell'unau; i mascellari dell'aï, in vece di essere acuti come quelli dell'unau, terminavano con una faccia concava.

Lo scheletro dell'aï, che ha servito di soggetto per questa descrizione era d'un individuo assai gio-

vane , il quale non aveva che cartilagini al luogo delle apofifi , delle epifefi , degli offi dello fterno , del carpo ec.

Non aveva quarantafei cofte come l'unau , l'aï non ne ha che ventotto , quattordici da ciafcuna parte , nove vere e cinque falfe .

Tanto nell' aï , come nell' unau vi fono quattro vertebre lombari e quattro falfe vertebre nell' offe facro , ma le falfe vertebre della coda fono quindici nell' aï ; mi è fembrato , che la feconda e la terza dovelfero unirfi alle offa ifchie , quando l'offificazione foffe interamente compiuta , dietro a quefti offi vi fono circa otto falfe vertebre , che formano un pezzo di coda affai lungo per ufcir fuori ; così l'aï , come fi è già detto , ha una piccola coda , mentre quefta parte manca affatto nell' unau .

La parte inferiore delle offa dell' avan-braccio è poco appianata .

Nel metacarpo e nel metatarfo vi fono cinque offi , de' quali il primo ed il quinto fono cortiffimi , e non formano che de' tubercoli . Le dita fono tre in ciafcun piede , e non hanno che due falangi cadauno , come nell' unau .

DESCRIZIONE

DELLA PARTE DEL GABINETTO

Spettante alla Storia Naturale

DELLA GIRAFFA, DELL' UNAU E DELL' AÏ.

Num. MCCXXI.

L'osso radio d'una giraffa.

Quest' osso è stato trasportato dalla Guardaroba della Corona al Gabinetto della Storia Naturale, sotto la denominazione di *osso di gigante*: ci è stato detto, ch' esso fosse porzione della raccolta, che fece di cose curiose Gastone di Francia, fratello di Luigi XIII. a Blois già più d'un secolo. Questo preteso osso di gigante si supponeva che fosse un osso della gamba, perchè ha qualche relazione alla tibia per la sua forma allungata, e supponendo che fosse la tibia d'un uomo, sarebbe stato in fatti di un gigante, perchè avrebbe in circa dodici piedi d'altezza. Ma l'osso, di cui si parla, non si potrebbe farlo creder tale ad un esatto osservatore: era facile di conoscere che non è d'un uomo. Io credeva, che quest' osso, col soccorso dell'anatomia paragonata, si potesse sapere di qual parte del corpo esso fosse, e di qual sorte d'animale; ma io sono giunto a conoscerne per fino la specie, e ne ho date le pruove, colle quali non v'è luogo a dubitare, che questo non sia l'osso radio d'una giraffa (*), quantunque non abbia mai veduto alcuno di questi animali, nè alcuno de' suoi ossi. Quello, di cui si parla, ha

(*) Vedi le Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze, anno 1762.

quattro pollici e otto linee di lunghezza , quantunque l'epifisi della parte inferiore [A, *tav. IV., fig. 4.*] manchi a quest' osso ; supponendo quest' epifisi della grandezza proporzionata a quella del restante dell' osso , esso avrebbe , essendo intiero , due piedi sei pollici e dieci linee . Avvi nella porzione di mezzo superiore della faccia posteriore una parte sporgente [B] , la quale è stata spezzata , e ch' è un avanzo dell' osso del gomito , non si comprendono nella parte inferiore [A] dell' osso radio , se non alcuni piccoli segai dell' osso del gomito , ma vi si vedono nella parte superiore [C] delle piccole facce articolari , le quali indicano che l'osso del gomito era unito da un' articolazione immobile .

Il legamento de' due ossi colle loro parti di mezzo ed inferiori , prova ad evidenza che non provengono che da un animale fessipede , perchè non avvi verun' aderenza nell' osso dell' avan-braccio di questi animali . Paragonando l'osso radio , che io attribuisco alla giraffa , coll' osso radio degli animali solipedi , e di tutti gli animali ruminanti ed a piedi forcuti , io ho trovato ch' esso aveva per la sua struttura più di rassomiglianza a quello del cammello ed al dromedario , che ad alcun altro , ma è diverso per un carattere sufficiente , per provare ch' esso non deriva da questi animali ; non vi si vede nella sua parte inferiore la giuntura che separa l'osso radio dall' osso del gomito nel cammello e nel dromedario . Esso deriva certamente da un animale più grande , supponendo che l' altezza di quest' animale sia proporzionata alla lunghezza del suo osso radio in ragione dell' altezza del cammello , o del dromedario , relativamente alla lunghezza del loro osso radio , come si può credere con tutta ragione per la somiglianza della forma , che vi è tra l'osso radio di questi animali , e quell' osso , di cui si tratta . Quest' osso dunque non può esser se non d' una giraffa , poichè di tutti gli animali piefforcuti , de' quali non

si è mai parlato , è il solo , di cui l'osso radio possa esser lungo due piedi , sei pollici e dieci linee . L'altezza della parte d'avanti essendo proporzionata alla lunghezza del radio di quest' animale , come nel cammello e nel dromedario , avrebbe più di dieci piedi d'altezza presa da terra fino al garrot . Questa misura s'accorda colla cognizione , che si ha della statura della giraffa ; si è detto , che la testa possa avere sedici piedi d'altezza , e che il suo collo sia della lunghezza di sette piedi , la parte d'avanti di circa dieci piedi ; si sa altresì che sia più alto che di dietro ; e riferisce Giobbe Ludolf nella sua Storia dell' Etiopia , che le gambe anteriori della giraffa sono della lunghezza d'un uomo di statura ordinaria all'altezza del ginocchio di quest' animale ; lo stesso Autore aggiugne , che vi è luogo a credere , che un uomo piccolo a cavallo possa passare sotto al ventre della giraffa senz'abbassare la testa . Ciò mi è sembrato dapprima sospetto , o per lo meno esagerato , ma dopo aver calcolata l'altezza che avrebbe la parte d'avanti d'un cammello , il di cui osso radio sarebbe altrettanto lungo di questo , che io stimo procedente dalla giraffa , ho conosciuto che un uomo a cavallo potrebbe passare sotto al ventre di questo animale : quest'altezza è di dieci piedi , da' quali deducendone tre per la grossezza del corpo , restano sette di distanza da terra fino al ventre , o al petto , ciò che basta per poter passare un uomo a cavallo ; perchè un cavallo di quattro piedi e mezzo è di alta statura per un cavallo da sella , e la testa del cavalcante non s'innalza sopra il cavallo che tre piedi al più , il che forma in tutto più di sette piedi ; ma vi farebbe più di sette piedi da terra fino al ventre della giraffa , seguendo il calcolo , che ho fatto del dromedario e del cammello , perchè il corpo della giraffa è men grosso che quello di questi animali .

Num.

Num. MCCXXII.

Una pelle d'unau .

Questa pelle non è intera , vi manca una porzione al sito della testa , ciò che rimane è lungo due piedi ; il pelo del garrot ha fino a sei pollici di lunghezza ; i colori sono meno carichi sul pelo di questa pelle , che sull'unau vivo , che ha servito di soggetto per la descrizione di quest' animale .

Num. MCCXXIII.

I quattro stomacchi dell'unau .

La descrizione di questi stomacchi fa parte di quella dell'unau , e sono rappresentati dalle tavole II. e III.

Num. MCCXXIV.

Le parti genitali dell'unau .

Sopra questo pezzo si è fatta la descrizione dell'unau femmina . Vedi la tav. IV. , fig. 3.

Num. MCCXXV.

Uno scheletro d'unau .

Quest' è lo scheletro , che ha servito di soggetto per la descrizione delle ossa dell'unau . Fra tutti gli scheletri dei quadrupedi , che io ho osservati , questo è il più rimarchevole pel gran numero di coste , che sono al numero di quarantasei .



Num. MCCXXVI.

Un feto d' aï .

L cordone ombilicale è ancora attaccato al ventre di questo feto , che ha poco più di sei pollici di lunghezza ; il pelo è già lungo fino a dieci linee sul collo .

Num. MCCXXVII.

Un aï giovine .

Questo piccolo animale non è lungo che circa otto pollici ; il suo pelo ha quasi un pollice e mezzo di lunghezza : è stato mandato col precedente da Cajenna dal Sig. Artur medico del Re .

Num. MCCXXVIII.

La pelle d' un aï .

Questa pelle è stata data al Gabinetto dal Sig. di Bombarde , che l'aveva ricevuta da Cajenna ; sono attaccate ad essa pelle le ossa della testa : la sua descrizione si trova in quella dell' aï .

Num. MCCXXIX.

Altra pelle d' aï .

LA descrizione di questa pelle , la quale non è intera nel sito della testa , si trova parimente nella descrizione dell' aï : la pelle è stata trasportata dall' America dal Sig. de la Condamine .



Num. MCCXXX.

I polmoni , e la trachea arteria dell' aï .

IN questo pezzo la trachea arteria è nella sua positura naturale ; vi si vedono le curvature ch' essa forma dentro i polmoni , e delle quali si è fatta menzione nella descrizione dell' aï .

Num. MCCXXXI.

Uno scheletro d' aï .

LA descrizione di questo scheletro si trova in quella dell' aï .

Num. MCCXXXII.

Un' unghia grandissima , che sembra essere dell' unau , o dell' aï .

IO non so se quest' unghia provenga dall' unau , o dall' aï ; rassomiglia per la sua forma alle unghie di questi due animali . Quantunque non sia intera , ha un mezzo piede di lunghezza , presa seguendo la sua curvatura , ed un pollice e mezzo di larghezza alla base . E' stata data al Gabinetto dal Sig. de la Condamine per un' unghia d' una grande specie di animale pigro .



IL SURIKATE.

Questo animale fu comperato in Olanda, sotto il nome di Surikate; trovasi esso a Surinam e nelle altre provincie dell' America meridionale: noi l'abbiamo mantenuto per qualche tempo, e in seguito il Sig. de Seve, che ha delineati con diligenza del pari, che con cognizione gli animali della nostra opera, avendo conservato questo vivo per molti mesi, mi ha comunicate le riflessioni, che ha fatte sopra le sue abitudini naturali. Questo è un animal grazioso, vivissimo, e destrissimo, cammina qualche volta diritto, e siede sovente col corpo perpendicolare, colle braccia pendenti, colla testa alta e mobile come su un perno; mettevasi in questa positura ogni volta, che voleva porsi al fuoco per iscaldarsi. Non è sì grande come un coniglio, e somiglia assai nella statura e nel pelame alla mangosta, è solo un po' più peloso, ed ha meno lunga la coda, ma nel muso, la cui parte superiore è eminente, e rilevata, somiglia più al coati, che a verun altro animale. Ha esso pure un carattere quasi unico, poichè non appartiene, che ad esso ed all' iena; questi animali sono i soli, che hanno egualmente quattro dita a ciascun piede.

Noi abbiamo nutrito questo surikate al principio con latte, perchè era assai giova-

ne; ma presto si dichiarò il suo gusto per la carne; mangiava con avidità la carne cruda, e massimamente quella di pollastro; cercava altresì di sorprendere i giovani animali: un piccolo coniglio che mantenevasi nella stessa abitazione sarebbe stato predato da lui, se si fosse permesso. Amava pure assai il pesce, e più le uova; si è veduto prendere colle sue due zampe unite delle uova poste appena nell'acqua per cuocerle; ricusava le frutta, ed anche il pane se non gli si sminuzzava a bocconi; le zampe anteriori gli servivano come allo scojattolo per recarsi il cibo alla bocca. Lambiva bevendo come il cane, e non beeva acqua se non era tiepida: la sua bevanda ordinaria era la propria orina, quantunque fosse di un odore acutissimo; scherzava co i gatti e sempre innocentemente; non faceva alcun male ai fanciulli, e non mordeva persona fuor del padrone, contro di cui aveva concepita avversione. Non usava i denti per rosicchiare, ma adoperava le unghie, e fregava il gesso e i mattoni finchè gli aveva distrutti; era così bene addimesticato, che intendeva il suo nome; andava solo per tutta la casa, e veniva dov'era chiamato. Aveva due sorte di voci, l'abbajare d'un can giovane, quand' egli s'annojava di star solo, o sentiva de' rumori fuor dell'ordinario; ed all'incontro quando era commosso per le carezze o sentiva qualche mo-

vimento piacevole, faceva uno strepito così vivo e sensibile come quello della Tabella (a) girata rapidamente. Questo animale era femmina, e pareva, che spesso si scaldasse, benchè in un clima troppo freddo, e in cui non ha potuto resistere che un inverno, malgrado la cura che gli si usava, per pascerlo e per riscaldarlo.

(a) Strumento di suono strepitoso, che si usa la Settimana Santa in vece delle Campane.



DESCRIZIONE

DEL SURIKATE.

IL surikate [*tav. VIII.*] che ha servito di soggetto per questa descrizione , era un po' più grosso d'un surmulot , esso rassomigliava moltissimo alla mangosta per la figura del corpo , e principalmente per le orecchie ; ma per la forma del muso rassomigliava di più al coati , che ad alcun altro degli animali , che s'iano stati descritti in quest' Opera . L' estremità del muso s'estendeva quattro linee di lunghezza più avanti che il labbro inferiore ; di modo che il naso era sporgente in fuori come quello de' porci , l' animale lo moveva , e lo girava in alto quando voleva odorare o mordere : le narici rassomigliavano a quelle del cane , ma il naso non aveva , come quello del cane , un solco che s'estendesse dal frammezzo delle narici fino al labbro ; questo spazio era convesso : gli occhi erano grandi , le orecchie cortissime e rotonde . Non aveva che quattro dita a ciascun piede : le unghie erano lunghissime , piccate a groundaja , e di color nero ; la pianta de' piedi aveva assai di lunghezza , principalmente ne' piedi posteriori .

Il naso , il contorno degli occhi e le orecchie erano nere , il frontale aveva un color bruno ; i lati della testa e del muso , ed il di sotto della

mascella inferiore erano di color bianco o biancastro. Tutto il restante della testa e del corpo, del collo, del dorso, della groppa, le coscie, la spalla, il braccio, la faccia esterna dell'avanbraccio, della coscia e della gamba erano di color mischiato di bianco e di bruno, di gialliccio e di nero. Aveva due sorta di pelo; il più lungo ed il più duro era di color nero; vicino alla sua radice si vedeva più alto successivamente del bianco, del nero misto di bianco, e nell'estremità era nero; l'altro pelo era più corto, più morbido e di color bruno-gialliccio. Il petto, il ventre, la faccia interna dell'avanbraccio, della coscia e della gamba, e i quattro piedi erano di color gialliccio. La coda aveva lo stesso colore, eccettuata la parte superiore ch'era mischiata di nero, e l'estremità ch'era nera. I peli più lunghi avevano fino ad un pollice e mezzo di lunghezza.

pie'd. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero misurato

in linea retta dall'estremità del muso

fino all'ano. ————— L. 0. 0.

Lunghezza della testa dall'estremità

del muso fino all'occipite ——— 0. 2. 8.

Circonferenza dell'estremità del muso 0. 2. 7.

Circonferenza del muso presa al di-

sotto degli occhi ————— 0. 3. 4.

Contorno dell'apertura della bocca — 0. 2. 3.

Distanza tra i due nasali ——— 0. 0. 1.

Distanza dall'estremità del muso e l'an-

pied. poll. lin.

golo posteriore dell' occhio ———	o. 1. 5
Distanza tra l'angolo posteriore e l'orecchia ———	o. o. 11.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro ———	o. o. 4
Apertura dell' occhio ———	o. o. 2 $\frac{1}{2}$
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi ———	o. o. 7 $\frac{1}{2}$
Circonferenza della testa tra gli occhi e le orecchie ———	o. 4. 10.
Lunghezza delle orecchie ———	o. o. 3.
Larghezza della base misurata sulla curvatura esteriore ———	o. 1. o.
Distanza tra le due orecchie presa al basso ———	o. 1. 2.
Lunghezza del collo ———	o. 1. o.
Circonferenza del collo ———	o. 4. 4.
Circonferenza del corpo presa dietro le gambe anteriori ———	o. 6. 8.
La stessa circonferenza al sito più grosso ———	o. 8. 6.
La stessa circonferenza d'avanti le gambe posteriori ———	o. 7. 9.
Lunghezza del tronco della coda ———	o. 6. o.
Circonferenza della coda all' origine del tronco ———	o. 2. 6.
Lunghezza dell' avan-braccio , dalla coda fino al gomito ———	o. 2. 6.
Circonferenza del gomito ———	o. 1. 7.

*pie*d*. poll. lin.*

Lunghezza dal gomito fino all' estre-			
mità delle unghie —————	o.	1.	8.
Lunghezza della gamba , dal ginoc-			
chio fino al tallone —————	o.	2.	5.
Lunghezza dal tallone fino all' estre-			
mità delle unghie —————	o.	2.	3.
Larghezza del piede anteriore ———	o.	o.	6.
Larghezza del piede posteriore ———	o.	o.	6.
Lunghezza delle unghie più grandi —	o.	o.	7.
Larghezza alla base —————	o.	o.	7.

Quest' animale pesava una libbra e tredici once. L' epiploon si stendeva fino all' osso pube , e si risaliva sopra gl' intestini ; era sottilissimo , ed assai carico di grassia , che formava delle grandi borse . Il fegato era situato quasi tanto a destra che a sinistra .

Il duodeno si stendeva indietro dalla parte destra fino al di là delle reni ; in seguito si ricurvava in dentro avanti di unirsi al digiuno , il quale faceva dei gran giri longitudinali nella regione ombelicale e nella parte destra : quelli dell' ileo erano pure così grandi , e porzione se ne trovava nella stessa parte destra ; in seguito passavano nella sinistra e nelle regioni ipogastriche ed ombelicali : il cieco era situato alla destra , e diretto all' indietro : il colon era cortissimo , e formava nella regione ombelicale un piccol arco , il quale era convesso in avanti , e che terminava al retto .

Il gran fondo dello stomaco era poco profondo ;

la parte destra di questo viscere aveva molta estensione, ma la porzione, che si trova al di là dell'angolo, che forma questa parte era piccolissima, e perciò vi era molta distanza tra quest'angolo e l'esofago.

Il duodeno aveva minor diametro del digiuno e dell'ileo, l'uno e l'altro erano quasi della stessa grossezza: il cieco era corto, ricurvato dalla parte dell'ileo, ed aveva un poco più di diametro alla sua estremità che alla sua origine; il colon aveva pure meno di diametro vicino al cieco, che nel rimanente della sua estensione: le membrane degl'intestini e dello stomaco erano forti e grosse.

Il fegato aveva cinque lobi, de' quali il più grande ed il più piccolo erano nel mezzo; il piccolo era attaccato alla radice del grande, questo aveva due fenditure; il legamento sospensorio attraversava la fenditura sinistra, e la vescichetta del fiele era incrostata nella destra, la quale divideva il lobo in due parti quasi eguali, la sinistra delle quali era suddivisa da un'altra fenditura; vi era un lobo alla sinistra, e due alla destra; questi erano grandi egualmente l'uno all'altro, e tutt'e due uniti non erano più voluminosi del lobo sinistro; trovavasi un piccol lobo della grossezza di una fava situato nel centro della faccia posteriore del fegato. Questo viscere aveva al di fuori un colore bruno-rossiccio, ed al di dentro era quasi dello stesso colore, ma più pallido,

pesava un' oncia e mezza , e venticinque grani .

La vescichetta del fiele aveva una figura assai particolare , essa era allungata , e quasi in forma di una pera , ma sfigurata dai tubercoli e dai ritrignimenti ; essa conteneva una mucilagine grigiastria e grommata .

La milza era quasi tanto larga all' estremità superiore e nel mezzo , che all' estremità inferiore ; essa aveva tre facce ben distinte ; era al di fuori ed al di dentro d' un color rosso-nericcio : pesava sei grossi e ventitre grani . Il fegato e la milza erano grosse e sisse come negli animali domestici , perchè l' animale , di cui si parla è stato nodrito in casa , ed era divenuto assai grasso . Le sue viscere avevano un odore , che rassomigliava a quello delle viscere del gatto .

Il pancreas era grandissimo , s' estendeva a sinistra fino all' estremità della milza , ed alla destra al lungo del duodeno fino al di là de' reni , in seguito si prolungava in avanti verso il centro del fegato , formando una specie d' anello .

Il rene destro era un poco più inoltrato che il sinistro ; i solchi che formavano i vasi sanguigni erano molto apparenti sulla faccia esteriore de' reni , il piccol catino era grande ; non eravi verun capezzolo ; le tre sostanze del rene erano ben distinte .

La parte carnosa del diaframma era grossa , ed il centro nervoso assai sottile : il polmone sinistro aveva due lobi , ed il destro quattro , come nella

maggior parte de' quadrupedi; il quarto, che si trovava vicino alla base del cuore, era quasi grosso come il primo della parte destra; il secondo aveva un poco più di volume che il primo: il cuore era quasi rotondo: il bastone dell'aorta non sporgeva che due rami; essi erano d'ineguale grossezza, il più grosso era situato al lato destro del più piccolo, e dividevasi in tre altri rami ad una linea di distanza dal tronco.

La lingua era larga, sottile, e rotonda all'estremità; il mezzo della parte anteriore era coperto di papille corte, grosse, posate indietro e terminate con una punta dura; le papille delle altre parti erano meno grandi: eranvi due grosse glandule a forma di calice nel mezzo della parte posteriore, poste l'una a canto dell'altra ad una linea e due terzi di distanza, e due altre glandule parimente a calice, collocate ognuna sopra il lato della lingua, e sopra l'istessa linea delle glandule del mezzo; sopra la lingua eranvi sparsi dei grani glandulosi e bianchi: l'epiglottide era allungata e rotonda all'estremità: il palato era attraversato da nove o dieci solchi assai irregolari, gli uni assai stretti e gli altri molto larghi; gli orli de' primi non erano interrotti nel mezzo, essi non formavano che una convessità in avanti; gli altri ne avevano due, ed erano interrotti nel mezzo.

Non si vedeva la ghianda della clitoride, ma solamente la cavità del prepuzio: trovavasi da ciascuna parte l'orifizio d'un tubo escretorio, che

terminava in una ghianda ovale , il cui maggior diametro era di tre linee e mezzo , ed il piccolo di due linee e mezzo : la vescica era piccola , ed in forma di pera ; i corni della matrice avevano quasi tanto di diametro alla loro estremità che nel restante della loro estensione : esse erano grosse , e le trombe erano altresì molto apparenti.

Trovavasi da ciascuna parte dell' ano una borsa che aveva quattro linee e mezzo di lunghezza , tre linee e mezzo di larghezza , e tre linee di grossezza ; il tubo escretorio di ciascuna di queste borse terminava dentro l' ano , esse contenevano una materia vischiosa e gialliccia.

pied. poll. lin.

Lunghezza degl' intestini tenni dal piloro fino al cieco —————	3.	1.	0.
Circonferenza del duodeno ne' siti più grosli —————	0.	1.	5.
Circonferenza ne' siti più sottili ———	0.	0.	8.
Circonferenza del digiuno nei siti più grosli —————	0.	1.	2.
Circonferenza ne' siti più sottili ———	0.	1.	0.
Circonferenza dell' ileo ne' siti più grosli —————	0.	1.	2.
Circonferenza ne' siti più sottili ———	0.	0.	11.
Lunghezza del cieco —————	0.	1.	2.
Circonferenza al sito più grosso ———	0.	1.	5.
Circonferenza al sito più sottile ———	0.	1.	0.
Circonferenza del colon ne' siti più grosli —————	0.	1.	6.

del Surikate.

95

pied. poll. lin.

Circonferenza ne' fiti più sottili —	o.	1.	4.
Circonferenza del retto vicino al colon	o.	1.	6.
Circonferenza del retto vicino all' ano	o.	1.	9.
Lunghezza del colon e del retto presi insieme —————	o.	6.	6.
Lunghezza del canale intestinale in intero, non compreso il cieco —	3.	7.	6.
Gran circonferenza dello stomaco —	o.	7.	1.
Piccola circonferenza —————	o.	5.	5.
Lunghezza del fegato —————	o.	2.	3.
Larghezza —————	o.	3.	8.
Sua maggior grossezza —————	o.	o.	6.
Lunghezza della vescichetta del fiele	o.	2.	3.
Suo maggior diametro —————	o.	o.	6.
Lunghezza della milza —————	o.	3.	6.
Larghezza dell' estremità superiore —	o.	o.	10.
Larghezza dell' estremità inferiore —	o.	1.	12.
Grossezza nel mezzo —————	o.	o.	3 $\frac{1}{2}$
Lunghezza de' reni —————	o.	o.	11 $\frac{1}{2}$
Larghezza —————	o.	o.	7 $\frac{1}{2}$
Grossezza —————	o.	o.	5.
Lunghezza del centro nervoso del diaframma, dalla vena cava fino alla punta —————	o.	o.	6 $\frac{1}{2}$
Larghezza —————	o.	o.	10.
Circonferenza della base del cuore —	o.	2.	7.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare —————	o.	1.	o $\frac{1}{2}$
Altezza dalla punta fino al sacco pol-			

pied. poll. lin.

monare —————	o.	o.	10.
Diametro dell' aorta preso exterior- mente —————	o.	o.	2.
Lunghezza della lingua —————	o.	1.	3.
Distanza tra l'ano e la vulva —————	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della vulva —————	o.	o.	3 $\frac{3}{4}$
Lunghezza della vagina —————	o.	1.	7.
Circonferenza al sito più grosso —————	o.	1.	1.
Circonferenza al sito più sottile —————	o.	o.	8 $\frac{1}{2}$
Gran circonferenza della vescica —————	o.	3.	2.
Piccola circonferenza —————	o.	2.	8.
Lunghezza dell' uretra —————	o.	o.	10.
Circonferenza —————	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del collo e del corpo del- la matrice —————	o.	o.	11.
Circonferenza —————	o.	o.	8.
Lunghezza de' corni della matrice —	o.	1.	4.
Circonferenza ne' siti più grossi —	o.	o.	4.
Lunghezza della linea curva , che trascorre la tromba —————	o.	o.	11.
Lunghezza de' testicoli —————	o.	o.	2.
Larghezza —————	o.	o.	1 $\frac{1}{3}$
Groffezza —————	o.	o.	1.

Gli ossi proprj del naso sono un poco sporgenti all' in fuori , di modo che il piano dell' apertura delle narici è inclinato dall' alto indietro ; gli orbi delle orbite degli occhi sono ossei senz' alcuna interruzione ; i rami della mascella inferiore hanno una terza apofisi al difetto della condiloidea .

I denti hanno molta relazione a quelli degli animali carnivori, come il lupo, il tasso, l'iena: essi sono in numero di trentaquattro, come quelli dell'iena, ma avvi della varietà nella situazione; i denti mascellari di quest' animale sono dieci nella mascella superiore ed otto nella inferiore; all' opposto ve ne sono nella mascella inferiore del surikate dieci mascellari ed otto nella mascella superiore. Vi sono due lunghi denti canini in ciascuna mascella, e sei piccoli incisivi; gli ultimi de' mascellari hanno diverse punte.

L'apofisi spinosa della seconda vertebra cervicale è assai grande, essa prolungasi in avanti, ed in dietro.

Esso ha quattordici vertebre dorsali, e quattordici coste da ciascuna parte, nove vere e cinque false. Lo sterno è composto di otto ossi; le due prime coste, una da ciascun lato, si articolano colla parte di mezzo del prim' osso dello sterno; l'articolazione delle seconde coste è tra 'l primo e il second' osso; quelle delle terze coste tra 'l secondo e il terz' osso, e così di seguito fino alle ottave e none coste, che si articolano tra 'l settimo e l'ottavo osso dello sterno.

Le vertebre lombari sono sei; vi sono quattro false vertebre nel sacro, e venti nella coda.

L'angolo che divide la base e la parte anteriore dell' omoplata è rotondo, la spina è molto alzata.

Il prim' ordine del carpo è composto di tre ossi,

il primo de' quali si trova al disotto dell' osso radio, ed il secondo in parte al disotto dell' osso radio, ed in parte al disotto dell' osso del gomito, il terzo è fuor di luogo. Gli ossi del second' ordine del carpo sono cinque, i due primi sono dietro la parte superiore del prim' osso del metacarpo, il terz' osso del second' ordine del carpo è al disopra del prim' osso del metacarpo, il quart' osso del carpo al disotto dell' osso secondo del metacarpo, ed il quint' osso del carpo in parte al disotto del terz' osso del metacarpo, ed in parte sotto al quarto.

Nel tarso vi sono sette ossi, cioè l'astragallo, il calcagno, lo scafoide, il cuboide e tre ossi cuneiformi, il primo de' quali è più lungo, e si estende sulla parte interna del second' osso cuneiforme, e sulla parte superiore del prim' osso del metatarso.

Gli ossi del metacarpo e del metatarso non sono che quattro, come i diti, e come nell' iena. Io non ho veduto altro animale fessipede che abbia quattro diti a cadauno de' quattro piedi.

pied. poll. lin.

Lunghezza della testa dall' estremità

della mascella fino all' occipite — o. 2. 5.

La maggior larghezza della testa — o. 1. 8.

Lunghezza della mascella inferiore

dalla sua estremità anteriore fino

all' orlo posteriore dell' apofisi con-

diloidica ————— o. 1. 8.

pied. poll. lin.

Larghezza della mascella inferiore al sito de' denti canini —————	o. o.	$3 \frac{x}{2}$
Larghezza della mascella superiore al sito de' denti canini —————	o. o.	6.
Distanza tra le orbite degli occhi, e l'apertura delle nari —————	o. o.	$6 \frac{x}{2}$
Lunghezza di quest' apertura —————	o. o.	$4 \frac{x}{2}$
Larghezza —————	o. o.	3.
Larghezza delle orbite —————	o. o.	7.
Altezza —————	o. o.	6.
Lunghezza de' denti canini —————	o. o.	$5 \frac{x}{4}$
Altezza dell' apofisi spinosa della se- conda vertebra del collo —————	o. o.	$2 \frac{x}{2}$
Larghezza —————	o. o.	7.
Lunghezza della decima costa, qual' è la più lunga —————	o. l.	8.
Lunghezza dello sterno —————	o. l. l.	
Lunghezza del corpo delle più lun- ghe vertebre lombari —————	o. o.	5.
Lunghezza delle più lunghe false ver- tebre della coda —————	o. o.	$5 \frac{x}{2}$
Larghezza della parte superiore dell' osso dell' anca —————	o. o.	6.
Altezza dell' osso, dal mezzo della cavità cotiloidea fino al mezzo del lato superiore —————	o. l.	l.
Larghezza del catino —————	o. o.	$9 \frac{x}{2}$
Altezza —————	o. l.	l.
Lunghezza dell' omoplata —————	o. l.	7.

pied. poll. lin.

Lunghezza dell' umero —————	o.	1.	11.
Lunghezza dell' osso del gomito ———	o.	2.	2.
Altezza dell' olecranio —————	o.	o.	3.
Lunghezza dell' osso radio —————	o.	1.	$9\frac{1}{2}$
Lunghezza del femore —————	o.	2.	$1\frac{1}{2}$
Lunghezza della tibia —————	o.	2.	4.
Lunghezza del peroneo —————	o.	2.	2.
Altezza del carpo —————	o.	o.	2.
Lunghezza del calcagno —————	o.	o.	$6\frac{1}{2}$
Altezza del prim' osso cuneiforme , e dello scafoide presi insieme ———	o.	o.	2.
Lunghezza del second' osso del meta- carpo , ch' è il più lungo ———	o.	o.	8.
Lunghezza del quarto , ch' è il più corto —————	o.	o.	6.
Lunghezza del secondo e del terz' osso del metatarso, che sono i più lunghi	o.	o.	11.
Lunghezza del quarto , ch' è il più corto —————	o.	o.	$9\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del secondo dito de' piedi anteriori —	o.	o.	3.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$3\frac{2}{3}$
Lunghezza della terza —————	o.	o.	5.
Lunghezza della prima falange del secondo e del terzo dito de' piedi posteriori —————	o.	o.	4.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$2\frac{1}{3}$
Lunghezza della terza —————	o.	o.	3.

IL TARSIERE.

Abbiamo avuto questo animale a caso e da persona, la quale non ha potuto dirci nè d'onde venisse, nè come si chiamasse: esso è affai rimarchevole per l'eccessiva lunghezza delle gambe posteriori; le ossa dei piedi, e massimamente quelle, che compongono la parte superiore del tarso sono di una smisurata grandezza, e da questo carattere sensibilissimo noi ne abbiamo derivato il nome. Nondimeno il tarsiere non è il solo animale, le cui gambe posteriori sieno così formate: la Gerboisa ha il tarso ancor più lungo, onde questo nome Tarsiere, che abbiamo dato oggidì a questo animale non debb'essere preso che per un nome precario, che si dovrà cangiare quando si verrà in cognizione del suo vero nome, cioè del nome, che ha nel paese da lui abitato. La gerboisa si trova nell'Egitto, nella Barberia, e nelle Indie orientali: ho tosto immaginato, che il tarsiere potesse essere dello stesso continente e dello stesso clima, perchè al primo vederlo pareva, che gli somigliasse assai (a); questi due animali sono della stessa

(a) Per avere un'idea chiara del paragone di questi due animali, preghiamo il Leggitore di osservare la figura della Gerboisa esposta da M. Ed-

grandezza, non sono più grossi di un ratto di mezzana grossezza, hanno le gambe di dietro eccessivamente lunghe, e quelle d'innanzi estremamente corte; hanno la coda prodigiosamente lunga e vestita di peli all'estremità; hanno gli occhi grandissimi, le orecchie diritte, larghe e aperte: hanno la parte inferiore delle lunghe gambe senza pelo, mentre tutto il resto del corpo ne è coperto; questi animali avendo comuni questi caratteri singolarissimi, e che non appartengono, che ad essi, pare che si dovrebbe presumere, che sieno di specie vicine, o almeno di specie prodotte dallo stesso cielo e dalla terra stessa; tuttavia paragonandoli in altre parti, si dee non solo dubitare, ma ancora presumere del contrario. Il tarsiere ha cinque dita ad ogni piede; ha per così dire, quattro mani; perchè queste cinque dita sono lunghissime e ben separate; il pollice dei piedi di dietro è terminato da un'unghia piatta, e quantunque le unghie degli altri diti sieno acute, sono tutte insieme sì corte e sì piccole, che non impediscono all'animale di servirsi de' suoi quattro piedi, come di mani; la gerboisa al contrario non ha che quattro diti e quattro unghie lun-

wards nelle sue spigolature, pag. 18., e di confrontarla con quella, che noi qui proponiamo del Tarsiere.

ghe e curve ai piedi anteriori, ed in luogo del pollice non ha che un tubercolo senza unghia ; ma ciò che la allontana anche di più dal nostro tarsiere si è , che non ha che tre diti o tre grandi unghie ai piedi di dietro : questa differenza è troppo grande , per riguardare questi animali come specie vicine , e non sarebbe impossibile che fossero ancora lontanissime a riguardo del clima ; perchè il tarsiere colla sua piccola statura , colle sue quattro mani , co' suoi lunghi diti , colle sue piccole unghie , colla sua grande coda , co' suoi lunghi piedi pare , che si avvicini assai alla marmosa , al cajopollino e ad un altro piccolo animale dell' America meridionale , di cui noi parleremo nell' articolo che segue . Si vede , che noi non facciamo qui che esporre i nostri dubbj , e si dee intendere , che noi faremmo tenuti a quelli , che ce li potessero togliere indicandoci il clima e il nome di questo piccolo animale .



DESCRIZIONE DEL TARSIERE.

IL tarsiere [tav. IX.] è un piccolo animale conformato in una struttura assai straordinaria, ha le gambe posteriori eccessivamente lunghe a paragone di quelle anteriori, e principalmente nella parte, che corrisponde al collo del piede ed al tallone dell'uomo; questa parte, che gli Anatomici chiamano il *tarso*, è egualmente lunga che il restante del piede dell'animale, ch'è il soggetto di questa descrizione, quantunque abbia i diti assai lunghi.

Il corpo di quest'animale non è più grande di quello del mulot; ma le gambe posteriori sono più lunghe che il corpo, il collo e la testa presi insieme; la testa m'è sembrata altrettanto rotonda per quanto io abbia potuto giudicare dalle proporzioni di quest'animale, sopra un individuo disseccato e raccorciato dopo lungo tempo; esso aveva il muso cortissimo e sottile, gli occhi eccessivamente grandi, e situati assai presso l'uno all'altro; le orecchie lunghe, dritte, nude e trasparenti come quelle dei ratti, la coda era assai lunga, essa non aveva pelo che alla sua origine ed alla sua estremità; e non m'è sembrato che siasi diminuito dopo la morte dell'animale; quest'animale aveva a ciascun piede cinque diti sottili ed assai lun-

Descriz. del Tarsiere. 105

lunghi; quelli de' piedi posteriori erano tanto lunghi come gli anteriori; le unghie erano piccolissime, attaccate all' estremità de' diti, di colore biancastro ed acute, eccetto quella del pollice del piede posteriore ch' era piana; questo pollice era grosso e scostato dagli altri diti, come il pollice d'una mano, ma tanto lungo come il secondo dito.

Il pelo del tarsiere era come una specie di lana, lunga sei in sette linee, assai morbido, di colore cenerino-nericcio sulla maggior parte della sua lunghezza dopo la sua radice, e di color fulvo-carico alla sua estremità, sul dorso, sulla groppa e sul ventre, e più chiaro nel rimanente del corpo: aveva quasi nulla di color fulvo sopra la testa, essa era di color grigio-cenerino, principalmente sulle guance, nel qual luogo avea del pelo lungo; il cenerino dominava altresì con il fulvo sopra tutto il corpo, i piedi erano nudi.

Il tarsiere ha trentadue denti, cioè due incisivi e due canini a ciascuna mascella, e sei mascellari in ciascuna parte; gl' incisivi sono acuti, quelli di sotto sono più stretti l' uno contro l' altro che quelli di sopra; i canini della mascella inferiore sono molto lunghi, ed un poco ricurvati indietro, quelli della mascella superiore sono diritti ed assai corti; i tre primi mascellari da ciascuna parte delle mascelle non hanno che una punta.

IL FALANGIERE.

Questi animali, che ci sono stati inviati maschi e femmine sotto il nome di *Ratti di Surinam*, hanno assai meno di rapporto coi ratti, che cogli animali dello stesso clima, di cui abbiamo data la storia sotto il nome di *Marmosa* e di *Cajopollino*. Si può vedere dalla descrizione esattissima, che ne ha fatta il Sig. Daubenton, quanto sieno lontani dai ratti, massimamente quanto all'interiore. Abbiamo dunque avvisato di dover rigettare questa denominazione di *ratti di Surinam*, siccome compolta, ed in oltre siccome mal applicata; e perchè nessun Naturalista, nessun Viaggiatore ha nominato, nè indicato questo animale, noi abbiamo creato il suo nome e l'abbiamo derivato da un carattere, che non si trova in nessun altro animale: l'abbiamo denominato *Falangiere*, perchè ha le falangi singolarmente formate, e perchè di quattro dita, che corrispondono a cinque unghie, onde i suoi piedi posteriori sono armati, il primo è congiunto col suo vicino tal che questo doppio dito si biforca, e non si separa che all'ultima falange per giugnere alle due unghie. Il pollice è separato dagli altri diti, e non ha unghia alla sua estremità: quest'ultimo carattere, quantunque rimarchevole non è unico; il cari-

gueja e la marmosa hanno il pollice alla stessa guisa, ma niuno ha come questo le falangi unite.

Sembra, che questi animali variino in fra di loro per i colori del pelo, come si può vedere dalle figure del maschio e della femmina. Essi sono della statura di un piccolo coniglio, o di un grossissimo ratto, e sono rimarchevoli per la eccessiva lunghezza della loro coda, per lo sporgimento del loro muso e per la forma de' loro denti, la qual sola basterebbe per far distinguere il falangiere dalla marmosa, dal carigueja, dai ratti e da tutte le altre specie di animali, ai quali si voessero riferire.



DESCRIZIONE DEL FALANGIERE.

IL falangiere [*tav. X.*] è della grandezza quasi del *furmulot*: è stato mandato da Surinam; non è a mia cognizione, che niuno Autore ne abbia parlato; chiamasi falangiere, perchè in alcune falangi de' diti ha un carattere assai stravagante, e ch'è particolare a lui solo; il primo ed il secondo dito de' piedi anteriori sono quasi interamente uniti insieme sotto la pelle, essi non sono divisi l'un dall'altro che dall'ultima falange. Quest'animale è poco diverso dal *carigueja*, dalla *marmosa* e dal *cayopollino* per la forma della coda e del pollice de' piedi posteriori, ed ha molta rassomiglianza alla *marmosa* per una piega trasversale che forma la pelle sopra il suo ventre; ma ha il muso più lungo che il *carigueja*, la sommità della testa meno piatta, e le orecchie assai più corte, esse sono quasi del tutto nascoste dal pelo, che le ricopre di fuori e di dentro; i quattro piedi sono a proporzione più grossi di quelli del *carigueja*, e le unghie sono più grandi, e s'estendono molto al di là de' tubercoli, che sono all'estremità de' diti; il pollice de' piedi posteriori non ha punto d'unghia; esso non solo è difeso da' diti, ma pare che gli siano rivoltati indietro, e posti a lato del tallone, per il che

Descriz. del Falangiere. 109

la pianta del piede si rende assai larga. I due primi diti sono piccoli in paragone del pollice, e delli due ultimi; sono pure più corti, e pare che non abbiano che una sola falange, perchè sono, come si è detto, riunite insieme all' origine di questa falange, che porta l' unghia, e ch' è la terza; ma si sente al di sopra della pelle ciascuno de' due diti, che ne formano un solo all' estremità nella lunghezza delle due prime falangi; questa struttura mi è sembrata così stravagante, che io l'avrei supposta una mostruosità, se non l'avessi veduta non solamente nei piedi posteriori del Falangiere, che ha servito di soggetto per questa descrizione, e ch' era femmina, ma ancora in quelli d' un maschio. La coda era interamente coperta di pelo sopra la quarta parte in circa della sua lunghezza dopo la sua origine; l'altra quarta parte seguente non ha pelo che sulla parte superiore, il di sotto è nudo come tutto il rimanente della coda; il lato inferiore dell' ultima quarta parte è quasi liscio, non vi sono se non delle piccole grinze, rassomiglia al palmo della mano; così l'estremità della coda è rivolta al basso, e si può credere che l'animale se ne serva come di mano per attaccarsi e per prendere diverse cose; tutto il rimanente della parte nuda della coda è pieno di tubercoli e di grosse grinze trasversali.

Il disopra del muso, la fronte, la sommità della testa, le orecchie, il disopra del collo, le spalle, il dorso, i lati del corpo, la groppa, il lato

superiore della parte della coda , ch' è coperta di pelo , la faccia esteriore del braccio , dell' avambraccio , della coscia e della gamba , ed il disopra de' quattro piedi erano mischiati di rossiccio , di cenerino-pallido e di gialliccio . Esso aveva una fascia nericcia , che s' estendeva dall' occipite a tutta la lunghezza del collo , del dorso fino all' estremità de' lombi ; questa fascia era larga circa tre linee : i lati del muso , della testa e del collo , la mascella inferiore , la gola , il disotto del collo , il petto , il ventre , il lato inferiore della parte della coda , ch' è guernita di pelo , e la faccia interna delle quattro gambe erano mischiate di color bianco sporco e di gialliccio : la porzione della coda , che non aveva pelo , era in parte bruna ed in parte gialliccia .

piec. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	o. 3. 9.
Lunghezza delle orecchie —————	o. o. 5.
Lunghezza della base misurata sulla curvatura esteriore —————	o. o. 9.
Distanza tra le due orecchie presa al basso —————	o. 1. o.
Lunghezza del collo —————	o. o. 8.
Circonferenza del collo —————	o. 2. 6.
Lunghezza del tronco della coda —	o. 10. o.
Circonferenza della coda all' origine del tronco —————	o. 2. 3.

del Falangiere.

III

pied. poll. lin.

Lunghezza dell' avan-braccio dalla			
giuntura fino al gomito —————	o.	1.	9.
Larghezza dell' avan-braccio al go-			
mito —————	o.	o.	7.
Grosshezza allo stesso sito —————	o.	o.	5.
Circonferenza della giuntura —————	o.	1.	2.
Circonferenza del metacarpo —————	o.	1.	2.
Lunghezza dalla giuntura fino all'			
estremità delle unghie —————	o.	1.	o.
Lunghezza della gamba dal ginocchio			
fino al tallone —————	o.	2.	o.
Larghezza dell' alto della gamba —	o.	1.	o.
Grosshezza —————	o.	o.	5.
Larghezza al sito del tallone ———	o.	o.	5.
Circonferenza del metatarso —————	o.	1.	9.
Lunghezza dal tallone fino all' estre-			
mità delle unghie —————	o.	1.	8.
Larghezza del piede d' avanti ———	o.	o.	7 $\frac{1}{2}$
Larghezza del piede posteriore ———	o.	1.	1.
Larghezza delle unghie più grandi —	o.	o.	4.
Larghezza alla base —————	o.	o.	1.

L'epiploon s' estendeva fino alla regione ombelicalica; il fegato era grandissimo, e situato egualmente a destra che a sinistra, lo stomaco era posto tutto a sinistra.

Il duodeno si estendeva indietro al lungo della parte destra fino nella regione ipogastrica, dove si ripiegava in avanti; i giri del digiuno e dell'ileo erano nella regione ombelicalica; l'ileo termi-

nava al cieco nel mezzo di questa regione. Il cieco era grosso ed assai lungo, occupava le regioni ipogastriche, l'iliaca e la lombare sinistra. Il colon s'estendeva dalla metà della regione ombelicale fino all'estremità della regione iliaca destra, nella qual parte si ripiegava in fuori, e si prolungava in avanti nel lato destro fino all'ipocondro della medesima parte, in seguito faceva dei giri nella regione epigastrica e nell'ombelicale sopra gl'intestini tenui; per ultimo passava nell'ipocondro sinistro, e s'estendeva nella parte sinistra fino al retto.

Gl'intestini tenui avevano dal piloro fino al cieco cinque piedi e dieci pollici di lunghezza, quella del cieco era d'un piede e due pollici, il colon ed il retto presi insieme, avevano due piedi e due pollici; di modo che la lunghezza del canale intestinale in tutto, non compreso il cieco, era di otto piedi. Gl'intestini tenui avevano quasi tutti la stessa grossezza. Il cieco [A B C D E, tav. XII., fig. 1.] era lunghissimo, e terminava in punta, ed era quasi grosso come il colon [F] ed il retto.

La parte sinistra dello stomaco era assai più grossa della destra, il gran fondo aveva un lungo diametro; la porzione della parte destra, che si trova tra la piegatura di questa parte ed il piloro era cortissima, ed aveva poco di diametro.

Il fegato aveva un gran lobo, due mezzani e due piccoli, il grande era situato nel mezzo, e diviso in tre porzioni quasi eguali da due fen-

diture ; la vescichetta del fiele trovavasi nella fenditura destra , ed il legamento sospensorio era attaccato alla faccia anteriore della parte di mezzo del gran lobo vicino alla fenditura sinistra ; i due lobi mezzani erano situati uno a destra e l'altro a sinistra del gran lobo , i due piccoli erano attaccati alla radice del lobo destro , ed erano ben distinti ; ma i due lobi di mezzana grandezza non erano separati dalla radice del grande , perchè le fenditure che formavano queste separazioni non erano più profonde di quelle , che dividevano il lobo grande in tre parti , di modo che sembrava che il lobo destro e sinistro fossero parti del gran lobo , il quale in questo caso sarebbe stato composto di cinque parti , ed il fegato intero non avrebbe avuto che un lobo grandissimo e due piccoli . La vescichetta del fiele era assai grande , e più gonfiata nel mezzo che alle sue estremità .

La milza rassomigliava a quella della marmosa .

Il rene destro era più inoltrato che 'l sinistro della metà della sua lunghezza ; essi non avevano veruna profondità , di maniera che la parte interna era in linea retta ; il restante della circonferenza formava quasi un arco di cerchio ; il piccolo cattino era corto .

Il polmon destro aveva tre lobi assai distinti , uno assai grande , che corrispondeva al lobo anteriore ed al posteriore degli altri animali , che hanno quattro lobi nel polmone ; trovavasi un lobo incrostato nel mezzo della sua parte inferiore del

gran lobo, ed un piccolo situato vicino alla base del cuore; il polmon destro del falangiere avrebbe avuto quattro lobi simili a quelli della maggior parte degli altri animali, se il lobo che non era se non incrostato nel grande l'avesse diviso fino alla radice in lobo anteriore e posteriore. Non vi era se non che un lobo nel polmone sinistro, esso era un poco incaneherito nel mezzo del lato inferiore. Il cuore era allungato ed acuto; il bastone dell' aorta gettava due rami.

La pelle formava tra la regione ombelicale e la regione ipogastrica una gran piegatura trasversale, che aveva quattro linee d'altezza nel mezzo: era convesso indietro e concavo in avanti in forma di luna crescente, le cui estremità erano distanti l'una dall'altra. Mi sono accorto, che alla parte anteriore della concavità della piegatura, sopra la pelle del ventre, vi erano due piccoli orifizj da ciascun lato, l'uno avanti, l'altro indietro a due linee di distanza, il posteriore era situato un poco più all' indentro che l' anteriore; aprendo ciascuno di questi orifizj, ho trovato un capezzolo assai apparente, quantunque piccolo.

La vulva non si distingueva dall' ano, se non perch' essa formava una piccola fenditura longitudinale, che terminava in un'altra piccola fenditura trasversale, che formava l' ano. Il tramezzo che separava il retto e la vagina non cominciava che a tre linee di distanza degli orli dell' ano e della vulva. Aveva ai lati dell' ano e della vulva

una borsa ovale , il di cui maggior diametro era di quattro linee , ed il minore di due e mezzo . Vi era da ciascun lato dell' ane una ghianda parimente di forma ovale , il maggior diametro della quale era di tre linee , ed il minore d' una linea e mezzo ; questa ghianda aveva una piccola cavità nel centro , essa era attaccata ad un picciuolo della lunghezza di una linea e mezzo , che terminava all' estremità superiore della borsa , della quale si è parlato .

La testa dello scheletro del falangiere ha il muso corto e l' osso frontale concavo fra le due orbite , le quali sono assai grandi , il loro orlo osseo è interrotto nella sua parte posteriore alla quinta parte della circonferenza delle orbite , onde l' osso frontale non ha veruna apofisi orbitaria . I rami della mascella inferiore hanno al di sotto dell' apofisi condiloidea una terza apofisi larga , che si stende obbliquamente in dentro ed al basso . Avvi sopra la faccia esterna di questi rami una spina assai sporgente in fuori , che forma una concavità grande al di sotto dell' apofisi coronioidea .

I denti sono assai diversi da quelli del carigueja e di qualunque altro animale ; ve ne sono diciotto nella mascella superiore , e quattordici nella inferiore . Nella mascella superiore vi sono otto denti incisivi di grandezza e di forma assai diversi ; il primo ed il quarto di ciascun lato sono acuti e più lunghi degli altri due ; i secondi sono grossi , corti e larghi ; i terzi sono assai piccoli : gl' incisivi in-

feriori non sono che due ; essi hanno a un di presso la medesima grossezza che i secondi superiori , ma sono assai lunghi e terminati a foggia di un manico di cucchiajo ; quando la bocca è chiusa , essi toccano i secondi incisivi superiori , e sono in parte dietro a quelli di mezzo . Avvi uno spazio voto tra l'ultimo dente incisivo di sopra , ed il primo mascellare , questi due denti sono della stessa forma ; il secondo mascellare è assai piccolo e cortissimo ; appena forte dall' alveolo ; gli ultimi sono mascellari grossi , essi hanno molte punte , l'ultimo di questi denti è il più grosso , il secondo , il terzo ed il quarto dente della mascella di sotto sono piccolissimi , essi non sporgono più infuori dell' alveolo che il sesto dente superiore ; i tre ultimi inferiori sono molari grossi , che hanno diverse punte , il penultimo di questi denti è il più grande .

Le vertebre cervicali sono poco lunghe , e le loro apofisi sono poco estese .

Vi sono tredici vertebre dorsali e tredici coste da ciascun lato , sette vere e sei false ; lo sterno m'è sembrato composto di sette ossi , ma non erano tutti ben formati . Le vertebre lombari sono sei , le apofisi di queste vertebre e delle dorsali sono a proporzione così piccole che quelle delle vertebre cervicali ; non vi sono che due false vertebre nel sacro , come in quello del carigueja , della marmosa e del cayapollino ; ve ne sono ventinove nella coda , come in quella del carigueja e della marmosa .

La parte anteriore dell' osso delle anche ha poca larghezza , i fori ovali sono assai grandi e quasi rotondi .

Il falangiere ha degli ossi soprannumerarj nel catino , come nel carigueja , nella marmosa e nel cayopollino ; questi ossi hanno nove linee di lunghezza .

L' omoplata è stretto , ma la sua spina ha molto di altezza .

Le clavicole sono assai curve ; le ossa del braccio , dell' avan-braccio , della coscia e della gamba sono poco diverse da quelle del carigueja .

Io non ho veduto che un osso nel prim' ordine del carpo , gli altri non erano ancora formati ; eranvene quattro nel second' ordine , i tre primi erano al di sopra de' tre primi ossi del metacarpo , ed il quart' osso del carpo al di sopra degli ultimi due del metacarpo .

Non vi erano che sette ossi nel tarso del falangiere , come nella maggior parte degli altri animali ; il primo cuneiforme era assai grande , e s' articolava dal lato interno col prim' osso del metatarso , il quale era pure assai grande e diretto indentro ; il pollice non aveva che una falange , almeno io non ho conosciuta verun' apparenza della seconda ; il secondo ed il terz' osso del metatarso e le falangi del primo e del secondo dito erano assai più piccole che gli ultimi due ossi del metatarso e le falangi degli ultimi due diti ; la prima e la seconda falange del primo dito erano unite a quelle delle seconde .

pied. poll. lin.

Lunghezza della testa dall' estremità della mascella superiore fino all' oc- cipite —————	O.	2.	1 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della mascella inferiore dalla sua estremità fino all' orlo po- steriore dell' apofisi condiloidea —	O.	1.	7.
Distanza tra le orbite e l' apertura delle nari —————	O.	O.	7. $\frac{3}{4}$
Lunghezza di quest' apertura ———	O.	O.	2 $\frac{1}{4}$
Larghezza —————	O.	O.	2 $\frac{3}{4}$
Lunghezza degli ossi proprj del naso	O.	O.	9.
Larghezza al sito più largo ———	O.	O.	2 $\frac{1}{2}$
Altezza delle orbite —————	O.	O.	7.
Lunghezza de' denti incisivi più lun- ghi al di fuori dell' osso ———	O.	O.	4.
Lunghezza de' denti mascellari più lunghi —————	O.	O.	1 $\frac{2}{3}$
Larghezza —————	O.	O.	2 $\frac{1}{3}$
Grosshezza —————	O.	O.	1 $\frac{2}{3}$
Larghezza dell' apertura della prima vertebra cervicale dall' alto al basso	O.	O.	1 $\frac{3}{4}$
Lunghezza da un lato all' altro —	O.	O.	3.
Lunghezza delle ultime vertebre lom- bary, che sono le più lunghe —	O.	O.	4.
Lunghezza dell' ottava costa, qual' è la più lunga —————	O.	1.	6.
Lunghezza dell' osso sacro ———	O.	O.	7.
Larghezza della parte anteriore —	O.	O.	6 $\frac{1}{2}$
Lunghezza delle più lunghe false ver-			

pied. poll. lin.

tebre della coda	o.	o.	5.
Larghezza della parte anteriore dell'osso dell'anca	o.	o.	3.
Lunghezza dal mezzo della cavità cotiloidea	o.	1.	1.
Lunghezza della grondaia del catino	o.	o.	6.
Larghezza	o.	o.	6.
Profondità	o.	o.	5 $\frac{1}{2}$
Lunghezza de' fori ovali	o.	o.	5 $\frac{1}{2}$
Larghezza	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Larghezza del catino	o.	o.	5 $\frac{1}{2}$
Altezza	o.	o.	9.
Lunghezza dell'omoplata	o.	1.	0 $\frac{3}{4}$
Larghezza al sito più largo	o.	o.	5.
Larghezza al sito più stretto	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Altezza della spina al sito più elevato	o.	o.	2.
Lunghezza delle clavicole	o.	o.	9.
Lunghezza dell'umero	o.	1.	5.
Lunghezza dell'osso del gomito	o.	1.	10.
Altezza dell'olecranio	o.	o.	2.
Lunghezza del radio	o.	1.	7.
Lunghezza del femore	o.	1.	10.
Lunghezza della tibia	o.	1.	8.
Lunghezza del peroneo	o.	1.	8.
Lunghezza del terz' osso del metacarpo, ch'è il più lungo	o.	o.	4.
Larghezza della prima falange del secondo dito anteriore, ch'è il più			

	pied.	poll.	lin.
lungo —————	o.	o.	3 $\frac{1}{4}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	2.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	1 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del pollice —————	o.	o.	2.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	1 $\frac{3}{4}$
Lunghezza del prim' osso del metatarso —————	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del secondo e del terzo —	o.	o.	4.
Lunghezza degli ultimi due —————	o.	o.	5.
Lunghezza della falange del pollice del piede posteriore —————	o.	o.	3.
Lunghezza della prima falange de' due primi diti —————	o.	o.	3.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	2.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange degli ultimi due diti —————	o.	o.	5.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	3.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$

Io ho tagliato un altro falangiere [tav. XI.], il quale all' esteriore non era diverso da quello [tav. X.] del quale io ho data la descrizione, se non se perchè era più grande, ed aveva un colore mischiato di bianco sporeo e di gialliccio, con macchie nericee; queste macchie erano piccole e poco apparenti sulla testa, all' opposto ne avea molte, e più grandi di sopra al collo, sul garrot, sopra le spalle e sopra la faccia esteriore

del braccio e della gamba, di modo che il nero dominava sul biancastro; le macchie erano ancora più grandi e più cariche, ma in piccol numero, sopra il dorso, sopra i lati del corpo e sopra la faccia esteriore della coscia: il pelo era folto, e rassomigliava in qualche modo alla natura della lana, aveva circa nove linee di lunghezza; la parte della coda ch'era nuda, aveva un colore gialliccio; quest' animale era maschio.

ped. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misu-		
rato in linea retta dall' estremità		
del muso fino all' ano —————	o. 10.	5.
Lunghezza della testa, dall' estremità		
del muso fino all' occipite ————	o. 2.	6.
Circonferenza dell' estremità del muso	o. 2.	7.
Circonferenza del muso, presa al di-		
sotto degli occhi —————	o. 3.	6 $\frac{1}{2}$
Contorno dell' apertura della bocca —	o. 1.	o.
Distanza tra i due nasali —————	o. o.	3.
Distanza tra l' estremità del muso,		
e l' angolo anteriore dell' occhio —	o. o.	11.
Distanza tra l' angolo posteriore e l' o-		
recchia —————	o. 1.	1 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell' occhio da un angolo		
all' altro —————	o. o.	5.
Apertura dell' occhio —————	o. o.	2 $\frac{1}{2}$
Distanza tra gli angoli anteriori degli		
occhi, seguendo la curvatura del		
frontale —————	o. o.	9.

	pied. poll. lin.	
La stessa distanza in linea retta —	o.	o. 7.
Circonferenza della testa tra gli occhi e le orecchie —	o.	5. o.
Lunghezza delle orecchie —	o.	o. 9.
Larghezza della base, misurata sulla curvatura esteriore —	o.	o. 8.
Distanza tra le due orecchie presa al basso —	o.	1. 4.
Lunghezza del collo —	o.	o. 10.
Circonferenza del collo —	o.	3. 8.
Circonferenza del corpo presa dietro le gambe anteriori —	o.	6. 6.
La stessa circonferenza al sito più grosso —	o.	7. 6.
La stessa circonferenza d'avanti le gambe posteriori —	o.	6. 3.
Lunghezza del tronco della coda —	o.	9. 8.
Circonferenza della coda all' origine del tronco —	o.	2. 4.
Lunghezza dell' avan-braccio dal go- mito fino alla giuntura della mano	o.	2. 4.
Circonferenza della giuntura della mano —	o.	1. 7.
Circonferenza del metacarpo —	o.	1. 6.
Lunghezza dalla giuntura fino all' e- stremità delle unghie —	o.	1. 5.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —	o.	2. 6.
Lunghezza dal tallone fino all' estre-		

del Falangiere . 123

pied. poll. lin.

mità delle unghie —————	o.	1.	11.
Larghezza del piede anteriore ———	o.	o.	10.
Larghezza del piede posteriore ———	o.	1.	3.
Lunghezza delle unghie più grandi —	o.	o.	4.
Larghezza alla base —————	o.	o.	1.

All' apertura dell' addomine , l' epiploon si è trovato nascosto tra lo stomaco e gl' intestini ; il fegato e lo stomaco erano situati come nell' altro falangiere .

Il duodeno non s' estendeva che fino alla regione ombelicale , l' ileo terminava nel cieco nella parte anteriore di questa regione ; il cieco s' estendeva indietro nel lato destro , si piegava indentro , si prolungava in avanti nella regione ombelicale , si ripiegava ancora indentro , e si prolungava indietro fino nella regione ipogastrica , dove si curvava in alto , ed in seguito s' estendeva in avanti sotto la spina del dorso fino alla parte anteriore della regione ombelicale ; il colon formava una piccola sinuosità nel lato destro , ed un grand' arco dietro lo stomaco sopra gl' intestini tenui , s' estendeva indietro , nella parte sinistra , fino alla regione ipogastrica , ove si ricurvava in alto e si prolungava in avanti sulla lunghezza della parte sinistra , in seguito si ripiegava in vicinanza della milza , e s' estendeva indietro nella medesima parte fino al retto .

Gl' intestini tenui avevano due piedi e dieci pollici di lunghezza dal piloro fino al cieco , il quale

era di cinque pollici e mezzo; il colon ed il retto presi insieme avevano un piede e mezzo di lunghezza, di modo che la lunghezza totale del canale intestinale, non compreso il cieco, era di quattro piedi e quattro pollici; i siti più grossi del duodeno avevano fino un pollice e mezzo di circonferenza; il digiuno era più sottile, e l'ileo [A B, *tav. XII.*, *fig. 2.*] aveva ancora un diametro minore, non vi era che nove o dieci linee di circonferenza nei siti più piccoli; il cieco [C D E F] era a un di presso così grosso come il digiuno, e terminava in punta; il colon [G H] ed il retto non erano più grossi dell'ileo.

Il gran fondo dello stomaco aveva una grande profondità, ed una figura conica; la parte destra era quasi della stessa forma, ma più allungata; l'angolo di questa parte si trovava quasi egualmente distante dall'esofago e dal piloro; ma tutte le viscere dell'animale, di cui si parla, erano raccorciate dalla forza dello spirito di vino. Vi erano quattro grosse piegature [A B C D, *tav. XII.*, *fig. 3.*] che si stendevano sopra le pareti interiori dello stomaco dal piloro [E] fino verso il fine del gran fondo; fra queste piegature se ne trovavano delle altre [G H] come piccoli rami laterali, che rassomigliavano ad orifizj; eravi una specie di freno trasversale [I] il quale era situato tra 'l piloro e l'esofago [K] e che formava una cavità tra quella ed il piloro.

La milza era assai lunga, essa aveva sulla parte

esterna una prominenza acuta , quasi nello stesso sito , ov' è il terzo ramo della milza della marmosa e del cayopollino.

Il fegato rassomigliava a quello dell' altro falangiere pel numero e per la situazione dei lobi , ed a quella della vescichetta del fiele ; ma il lobo di mezzo , dalla parte sinistra , era interamente separato dal lobo di mezzo ; il legamento sospensorio era attaccato all' orlo della fenditura sinistra del lobo grande , ed in oltre aveva un secondo legamento , al quale era attaccato l' orlo sinistro del gran lobo.

I reni erano situati l' uno vicino all' altro .

Il centro nervoso del diaframma era assai esteso ; i polmoni non erano diversi da quelli dell' altro falangiere , se non perchè il destro aveva nella sua parte inferiore due fenditure profonde , le quali tra loro formavano quasi un piccol lobo : il cuore era rivolto obbliquamente a sinistra .

Eranvi tre ghiande a foggia di calice sulla parte posteriore della lingua , una indietro e due altre in avanti ; l' epiglottide era lunga e scanalata nel mezzo ; il palato aveva nove solchi trasversali .

Il cervelletto era situato dietro il cervello , come nella maggior parte dei quadrupedi ; aveva delle scanalature , ma il cervello non aveva alcun rivolgimento .

La verga era assai piccola , situata sotto il retto , e diretta in avanti ; mi è sembrato che la ghianda fosse piatta nel disopra e nel disotto , e rotta alla

126 *Descriz. del Falangiere.*

sua estremità , e che l'orifizio dell' uretra fosse situato sulla faccia inferiore della ghianda ad una linea di distanza della sua estremità . Eravi una ghianda da ciascun lato del prepuzio : ma io non ho riconosciuto nè le vescichette feminali , nè le prostatiche . La vescichetta aveva una forma ovale ; i canali deferenti erano assai lunghi per sortir fuori dell' addomine , ove i testicoli si trovavano vicini allo scroto .



IL COQUALLINO.

HO rilevato, che questo animale mandoci dall' America sotto il nome di *Scojattolo dorato*, era lo stesso che Fernandes (a) ha indicato sotto quello di *Quauhcallotquapachli* o *Coziocoteguallin*; ma siccome queste parole del linguaggio Messicano sono troppo difficili da pronunciarsi da noi, ho ristretto il secondo, e ne ho fatto *Coquallino*, che sarà d' ora in avanti il nome di questo animale. Esso non è uno scojattolo, quantunque gli somiglj assai nella figura e nel pennacchio della coda; perchè n' è diverso non pure per molti caratteri esteriori, ma altresì pel naturale e pei costumi.

Il coquallino è assai più grande dello scojattolo, *in duplam fere crescit magnitudinem*, dice Fernandes, è un animale grazioso, e rimarchevolissimo pe' suoi colori; ha il ventre colorito di un bel giallo, e la testa, siccome il corpo, mista di bianco, nero, bruno, e d'arancio; si copre colla sua coda, come lo scojattolo, ma non ha, com' esso, dei pennelli di pelo all' estremità delle orecchie; esso non sale sugli alberi;

(a) Fr. Fernandès. *Histor. anim. Nov. Hispan.* cap. xxvi., pag. 8.

128 *Storia Nat. del Coquallino.*

abita, come lo scojattolo di terra (a), che abbiamo denominato lo *Svizzero*, ne buchi e sotto le radici degli alberi; ivi fa il suo covo, e vi alleva i suoi parti; empie pure la sua abitazione di semi e di frutti per nodrirsi d'inverno; è diffidente e scaltrito, e parimente feroce, a tale di non addimesticarsi mai.

Pare che il coquallino non si trovi che nelle parti meridionali dell' America: gli scojattoli biondi o dorati delle Indie orientali sono assai più piccoli, e i loro colori sono uniformi: questi sono veri scojattoli, che si arrampicano su gli alberi, ed ivi depongono i loro parti, laddove il coquallino e lo svizzero di America si tengono sotterra come i conigli, e non hanno altro rapporto collo scojattolo, che di somigliargli nella figura.



DE-

(a). Vedi il *Volume XV.* di questa *Storia Naturale*, pag. 70. e seg.

DESCRIZIONE

DEL COQUALLINO.

Il coquallino [*tav. XIII. , fig. 1.*] rassomiglia allo scojattolo per la forma del corpo , ma è un poco più grande , e n'è diverso assai per i colori del pelo ; quello della coda è altrettanto lungo come nello scojattolo , ma le orecchie del coquallino non sono formate da' peli lunghi in forma di pennello.

L'estremità del muso e le orecchie sono bianche , il disotto ed i lati della testa sono di un bel color nero , con alcune tinte di color rosso o d'arancio , il quale è assai apparente sopra i lati della testa ; l'occipite , il disopra , ed i lati del collo , il dorso , i lati del corpo , la coda , la spalla e la faccia esterna del braccio e della coscia sono di un color mischiato di nero , di rosso-arancio e rossiccio ; vi sono alcuni peli bianchi all'estremità della coda . Il disotto della testa e del collo , il petto , il ventre , la faccia interna del braccio e della coscia , il rimanente delle quattro gambe ed i piedi , sono interamente di color rosso-arancio , a riserva del disotto del metatarso , qual'è mischiato di nero ; i peli più grandi del corpo sono , come nello scojattolo , quasi della lunghezza d'un pollice , e quelli della coda fino a tre pollici e mezzo . L mustacchi sono neri , e

lunghi due pollici e nove linee ; le unghie hanno pure un color nero .

pied. poll. liv.

Lunghezza del corpo intero misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	o.	10.	9.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite ———	o.	2.	10.
Circonferenza dell' estremità del muso	o.	3.	1.
Circonferenza del muso presa al di sotto degli occhi —————	o.	4.	5.
Contorno dell' apertura della bocca —	o.	1.	0.
Distanza tra i due nasali —————	o.	0.	2.
Distanza tra l' estremità del muso , e l' angolo anteriore dell' occhio —	o.	1.	3.
Distanza tra l' angolo posteriore e l' o- recchia —————	o.	0.	6.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro —————	o.	0.	5.
Distanza tra gli angoli anteriori de- gli occhi , misurata secondo la cur- vatura del frontale —————	o.	1.	8.
La stessa distanza in linea retta —	o.	1.	3.
Circonferenza della testa presa tra gli occhi e le orecchie —————	o.	5.	2.
Lunghezza delle orecchie —————	o.	0.	7.
Larghezza della base , misurata sulla curvatura esteriore —————	o.	0.	8.
Distanza tra le due orecchie , presa al basso —————	o.	1.	3.

pied. poll. lin.

Lunghezza del collo —————	o.	o.	11.
Circonferenza del collo —————	o.	3.	4.
Circonferenza del corpo , presa dietro le gambe anteriori —————	o.	6.	o.
La stessa circonferenza nel mezzo —	o.	8.	6.
La stessa circonferenza presa d'avanti le gambe posteriori —————	o.	6.	o.
Circonferenza della coda all' origine del tronco —————	o.	2.	o.
Lunghezza dell' avan-braccio dal gomito fino alla giuntura —————	o.	2.	5.
Circonferenza della giuntura ———	o.	1.	4.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle unghie —————	o.	1.	10.
Lunghezza della gamba , dal ginocchio fino al tallone —————	o.	3.	2.
Lunghezza dal tallone fino all' estremità delle unghie —————	o.	2.	8.
Larghezza del piede anteriore ———	o.	o.	$5\frac{1}{2}$
Larghezza del piede posteriore ———	o.	o.	$7\frac{1}{2}$
Lunghezza delle unghie più grandi	o.	o.	5.
Larghezza alla base —————	o.	o.	$o\frac{2}{3}$

Quantunque quest' animale sia stato quasi interamente inaridito , m'è sembrato che le sue viscere rassomigliassero a quelle dello scoiattolo , principalmente lo stomaco , il fegato , la vescichetta del fiele , il colon ed i polmoni .

DESCRIZIONE
DELLA PARTE DEL GABINETTO

Spettante alla Storia Naturale

**DEL SURIKATE, DEL TARSIERE,
DEL FALANGIERE E DEL COQUALLINO.**

Num. MCCXXXIII.

Lo scheletro d'un surikate.

Quest' è lo scheletro, che ha servito di soggetto per la misura degli ossi del surikate.

Num. MCCXXXIV.

L'osso ioide d'un surikate.

Quest' osso è composto di nove pezzi, come nella maggior parte dei quadrupedi, il pezzo di mezzo ha un poco di curvatura; il terzo pezzo da ciascun lato è cortissimo, i rami della forchetta sono all' opposto più lunghi d'ogn' altro pezzo di quest' osso ioide.

Num. MCCXXXV.

Un tarsiere.

Quest' animale è inaridito; il tarso d' uno de' piedi è stato tagliato per dimostrare la sua conformazione particolare. Quest' individuo ha servito di soggetto per la descrizione del tarsiere: è stato dato al Gabinetto dalla Signora Marchesa d'Aligny.

Descriz. del Gabinetto . 133

Num. MCCXXXVI.

Un falangiere .

Quest' animale , conservato nello spirito di vino , è maschio ; trovasi la sua descrizione in quella del falangiere : è stato mandato da Surinam al Sig. Abate Nolin , il quale l' ha dato al Gabinetto colla femmina , dalla quale si è cavato lo scheletro , ch' è rapportato sotto il numero seguente .

Num. MCCXXXVII.

Uno scheletro di falangiere .

LA descrizione e le misure principali 'di questo scheletro si trovano nella descrizione del falangiere .

Num. MCCXXXVIII.

L' osso ioide d' un falangiere .

Quest' osso è in parte cartilaginoso , non vi si vedono se non sei pezzi d' osso , che si sarebbero forse ridotti a cinque , se l' ossificazione fosse stata compita ; allora esso avrebbe avuta una base , due corna grandi e due piccoli .

Num. MCCXXXIX.

Un coquallino .

SI è fatto inaridire quest' animale , dopo averlo conservato lungo tempo nello spirito di vino ; quest' individuo ha servito di soggetto per la descrizione del coquallino .

Num. MCCXL.

L'osso ioide d' un coquallino.

IN quest' osso vi mancano alcuni pezzi , quelli che rimangono , sono quasi del tutto simili a quelli , che corrispondono nell' osso ioide dello scojattolo .

Num. MCCXLI.

L'osso della verga d' un coquallino.

Quest' osso rassomiglia per la sua forma a quello dello scojattolo , non è diverso che per la grandezza , attesa la statura di questi due animali .



L' HAMSTER (a).

L' Hamster è un ratto de' più famosi e più nocivi; e se noi non ne abbiamo data la storia unitamente a quella degli altri ratti, è perchè allora non lo abbiamo veduto, e non abbiamo potuto procacciarcelo che in questi ultimi tempi. Dobbiamo la cognizione precisa ed esatta di questo animale alle attenzioni costanti del Sig. Marchese di Montmirail per tutto ciò, che può contribuire al progresso della Storia Naturale, ed alla be-

(a) L' Hamster. *Cricetus* in latino moderno. Questo nome dice Gefner, pare derivato dalla lingua Illirica, nella quale appellasi questo animale *Skrzeczick*. *Hamster*, o *Hamester* in Tedesco; nome che noi abbiamo adottato siccome quello dell' animale nel suo paese nativo.

Chomik-Skrzeczick, in lingua Polaca Rzaczynski... *Auct. Hist. Nat. Polon.* pag. 326.

Cricetus. Gefner, *Hist. quad.* pag. 738., due figure *Criceti*, *ibidem*.

Porcellus frumentarius Theriotropheum Silesiæ, à Gasp. Schwenckfeld, *Lignicii*, 1603., pag. 118. & 119.

Glis cinereo rufus in dorso; in ventre niger, maculis tribus ad latera albis..... *Marmota Argentoratensis*. La marmotte de Strasbourg. Brisson, *Regn. animal.* pag. 166.

Cricetus, *mus* caudâ subabbreviatâ, auriculis rotundatis, corpore subtus nigro, lateribus rufescentibus. Linn. *Syst. nat.* edit. x., pag. 60.

nignità del Sig. di Waitz Miniſtro di Stato del Principe Langravio di Alſia-Caſſel. Ce ne ſono ſtati mandati due vivi con una Memoria iſtruttiva (a) ſui loro coſtumi e ſulle loro abitudini naturali. Noi abbiamo mantenuto uno di queſti animali per alcun meſe affine di oſſervarlo, e in ſeguito ſi è anato, mizzato per fare la deſcrizione e il paragone delle parti interiori con quella degli altri ratti; ſi vedrà che per queſte parti interiori dell' hamſter raſſomiglia più al ratto d'acqua, che ad alcun altro animale: gli raſſomiglia ancora per la piccolezza degli occhi e per la finezza del pelo; ma non ha la coda lunga come il ratto d'acqua; l'ha per lo contrario cortiſſima, più corta che il campagnuolo, il quale, come abbiamo detto, raſſomiglia aſſai al ratto d'acqua per la forma interiore. L'hamſter ci ſembra che ſia a riguardo del campagnuolo ciò che il ſurmulot è a riguardo.

(a) Ecco una Memoria aſſai diſfuſa ſulla ſpecie del mulot, che ſi chiama *Hamſter* in queſto paefe; mi è ſtata data da M. de Waitz, Miniſtro di Stato del Landgravio di Alſia-Caſſel, il quale congiunge altre qualità più degne di un uomo di ſtato la più viva inclinazione per la Storia Naturale mi ha mandati al tempo ſteſſo due di queſti animali vivi, che vi traſmetterò colla prima occaſione. *Extrait d'une Lettre de M. le marquis de Montmirail à M. de Buffon, datée de Krumback, 31. Juillet 1762.*

do del mulot ; tutti questi animali vivono sotterra e sembrano animati dallo stesso istinto : hanno presso a poco le abitudini stesse, e massimamente quella di adunare i semi e di farne grossi magazzini nei loro buchi. Ci estenderemo adunque assai meno sulle rassomiglianze della forma e le conformità della natura, che sulle differenze relative e le differenze reali, che distinguono l'hamster da tutti i ratti, forci e mulot, di cui abbiamo parlato .

Agricola (a) è il primo Autore, che abbia dati dei contrassegni precisi e distinti al proposito di questo animale : Fabricius (b)

Tom. XXVI.

H

(a) *Hamster quem quidam cricetum nominant existit iracundus. Et mordax adeo ut si eum eques incante persequatur, soleat prosilire Et os equi appetere, Et si prehenderit mordicus tenere. In terre cavernis habitat.... pedes habet admodum breves; pilis in dorso color est fere leporis: in ventre niger, in lateribus rutilus, sed utrumque latus maculis albis tribus numero distinguitur. Suprema capitis pars ut etiam cervix eundem quem dorsum habet colorem. Tempora vutula sunt; guttur est candidum.... pili autem sic inhaerent cuti ut ex ea difficulter evelli possint.... atque ob hanc causam Et varietatem pelles ejus sunt pretiosae: multa frumenti grana in specum congerit Et utrinque dentibus mandit.... ager Turingiae eorum animalium plenus ob copiam Et bonitatem frumenti. Georg. Agricola, de animantibus subterraneis. Apud Gesner, Hist. quad. pag. 738.*

(b) *Hamester animal est agreste sub terra habitans... colore vario, ventre non candido sed potius ni-*

vi ha aggiunti alcuni fatti ; ma Schwenckfeld (a) ha fatto più di tutti gli altri : ha notomizzato l'hamster e ne ha data una de-

gerrimo... *Dextes habet in anterioris oris ima supremaque parte binos, prominentes & acutos, malas luxas & amplas, ambas exportando importandoque replet: ambabus mandit.... cum terram effodit, primum anterioribus pedibus [quos talpæ similes habet brevitare sed minus latos] eam retrahit, longius progressus, ore exportat. Cuniculos ad antrum plures agit cubiti profunditate sed admodum angustos.... antrum intus extendit ad capienda frumenta.... Messis tempore grana omnis generis frumenti importat.... terra ante cuniculos erecta non tumuli modo assurgit, ut talparum tumuli, sed ut agger dilatatur.... Vescitur hoc animal frumento omnis generis & si domalatur pane ac ceruibus. In agro etiam mures venatur. Cibus cum capit in pedes priores erigitur... quamvis autem corpore exiguum sit naturâ tamen est pugnax & temerarium. Lacescitum quidquid ere gestat pulsatis utroque pede malis subito egerit, recta hostem invadens, spiritu oris & assultu protervum ac minax..... Nec terretur facile etiam si viribus impar ei sit quem petit.... vidi ipse, cum equum assultando navibus corripuisset non prius morsum dimisisse quam ferro occideretur.... Hamstri pellis maxime durabilis..... In Turingiâ & Misiniâ hoc animal frequens non omnibus tamen in locis sed in uberrimis & fertilissimis. In Lusaciâ circa Rudeburgum, è satis panici effoditur; Mulbergi ad Albim in vinetis reperitur nam maturis quoque visis vescitur. Georg. Fabricius, apud Gesner, Hist. quad. pag. 739. & 740.*

(a) *Porcellus frumentarius, Hamster minor paulo cuniculo. Longitudo dohrantalis & palmi unius.*

scrizione, la quale si accorda presso che in tutto colla nostra. Nondimeno appena è stato citato dai Naturalisti più recenti, i quali si sono contentati di copiare ciò che Geisner ne ha detto; noi crediamo adunque di dovere rendere giustizia a questo Autore citandone interamente le sue osservazioni, ed aggiugnendovi quelle del Sig. de Waitz, noi avremo quanto si può desiderare al proposito di questo animale.

H 2

Pilus in dorso ferè leporis est colore. Gula, venter & pedes interiores nigra sunt. Rubet in lateribus & circa caudam, quæ coloris murini tres digitos longa. Maculae albæ sub auribus, juxta rostrum, supra artus & coxam. Pedes admodum breves, digitis & unguiculis albidis quinque utrinque. In pedum plantâ seu parte digitorum inferiore tubercula veluti calli ubique eminent. Oculi splendidi nigri elegantes. Dentes habet ut lepus anteriores & laterales. Lingua mollis spongiosa. E bucculis vesiculæ utrinque amplæ membranæ sub cute porriguntur quæ sensim gracilescentes dorso tenui ligamento alligantur. Has instar sacci messis tempore gravis tritici, filiginis & aliis ceu folles quospiam infarcit, atque in suos cuniculos comeatum in futuram hyemem congerit ac reponit. Pulmonibus candidis quatuor sunt lobi. Cor renibus paulo majus mucrone obtusiore. Hepar triplicatum apparet unum super alterum impositum. Inferior pars dorso adjacens duos obtinet lobulos. Media, quæ maxima integra absque incisuris integrum abdomen secundum latitudinem occupans ventriculum ex parte amplexatur. Superior portio divisa aliis incumbens diaphragmati proximè subjacet. Fel nullum conspiciere licet.

„ I quartieri degli hamster (dice il Sig. de
 „ Waitz) sono d'una costruzione diversa se-
 „ condo il sesso e l'età, ed anche secondo
 „ la qualità del terreno. L'abitazione del
 „ malchio ha una direzione obliqua, all'
 „ apertura della quale vi è una massa di
 „ terra sollevata. In distanza di questa uscita
 „ obliqua vi è un solo buco, il quale di-
 „ scende perpendicolarmente fino alle camere

*Ventriculus ei duplex. Unus candidus rotundiuscu-
 lus, cui alter per isthmum annectitur longiusculus,
 sinistrum hypochondrium occupans, hinc prope
 isthmum oesophagus inseritur alteri sub dextro hy-
 pochondrio intestina adhaerent. In utroque reperie-
 batur chylus candidus pulicula farinacea similis,
 crassior tamen in sinistro.*

*Intestina gracilia flavescent; ubi desinunt, incipit cæ-
 cum anfractuosum amplum, hinc crassiora ad cæ-
 cecum vergunt colorem. Excernit pilulas longiu-
 sculas instar murium. Lien coloris sanguine so-
 leam ferè humanam representat.*

*Renes bini phaseoli magnitudine & figurâ. Vescicula
 candida pisum italicum aequat, rotunda lagenula
 instar.*

Parit quinque sexve, uno partu.

*In terræ cavernis habitat, agri vastator & Cerevis
 hostis. Autumno multa frumenti grana in specum
 congerit, & utrinque, dentibus mandit.*

*Admodum pinguescit; ob id porcellis Indicis non
 ineptè comparatur.*

*In cibum non recipitur; sed peller consuuntur ad
 vestimenta.*

*De cavernâ suâ aqua fervente seu frigida copiose
 infusa expellitur.*

„ o cantinette della abitazione: non si tro-
„ va altrimenti terra sollevata vicino al buco
„ il che fa presumere che l'uscita obliqua
„ sia scavata incominciando dal di fuori, e
„ che l'uscita perpendicolare sia fatta dal
„ di dentro al di fuori, e dal basso in alto.

„ L'abitazione della femmina ha pure una
„ direzione obliqua, e insieme due, tre, e
„ sin otto buchi perpendicolari per dare una
„ entrata ed uscita libera ai suoi parti; il
„ maschio e la femmina hanno le loro stan-
„ ze separate; la femmina fa la sua più
„ profonda, che il maschio.

„ A lato dei buchi perpendicolari in di-
„ stanza di uno o due piedi, gli hamster
„ dei due sessi scavano secondo l'età loro,
„ e a proporzione della loro moltiplicazio-
„ ne, uno, due, tre e quattro cantinette
„ particolari, che sono a foggia di volta
„ così al di sopra, che al di sotto, e più
„ o meno spaziose secondo la quantità delle
„ loro provvisioni.

„ Il buco perpendicolare è il passaggio or-
„ dinario dell'hamster per entrare e per usci-
„ re. Appunto per questo buco obliquo si
„ trasporta la terra; pare altresì, che que-
„ sto condotto che ha un pendio più dolce
„ in una delle cantinette, e più ripido in
„ un'altra di esse serva alla circolazione
„ dell'aria in questa sotterranea abitazione.
„ La cantinetta in cui la femmina depone

„ i suoi parti non contiene provvisione di
„ grani, ma un nido di paglia e d'erba.
„ La profondità della cantinetta è diversis-
„ sima: un giovane hamster nel primo anno
„ non la sprofonda che un piede, un vec-
„ chio hamster spesso la scava fino a quat-
„ tro e cinque piedi: l'intera abitazione
„ comprese tutte le comunicazioni e tutte
„ le cantinette ha talora otto o dieci piedi
„ di diametro.

„ Quelli animali provvedono i loro ma-
„ gazzini di grani secchi e mondati, di bia-
„ de in ispiga, di piselli e di fave nella scor-
„ za, che inondano col tempo nel loro sog-
„ giorno, e trasportano al di fuori le scorze
„ e gli avanzi della spighe pel loro obbliquo
„ condotto. Per recare le loro provvisioni si
„ servono delle loro borse alle guance, nelle
„ quali ciascuno può portare un quarto di
„ coppa di grano mondato.

„ L'hamster fa d'ordinario le sue provvi-
„ sioni di grani alla fine di Agosto; quando
„ ha empiti i suoi magazzini, li copre e
„ ne chiude diligentemente ogni adito colla
„ terra; laonde difficilmente si scopre la sua
„ abitazione; nè si conosce se non pe' mon-
„ ticelli di terra, che sono presso al con-
„ dotto obbliquo, di cui abbiamo parlato;
„ è duopo in appresso cercare i buchi per-
„ pendicolari e scoprite così il suo soggior-
„ no. Il mezzo più usato per prendere questi

„ animali è di sotterrarli, quantunque questo
„ travaglio sia assai penoso a cagione della
„ profondità e dell'estensione delle loro tane.
„ Tuttavia un uomo esercitato in tal sorta
„ di caccia non lascia di trarne dell' utile;
„ trova esso d'ordinario nella buona stagione,
„ cioè nell'autunno, due moggia di buon
„ grano in ogni abitazione, e si approfitta
„ della pelle di questi animali, di cui si fanno
„ delle pellicce. Gli hamster producono
„ due o tre volte all'anno, e cinque o sei parti
„ per ogni volta, e spesso di più; vi sono degli
„ anni, in cui se ne veggono senza numero, e
„ degli altri in cui non se ne vede quasi pur uno;
„ negli anni umidi moltiplicano assai, e questa
„ numerosa moltiplicazione cagiona la carestia
„ pel devastamento generale delle biade.
„ Un giovane hamster, che conta sei settimane
„ o due mesi scava di già la sua tana;
„ nondimeno non si congiugne, nè produce
„ nel primo anno di sua vita.
„ Le faine perseguitano acutamente gli hamster,
„ e ne distruggono assai; entrano esse pure
„ nelle loro tane e ne prendono il possesso.
„ Gli hamster hanno ordinariamente il dorso
„ bruno e il ventre nero. Tuttavia ve n'ha
„ de' bigi, e questa differenza può procedere dalla
„ loro età più o meno provetta. Se ne trovano
„ pure alcuni, che sono interamente neri.
„ Questi animali si distruggono scambievolmente
„ come i mulot: di due che erano nella

stessa gabbia, la femmina una notte strangolò il maschio, e dopo aver troncati i muscoli, che congiungono le mascelle, gli divise il corpo e divorò una parte delle viscere. Partoriscono più volte all'anno, e sono così nocevoli, che in alcuni Stati di Alemagna si dà un premio per testa; ed ivi sono così comuni, che la loro pelliccia è a vilissimo mercato.

Tutti questi fatti, che abbiamo tolti dalla Memoria del Sig. de Waitz e dalle osservazioni del Sig. de Montmirail ci sembrano certi, e si accordano con ciò, che altronde sappiamo al proposito di questi animali; ma non è egualmente certo, come si dice in questa Memoria, che sieno intormentiti, ed anche inariditi nell'inverno, e che non acquistino moto e vita, che di primavera. L'hamster, che noi abbiamo avuto vivo, ha passato l'inverno dell'anno 1762. 63. in una camera senza fuoco, e dove faceva freddo bastevole ad agghiacciare l'acqua; nondimeno non si è intormentito, e non ha cessato di muoversi e di mangiare secondo il suo ordinario, laddove abbiamo noi mantenuti dei ghiri, e dei lerot, i quali a un grado assai minore di freddo sonosi intormentiti: non crediamo noi dunque che l'hamster si rassomigli ai ghiri o alla marmotta per questo rapporto, e senza ragione alcuni de' nostri Naturalisti l'hanno chiamato *marmotta di Strasbourg*, poichè non dorme come la marmotta, e non si trova a Strasbourg.

DE-

DESCRIZIONE

DELL' HAMSTER.

L' Hamster (*tav. XIII., fig. 2.*) è della grandezza del ratto: m'è paruto che non ne fosse diverso per la grandezza del corpo se non perchè la sua testa è più grande, i suoi occhi più piccoli e la sua coda molto più corta. La fronte, il disopra della testa, il dorso, l'alto della groppa e dei lati del corpo sono di color fulvo-sporco mischiato di cenerino, perchè i peli hanno un color cenerino sulla maggior parte della loro lunghezza cominciando dalla radice: vi ha del fulvo al disopra del cenerino, e del nericcio all'estremità, e si trovano anche de' peli interamente neri. L'alto dei lati della testa e del collo, il disopra degli occhi, il basso dei lati del corpo, la faccia esteriore della coscia e della gamba, il basso dell' groppa e le natiche son di color rosso o rossiccio. L'estremità del muso, il basso dei lati della testa, la faccia esterna del braccio, i lati del petto e i piedi sono d'un color giallo pallidissimo: questo colore forma tre grandi macchie da ciascun lato dell' animale, ma esse non eran sì apparenti come sulla figura (*tav. XIII., fig. 2.*). La strozza, il disotto del collo, l'avan-braccio, il disotto del petto, il ventre, la faccia interna della coscia, il dinanzi e la faccia interna della gamba e l' disotto del

tallone, sono di color di marrone assai carico, ed anche nericcio in alcuni siti. Le orecchie son grandi, rotonde e in parte nude. La coda è cortissima, coperta di peli rossicci verso la sua origine, e quasi nuda nel resto della sua lunghezza, ove non ha che piccolissimi peli molto rari. I piedi hanno cinque diti; ma il pollice dei piedi anteriori è pochissimo apparente; non vi si distingue che un tubercolo e una piccola unghia, come nello scojattolo, nel ratto, nel forcio ec.

pie. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall' estremità		
del muso fino all' ano	o.	8. o.
Lunghezza della testa, dall' estremità		
del muso fino all' occipite	o.	1. 10.
Circonferenza dell' estremità del muso	o.	2. 1.
Circonferenza del muso presa sotto		
gli occhi	o.	2. 11.
Contorno dell' apertura della bocca	o.	1. 3.
Distanza tra i due nasali	o.	o. 1 $\frac{3}{4}$
Distanza tra l' estremità del muso, e		
l' angolo anteriore dell' occhio	o.	o. 10.
Distanza tra l' angolo posteriore, e		
l' orecchia	o.	o. 8.
Lunghezza dell' occhio da un angolo		
all' altro	o.	o. 3.
Apertura dell' occhio	o.	o. 2.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi	o.	o. 6.

pied. poll. lin.

Circonferenza della testa tra gli occhi e le orecchie —————	o. 3. 8.
Lunghezza delle orecchie —————	o. o. 11 $\frac{1}{2}$
Larghezza della base misurata sulla curvatura esteriore —————	o. 1. 0.
Distanza tra le due orecchie presa al basso —————	o. o. 9.
Lunghezza del collo —————	o. o. 9.
Circonferenza del collo —————	o. 2. 9.
Circonferenza del corpo , presa die- tro le gambe anteriori —————	o. 4. 5.
La stessa circonferenza al sito più grosso —————	o. 4. 10.
La stessa circonferenza dinanzi le gambe posteriori —————	o. 4. 5.
Lunghezza del tronco della coda —	o. 1. 6.
Circonferenza della coda all' origine del tronco —————	o. o. 11.
Lunghezza dell' avan-braccio dal go- mito fino alla giuntura —————	o. 1. 3.
Circonferenza della giuntura —————	o. o. 10.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	o. o. 9 $\frac{2}{3}$
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	o. 1. 2.
Lunghezza dal tallone fino all' estre- mità delle ugne —————	o. 1. 3.
Larghezza del piede anteriore ———	o. o. 4.
Larghezza del piede posteriore ———	o. o. 5.

pie'd. poll. lin.

Lunghezza delle ugne più grandi — o. o. 2.

Larghezza alla base ————— o. o. $0\frac{3}{4}$.

Questo hamster pesava sei dramme e mezzo.

L'epiploon s' estendeva fino al mezzo dell' addomine; il duodeno giugneva fino al rene destro; il digiuno faceva i suoi giri nella regione epigastrica, nell' ombelicale e nell' ipogastrica; i giri dell' ileo erano parimente nella regione ipogastrica, e in seguito nell' iliaca sinistra e nella regione lombare dello stesso lato. Il cieco s' estendeva all' indietro nel lato sinistro, e si ricurvava all' infuori coll' estremità. Il colon passava da sinistra a destra dietro lo stomaco; in seguito si prolungava all' indietro nel lato destro e ritornava all' innanzi; queste due ultime porzioni del colon erano attaccate l' una all' altra per via d' un mesocolon come nello scojattolo [*]; esse erano ondegianti. Il colon finalmente ripassava da destra a sinistra dietro lo stomaco, e si curvava all' indietro per unirsi al retto.

Il fito più sottile [A, *tab. XIV. fig. 1.*] del duodeno si trovava vicino al piloro [B]: il resto di questo intestino, il digiuno e l' ileo [A, *fig. 2.*] avevano presso a poco la stessa lunghezza. Il cieco [B C] era allungato e curvato. Il colon aveva maggior grossezza [D] vicino al cieco [B] che in tutto

[*] Vedi il Tomo XV. di quest' Opera, pag. 80.

il restante della sua estensione ; esso faceva due giri [EF] di spirale alla sua origine , in seguito si piegava e descriveva altri due giri di spirale in contrario verso dei primi , ritornando sopra se stesso . La maggior parte [G] del colon e del retto avevano presso a poco la stessa grossezza che gl' intestini tenui . Le membrane di tutti gl' intestini eran sottilissime .

Lo stomaco pareva doppio , come quello del ratto d'acqua (a), e composto di due borse [CD, *tav. XIV., fig. 1.*] separate da un ristignimento [E] non aveva che dieci linee di circonferenza , e si trovava nella parte destra dello stomaco a due linee di distanza dall' esofago [F] : il resto della parte destra era grossissimo : la parte sinistra era men grossa e molto allungata , e perciò vi era molta distanza tra l' esofago [F] e 'l fondo [D] dello stomaco . Le pareti interiori [*tav. XV., fig. 1.*] dello stomaco non eran diverse da quelle del ratto d'acqua (b) se non perchè al fondo dello stomaco [A] eranvi delle pieghe , e perchè le membrane trasparenti della parte sinistra [AB] terminavano con un rialzo fatto a frangia [CD] molto sporgente .

Il fegato s' estendeva quasi egualmente a sinistra che a destra ; rassomigliava a quello del ratto d'as-

(a) Vedi il Tomo XV. di quest' Opera , pag. 191., *tav. XXI., e XXII., fig. 1.*
 (b) *Idem* , pag. 192. , *tav. XXII., fig. 2.*

qua pel numero, per la forma e per la situazione dei lobi. Il suo colore era d' un rosso-bruno esteriormente, e grisastrò interiormente, e pesava tre dramme. Non vi ho veduta la vescichetta del fiele; per questo riguardo l' hamster rassomiglia meno al ratto d' acqua che al ratto, perchè quest' ultimo non ha la vescichetta del fiele.

La milza rassomigliava a quella del ratto d' acqua, e pesava cinque grani.

Il rene destro era un poco più innoltrato che il sinistro; eran grossi tutt' e due, e la loro faccia inferiore formava una specie di costa longitudinale, che la separava in due faccette.

Nel polmon sinistro non eravi che un lobo: il destro era composto di cinque lobi, tre de' quali eran disposti in fila, gli altri due si trovavano vicino alla base del cuore; l' un di questi due lobi era piccolo; e l' altro non aveva che una grandezza proporzionata a quella del quarto lobo del polmon destro della maggior parte dei quadrupedi. Dall' arco dell' aorta uscivano tre rami.

L' hamster ha da ciascun lato della mascella inferiore una borsa [A B, *tav. XV., fig. 2.*] che comunica nella bocca e che s' estende fino alla spalla. Egli fa entrare in tali borse gli alimenti che vuol conservare o trasportare; sono assai grandi, poichè quando son riempite [A], hanno fino a un pollice e otto linee di lunghezza, e nove linee di diametro nel mezzo; son situate sotto gl' integumenti e formati da una membrana muscolosa

molto sottile [B] ch' è increfata quando le borse son vote . La maggior parte delle fcimie hanno delle borse che son poco diverfe da quelle dell' hamster ; non conofco neffun altro animale che abbia fiffatti ferbatoj per confervare i fuoi alimenti .

La lingua raffomiglia a quella del ratto . L'epiglottide era puntuta nel mezzo , e scanalata fu i fuoi orli . Sul palato eranvi otto folchi traferfali: gli orli del primo formavano un angolo all' innanzi ; l'angolo dell' orlo interiore era molto allungato e s' effendeva fino ai denti incifivi : l' orlo , che feparava il fecondo e 'l terzo folco , era dritto ; quello , che fi trovava tra il terzo e il quarto folco , aveva un piccol angolo all' indietro ; i due orli del quinto folco erano interrotti nel mezzo della loro lunghezza , e ciafcuna delle loro parti era curvata all' indietro colla fua eftremità interna , che s' effendeva fino al mezzo del fefto folco , di modo che l' orlo anteriore di quefto folco non appariva che alle dette due eftremità . Gli orli del feftimo e dell'ottavo eran dritti .

Il cervello era egualmente largo che lungo ; la fua fuperficie era unita fenza finuofità ; ma ful cervelletto eranvi dei folchi , come fu quello della maggior parte degli altri animali . Efto pefava nove grani , e il cervello trenta .

Non ho trovati che due capezzoli , ch' eran poco vifibili , ed eran fituati ful ventre al dinanzi della vulva , uno da ciafcun lato , a undici linee di diftanza l' un dall' altro .

pied. poll. lin.

Gran circonferenza dello stomaco —	o.	5.	5.
Piccola circonferenza ————	o.	2.	4.
Lunghezza del fegato ————	o.	1.	6.
Larghezza ————	o.	1.	9.
La sua maggior grossezza ————	o.	o.	5.
Lunghezza della milza ————	o.	1.	6.
Larghezza dell' estremità inferiore —	o.	o.	2.
Larghezza dell' estremità superiore —	o.	o.	1.
Grossezza nel mezzo ————	o.	o.	1.
Lunghezza dei reni ————	o.	o.	$7\frac{1}{2}$
Larghezza ————	o.	o.	$4\frac{1}{2}$
Grossezza ————	o.	o.	$3\frac{1}{2}$
Lunghezza del centro nervoso dalla vena-cava fino alla sua punta —	o.	o.	5.
Larghezza ————	o.	o.	4.
Circonferenza della base del cuore —	o.	1.	4.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare ————	o.	o.	8.
Altezza dalla punta fino al sacco pol- monare ————	o.	o.	6.
Diametro dell' aorta , preso exterior- mente ————	o.	o.	1.
Lunghezza della lingua ————	o.	1.	$2\frac{1}{2}$
Lunghezza della parte anteriore dal freno fino all' estremità ————	o.	o.	$7\frac{1}{2}$
Lunghezza del cervello ————	o.	o.	$7\frac{1}{2}$
Larghezza ————	o.	o.	$7\frac{1}{2}$
Grossezza ————	o.	o.	$4\frac{1}{2}$
Lunghezza del cervelletto ————	o.	o.	$4\frac{1}{2}$

e del ratto d'acqua, perchè il lato anteriore è molto corto, e perchè la parte ch'è al dinanzi della spina è molto più larga di quella ch'è all'indietro.

Le clavicole hanno tanta curvatura quanta quelle del ratto d'acqua, e meno di quelle del ratto.

Gli ossi del braccio, dell'avan-braccio, della coscia e della gamba rassomiglian più a quelli del ratto d'acqua che a quelli del ratto.

pied. poll. lin.

Lunghezza della testa dall'estremità

degli ossi del naso fino all'occipite o. 1. 8.

La maggior larghezza della testa — o. 1. $0\frac{1}{2}$

Lunghezza della mascella inferiore

fino all'orlo posteriore dell'apofisi

condiloidea ————— o. 1. $0\frac{5}{8}$

Larghezza della mascella inferiore al

sito dei denti incisivi ————— o. o. $2\frac{2}{3}$

Larghezza della mascella superiore al

sito dei denti incisivi ————— o. o. $3\frac{1}{2}$

Distanza tra le orbite e l'apertura

delle nari ————— o. o. $6\frac{5}{4}$

Lunghezza della detta apertura — o. o. $2\frac{1}{2}$

Larghezza ————— o. o. $2\frac{1}{2}$

Lunghezza degli ossi proprj del naso o. o. $7\frac{1}{2}$

Larghezza ————— o. o. $1\frac{1}{2}$

Lunghezza dei più lunghi denti in-

cisivi al difuori dell'osso ————— o. o. 5-

Lunghezza della porzione della colon-

na vertebrale, ch'è composta delle

IL BOBAK (a)

E LE ALTRE MARMOTTE.

SI è dato il nome di *Marmotta di Strassbourg* all' hamster, e quello di *Marmotta di Polonia* al bobak; ma quanto è certo, che l'hamster non è una marmotta, tanto è probabile, che ne sia una il bobak; perchè non è diverso dalla marmotta delle Alpi, che pe' colori del pelo; esso è d'un bigio meno bruno o di un giallo più pallido; ha egli pure una specie di pollice, o piuttosto un' unghia ai piedi davanti, laddove la marmotta non ha che quattro dita ai piedi, e le manca il pollice; del resto le rassomiglia in tutto ciò, che può far presumere, che questi due animali non formino due specie distinte. Lo stesso è del *Monace* (b) o *Marmotta del Canada*, che alcuni Viaggiatori hanno denominato *Fischiatore*; non pare diverso dalla marmotta che nella coda, che ha più lunga

Tom. XXVI. K

(a) Bobak, nome di questo animale in Polonia, e che noi abbiamo adottato.

Bobak, Rzackzinski, Hist. Nat. Polon. pag. 233. idem. Auf. pag. 327.

Glis flavicans capite rufescente ... *Marmota Polonica*. La Marmotte de Pologne. Brill. Reg. anim. pag. 165.

(b) Vedi la figura e la descrizione del Monace nella Storia degli uccelli di Edwards, pag. 194.

e più pelosa. Il monace del Canada, il bobak di Polonia e la marmotta delle Alpi potrebbero dunque essere tutti e tre lo stesso animale, che per la differenza dei climi avessero sofferte delle varietà, che noi abbiamo sopra indicate. Siccome questa specie preferisce per abitare i siti più alti e più freddi delle montagne; siccome trovasi nella Polonia, nella Russia, e nelle altre parti del nord dell' Europa, non fa maraviglia, che si trovi al Canada, dove solo è più piccola che in Europa (a), e ciò non le è singolare, poichè tutti gli animali che sono comuni ai due continenti sono più piccoli nel nuovo, che nel vecchio.

L'animale di Siberia, che i Russi appellano *Jevraschka* è una specie di marmotta ancora più piccola del monace del Canada: questa piccola marmotta ha la testa rotonda e il muso schiacciato, non se le vedono le orecchie, e neppure si può scoprire l'apertura del condotto uditorio se non levandone il pelo, che lo copre; la lunghezza del corpo compresa la testa, è al più di un piede; la coda non ha che tre pollici, è quasi ro-

(a) Nota. La marmotta delle Alpi, e quella di Polonia [Bobak] hanno un piede e mezzo dalla estremità del muso fino all'origine della coda. Il monace, o marmotta del Canada non ha che quattordici o quindi pollici di lunghezza.

tonda vicino al corpo, e allontanandosi si fa piatta, e sembra tronca nella estremità. Il corpo di questo animale è molto grosso, il pelo è fulvo misto di bigio, e quello dell'estremità della coda è quasi nero. Le gambe sono corte, quelle di dietro sono soltanto più lunghe di quelle davanti. I piedi di dietro hanno cinque diti e cinque unghie nere, ed un poco curve, quelli d'innanzi non ne hanno che quattro: quando s'irritano questi animali, o solo che si vogliano prendere, mordono violentemente, alzano un grido acuto come la marmotta; quando si dà loro da mangiare stanno diritti, e si recano il cibo alla bocca coi piedi davanti: si congiungono alla primavera e producono in estate; i portati ordinarij sono cinque o sei; essi si fanno delle tane in cui passano l'inverno, e dove la femmina partorisce e allatta i suoi parti: quantunque si rassomiglino assai ed abbiano delle abitudini comuni colla marmotta, par nondimeno che siano d'una specie realmente diversa; perchè ne' medesimi luoghi, nella Siberia, di rado si trovano marmotte della specie di quelle della Polonia o delle Alpi, e che i popoli della Siberia appellano *Surok* (a),

K 2

(a) Voyage de Gmelin, Tome II., page 444. — I Tartari, dice *Rubruquis*, hanno quantità di marmotte, o ghiri, i quali si chiamano *Sogur*, che si radunano d'inverno venti, e trenta insieme.

e non si è trovato, che queste due specie si mischino, nè che vi habbia alcuna razza intermedia.

me in una gran fossa, dove dormono per sei mesi; prendono in copia di tali bestie. *Voyages en Tartarie*, pag. 25. *Nota*. Pare, che questo *Sogur de Rubruquis* sia lo stesso animale che il *Jevraschka* di *Gmelin*, poichè l'altra marmotta si chiama *Surok*; o l'Autore ha preso *Surok* per *Sogur*.



DESCRIZIONE

DEL BOBAK.

IL bobak (*tav. XVII. fig. 1.*) è presso a poco della stessa grandezza che la marmotta, a cui rassomiglia quasi interamente per la forma del corpo, poichè ha il muso corto e grosso, la testa allungata e un po' arcata al sito della fronte, le orecchie corte e rotonde, il collo corto e grosso, e il corpo parimente grosso. La coda mi è paruta simile a quella della marmotta per ciò che ne restava nel bobak che ha servito di soggetto per questa descrizione; egli era disseccato e imbottito, e la coda era in parte troncata. Quest' animale aveva cinque diti a ciascun piede, almeno l'ugna del pollice dei piedi anteriori era molto apparente all'infuori, e queste falangi si trovavano sotto la pelle unite al metacarpo. Al contrario le marmotte mancano del pollice ai piedi anteriori; non solo non vi si vedeva punto d'ugna al di fuori, ma non si trovava punto di falange al didentro, come già si è detto all' articolo della marmotta, *Tomo XVII.* di quest' Opera; solamente dopo la pubblicazione del detto *Tomo* ho scoperti in una marmotta più avanzata in età che quella, che m'aveva servito di soggetto per la descrizione degli ossi del detto animale, due officini nel carpo di più dei sei, di cui ho fatta menzione nel *Tomo XVII.*, pag. 45.:

166 *Descrizione del Bobak.*

L'uno dei detti officini era piccolissimo e appena officato, e mi è paruto corrispondere a quello della prima falange del bobak; ma checchè ne sia, quest' animale ha di più che la marmotta la seconda falange del pollice dei piedi anteriori, e l'ugna ben formata esteriormente.

La lanugine del bobak era di color bruno. I peli più sodi e più lunghi della lanugine avevano lo stesso color bruno verso la radice, ed eran rossicci nel restante della loro lunghezza: la maggior parte de' peli della testa, del collo, del dorso, della groppa, della coda, delle spalle e della faccia esterna del braccio avevano la punta bruna o d'un color rosso-carico, ma questo colore era poco apparente. Sulla testa, sul petto, sul ventre e sulla coda di quest' animale non vedevasi a prima vista che del rosso, e sulle altre parti del rossiccio.



LE GERBOISE.

Gerboise è un nome generico, che noi qui usiamo per indicare degli animali rimarchevoli per la grandissima sproporzione, che v'è fralle gambe posteriori, e anteriori; non essendo queste grandi come le mani della talpa, e somigliando le altre ai piedi di un uccello. Noi conosciamo in questo genere quattro specie o varietà ben distinte.

1.^o Il tarsiere, di cui poco sopra abbiamo parlato, il quale è certamente di una specie particolare, perchè ha le dita fatte come quelle delle scimie, e ne ha cinque per cadaun piede.

2.^o Il gerbo (*a*) o gerboisa propriamente detta, che ha i piedi della forma stessa degli altri fissipedi, quattro dita ai piedi davanti e tre a quelli di dietro.

3.^o L'Alag-

K 4

(*a*) *Gerbo*, parola derivata da *Jerbuah* o *Jerboa*, nome di questo animale nell' Arabia, e che noi abbiamo adottato.

Gerbo. *Voyages de Corneille le Brun*, Paris, 1714., page 406., fig. page 410.

Gerboise. *Voyage de Paul Lucas*, Tom. II., pag. 73. fig. pag. 74.

Jerboa. *Voyage de Shaw*, pag. 248., fig. pag. 249.

Mus jaculus pedibus posticis longissimis caudâ extremi vellosâ. Hasselquist. *Itin. cl. 1.*, art. VI.

Le Gerbua. *Glanures d' Edwards*, pag. 18., fig. tav. 219.

taga (a), le cui gambe sono formate come quelle del gerbo, ma che ha cinque dita ai piedi davanti e tre a quelli di dietro, con uno sperone, che può contarfi per un pollice o quarto dito assai più corto degli

(a) *Alagtaga*, nome di questo animale presso i Tartari-Mongous, e che noi abbiamo adottato. M. Mefferchmid che ha trasmesso questo nome, dice, che significa *animale, che non può camminare*; tuttavia la parola *alagtaga* mi pare vicinissima a *letaga*, che nello stesso paese indica la polatuca, o scojattolo volante; però inclino a credere, che *alagtaga* come *letaga*, sieno anzi nomi generici, che specifici, e che indichino un animale, che vola, tanto più che Strahlenberg, citato da M. Gmelin al proposito di questo animale lo chiama *Lepre volante*.

Cuniculus seu lepus indicus utias dictus. Aldrov. de Quad. digit. fig. pag. 395. Nota. 1. Il Sig. Linneo e Edwards hanno appropriata al gerbo questa figura esposta da Aldrovando, ma mi è sembrato, che meglio convenisse all' *alagtaga*; lo sperone o quarto dito dei piedi di dietro è ben distinto, ed è per questo carattere, che l' *alagtaga* è diversa dal gerbo, il quale non ha che tre diti senz' apparenza d' un quarto. Nota. 2. Aldrovando ha mancato applicando a questo animale il nome di *Utias*; questa parola è Americana, e non è mai stata usata che per indicare un piccolo animale, che gli Spagnuoli trovarono quando vi giunsero a S. Domingo; e dopo alcuni Autori l' hanno adattato al porco d' India; ma non ha potuto mai indicare nè l' *alagtaga*, nè il gerbo. Io credo, che questa parola *utias*, che si dee pronunziare *outias* venga da *contias*, nome che alcuni Autori danno all' acou-

altri. 4.^o Il *Daman Israël* (a) o *Agnello d'Israël*, che ha quattro diti ai piedi dinanzi, e cinque a quelli di dietro, il quale esser potrebbe lo stesso animale, che il Sig. Linneo ha indicato col nome di *Mus longipes* (b).

Il gerbo ha la testa fatta a foggia di quella del coniglio, ma ha gli occhi più grandi e le orecchie più corte quantunque alte e ampie relativamente alla sua grandezza; ha

K 5

ti, o agoti, e che per conseguenza l'utias non indichi altro animale se non l'agoti, ch'era, e che è ancor naturale all'isola di S. Domenico, e che si è trovato quando fu scoperto quel paese. Vi furono in ogni tempo nelle Antille, [dice l'Autore della Storia delle Antille] alcune bestie di quattro piedi, come l'oposso [garigueya], il javaris [pecari], il tatou, l'agouti, il ratto moscato [pilori]. *Hist. Nat. des Isles Antilles*, page 121.

Cuniculus pumilio siliens, caudà longissimà. Gmelin. *Nov. Com. Acad. Petrop.* Tom. V. tab. xi., fig. 1.

(a) *Daman Israël*, agneau d'Israël. *Voyage de Shaw*, Tome II. page 75.

Animal quoddam pumile cuniculo non dissimile, sed *cuniculis minus quod agnum filiorum Israël nuncupant*. Prof. Alpin. *Hist. Ægypt.* lib. iv., cap. ix., pag. 232.

(b) *Longipes*. *Mus* caudà elongatà vestitā, palmis *tetradactylis*, plantis *pentadactylis*, *femoribus longissimis*. Linn. *Syst. nat.* edit. x., pag. 62. Nota. La parola *femoribus* è qui mal applicata, non sono le cosce, nè le gambe, ma i primi ossi del piede, i metatarsi che questi animali hanno lunghissimi.

il naso di colore scarnatino e senza pelo, il muso corto e grosso; l'apertura della bocca piccolissima, la mascella superiore molto ampia, l'inferiore stretta e corta; i denti come quelli del coniglio; dei mustacchi intorno alla bocca composti di lunghi peli neri e bianchi; i piedi dinanzi sono cortissimi e non toccano mai terra; questo animale non se ne serve che come di mani, per recare il cibo alla bocca. Queste mani hanno quattro dita fornite di unghie, e il principio di un quinto dito senz'unghia: i piedi di dietro non hanno che tre diti, di cui il medio è un po' più lungo degli altri due, e tutti e tre forniti di unghie: la coda è tre volte più lunga del corpo; è coperta di piccoli peli ruvidi, dello stesso colore di quelli del dorso, e all'estremità è vestita di peli più lunghi, più morbidi, più folti, che formano una specie di fiocco nero al principio, e bianco alla estremità. Le gambe sono ignude e di colore scarnatino, siccome pure il naso e le orecchie: il disopra della testa e il dorso sono coperti di un pelo rossiccio, i fianchi, il di sotto della testa, la gola, il ventre e le cosce al di dentro sono bianche; evvi al fondo dei reni e vicino alla coda una gran fascia nera trasversale in forma di luna crescente (a).

(a) Ecco le misure di questo animale date da Haf-

L'alagtaga è più piccolo di un coniglio, ha il corpo più corto, le sue orecchie sono lunghe, larghe, nude, sottili, trasparenti e sparse di vasi sanguigni apparentissimi; la mascella superiore è assai più ampia dell'inferiore, ma ottusa e molto larga all'estremità; ha grandi mustacchi intorno alla gola; i denti sono come quelli dei ratti; gli occhi grandi, l'iride e la palpebra brune; il corpo è stretto innanzi, e molto largo e quasi rotondo in dietro, la coda lunghissima e grossa meno di un piccolo dito; è coperta in più di due terzi della sua lunghezza di peli corti e ruvidi; sull'altro terzo i peli sono più lunghi, e ancora assai più lunghi, più folti e più morbidi verso l'estremità, dove formano una specie di fiocco nero al principio, e bianco in fine. I piedi dinanzi sono cortissimi, hanno cinque diti; quelli di dietro, che sono lunghissimi non ne hanno che quattro, di cui tre sono situati innanzi, e il quarto è a un pollice di distanza dagli altri; tutti questi diti sono forniti d'unghie più corte in quelli dinanzi, e un po' più lunghi in quelli di dietro. Il pelo

K 6

Selquist. *Magnitudo corporis ut in mure domestico majore. Mensuratio capit. poll. 1. corp. poll. 2 $\frac{1}{2}$ caud. spith. 1 $\frac{1}{2}$. post. ped. spith. $\frac{1}{2}$. anter. infra pollicem. Mvst. longiss. poll. 3.*

di questo animale è morbido e lungo assai, fulvo sul dorso, bianco sotto il ventre (a).

Si vede confrontando queste due descrizioni, la prima di cui è tolta da Edwardo e d'Hasselquist, e la seconda da Gmelin, che questi animali si rassomigliano quasi il più che è possibile; il gerbo è soltanto più piccolo dell'alagtaga, e non ha che quattro dita ai piedi dinanzi, e tre a quelli di dietro senza lo sperone, laddove quello ne ha cinque ai piedi dinanzi, e quattro, cioè tre grandi e uno sperone a quegli di dietro; ma io sono molto inclinato a credere, che questa differenza non sia costante, perchè il Dottore Shaw (b) che ha pubblicata la descrizione e la figura di un gerbo di Barberia lo rappresenta con questo sperone o quarto dito ai piedi di dietro; ed il Sig. Edwards

(a) Ecco le dimensioni di questo animale date da Gmelin. *Longitudo ab extremo rostro ad initium caudæ* poll. 6.; *ad oculos* poll. 1. *Auricularum* poll. $1\frac{1}{2}$; *caudæ* poll. $8\frac{1}{2}$; *pedum anteriorum* ab humero *ad extremos usque digitos* poll. $1\frac{1}{2}$; *pedum posteriorum* a *suſtraginibus* *ad initium usque calcanei* poll. 3.; *a calcaneo ad exortum digiti posterioris* poll. 1.; *ad extremos unguis* poll. 2. *Latitudo corporis anterioris* poll. $1\frac{1}{2}$, *posterioris* poll. 3. *auricularum* poll. $\frac{1}{2}$.

(b) *Voyage du Docteur Shaw*, pag. 248. & 249.

nota, che ha diligentemente osservato i due gerbi, che ha veduti in Inghilterra, e che non ha loro trovato quello sperone; pertanto questo carattere, che pareva, che distinguesse specificamente il gerbo e l'alagtaga non essendo costante si risolve in nulla e dinota piuttosto l'identità, che la diversità della specie; la differenza di grandezza altro non prova, fuorchè sono due specie differenti: egli può essere, che i Sig.^{ri} Edwards, e Hasselquist non abbiano descritti che giovani gerbi, e il Sig. Gmelin un vecchio alagtaga: due cose sole mi lasciano in qualche dubbio, la proporzione della coda, che è assai più grande nel gerbo che nel alagtaga, e la diversità del clima, in cui sono. Il gerbo è comune nella Circassia (a), nell'Egitto (b),

(a) Si ritrova nella Circassia, come pure nella Persia, nell'Arabia, e nei contorni di Babilonia una specie di mulot appellata *Jerbuah* in Araba quasi della grandezza, e del colore di uno scojattolo.... Quando salta si slancia cinque o sei piedi alto da terra.... Abbandona talora le campagne, e s'infina nelle case. *Voyage d'Olearius*, pag. 177.

(b) Nell'Egitto ho veduti de' piccoli animali, che correvano velocissimamente sulle due gambe di dietro; le quali erano così lunghe, che parevano appoggiate su i trampoli. Questi animali scavano come i conigli. Ne presi sette, che io trasportai; me ne sono rimasti due, che ho recati in Francia, dove sono vissuti nel Serraglio

nella Barberia, nell' Arabia, e l'alagtaga nella Tartaria, sul Volga e fino nella Siberia: è raro che lo stesso animale abiti dei climi così diversi; e quando ciò addiviene, soffre la specie grandi varietà; ciò appunto noi presumiamo, che sia avvenuto a quella del gerbo, di cui l'alagtaga, malgrado queste differenze non ci sembra che una varietà.

Questi piccoli animali nascondono ordinariamente le mani e i piedi dinanzi nel loro pelo, talchè si direbbe, che non hanno altri piedi fuorchè quelli di dietro; per trasferirsi da un luogo a un altro, essi non camminano, cioè non portano un piede dopo l'altro; ma saltano leggierissimamente in distanza di tre o quattro piedi: e sempre diritti come gli uccelli; riposandosi stanno assisi sulle loro ginocchia, non dormono, che di giorno, e non mai di notte; mangiano grani ed erbe come le lepri; sono di un naturale assai mansueto, e tuttavia non si addomesticano, che fino a un certo segno, si scavano delle tane come i conigli, e in assai minor tempo; si fanno un magazzino di erbe sulla fine dell'estate, e passano l'inverno ne' paesi freddi.

Siccome noi non abbiamo potuto anatomizzare questo animale, e il Sig. Gmelin

del Re per due anni. *Voyage du Paul Lucas*, Tome II., page 74.

è il solo, che abbia parlato della struttura delle sue parti interiori, qui esponiamo le sue osservazioni aspettando, che se ne abbiano delle più precise e più estese (a).

Rispetto al daman o agnello d'Israel, che ci pare del genere delle gerboise, perchè ha come queste le gambe dinanzi cortissime relativamente a quelle di dietro, non possiamo far meglio, non lo avendo veduto mai, che riferire ciò che ne dice il Dottor Shaw, il quale ha potuto paragonarlo col gerbo, e ne parla come di due specie differenti: „ il „ daman Israel, dice questo Autore, è an-

(a) *Œsophagus, uti in lepore & cuniculo, medio ventriculo inseritur, intestinum cæcum breve admodum sed amplum est in processum vermiformem, duos pollices longum abiens. Choledochus mox infra pylorum intestinum subit. Vesica urinaria citrinâ aquâ plena; uteri nulla plane distinctio; vagina enim canalis instar sine ullis artificiiis in pubem usque protensa in duo mox cornua dividitur, quæ ubi ovariis appropinquant multas inflexiones faciunt & in ovariis terminantur. Penem masculus habet satis magnum, cui, circa vesicæ minariæ collum vesiculæ seminales anciam cum dimidio longæ, graciles & extremitatibus intortæ adjacent. Foramen aut firius quosdam inter anum & penem, aut inter anum & vulvam nullomodo potui discernere, licet quavis in indagatione ista cautelas adhibuerim Cuniculi Americani, porcelli pilis & voce. Marcgr. Fabricâ internarum partium ab hoc animali non multum abluunt. Gmelin, *Nov. Com. ac. Petrop.* Tom. V., art. VII.*

„ che un animale del monte Libano, ma del
„ pari comune nella Siria e nella Fenicia;
„ questa è una bestia innocente, che punto
„ non nuoce, e che somiglia nella statura,
„ e nella figura al coniglio comune, essendo
„ i suoi denti anteriori disposti allo stesso
„ modo; è soltanto più bruno, ed ha gli
„ occhi più piccoli, e la testa più puntuta;
„ i piedi anteriori sono più corti, e i poste-
„ riori più lunghi nella stessa proporzione di
„ quelli del jerboa (gerbo). Quantunque
„ talvolta si nasconda sotterra, il suo ordi-
„ nario soggiorno è nei buchi e nelle fes-
„ sure delle rupi, il che mi fa credere,
„ siegue il Sig. Shaw, che questo animale
„ sia appunto quello che piuttosto, che il
„ jerboa (gerbo) si debba prendere pel *sa-*
„ *phan* della Scrittura; nessuno mi ha saputo
„ dire il nome moderno del daman Israel,
„ che significa *agnello d'Israel* “ (a). Pro-
„ spero Alpino, che aveva indicato questo ani-
„ male prima del Dottore Shaw, dice che la
„ sua carne è eccellente da mangiare, e che è
„ più grosso del nostro coniglio di Europa;
„ ma quest'ultimo fatto pare dubbioso, perchè
„ il Dottore Shaw l'ha tolto dal tratto di
„ Prospero Alpino, che nel resto egli cita in-
„ teramente.

(a) *Voyage de Shaw, Tome II., page 75.*

L' ICNEUMONE

O SIA MANGOSTA (a).

L' Icneumone è domestico nell' Egitto ,
come lo è in Europa il gatto, ed esso
serve parimente a prendere i sorci e i rat-

(a) Mangouste, voce derivata da *Margutia*, nome
di questo animale nelle Indie.

Ichneumon in Greco, e in Latino. *Tezer-dea* in
Arabo, secondo il Dottore Shaw.

Mungo dai Portoghesi, e *Muncus* dagli Olandesi
dell' India, secondo *Kampfer*. *Quil* o *Quilspele*
a Ceylan, secondo *Garcias du Jardin*. *Chiri* nel
Malabar, secondo il P. *Vincenzo Maria*.

Ichneumon, *Aristotelis*. *Hist. animal. Lib. VI.*,
cap. 35., & *Lib. IX.*, cap. 6.

Ichneumon, che gli Egiziani nominano *Ratto di*
Faraone. *Observations de Belon*, Paris, 1555.,
feuillet 95., fig. ibid. — *Le rat de Pharaon*,
Belon, de la nature des Poissons, Paris, 1555.,
page 35., fig. page 37.

Ichneumon sive lutra Aegypti. *Aldrov. de quad. di-*
git. pag. 298., fig. pag. 301.

Serpenticida sive Muncos. *Rumph. Herb. VIII.*,
pag. 69., tab. 28., fig. 2. & 3.

Viverra Mungo. *Kœmpfer, Amanit. pag. 574.*

Ichneumon. Mus Pharaonis. *Prosp. Alpin., Hist.*
Aegypti, pag. 234 & 235., tab. XIV., fig. 3.

Ichneumon ou rat de Pharaon, *Maillet, Description*
de l' Egypte, pag. 34., fig. ibid.

Mustela Aegyptiaca. Ichneumon, id est, investiga-
tor. *Mus Pharaonis*; *mus Aegypti*; *Damula*;
Donola; *mustela Aegypti peculiaris. Lucra Aegypti.*
Klein., de Quad. pag. 64.

Males [Ichneumon] digitis mediis longioribus, la-

ti (a) ; ma il suo appetito per la preda è ancora più vivo, e il suo istinto più esteso di quello del gatto, perchè dà la caccia egualmente agli uccelli, ai quadrupedi, ai serpenti, alle lucerte, agl' insetti, si avventa generalmente a tutto ciò, che gli sembra vivo, e si pasce di qualsivisia sostanza animale; il suo coraggio è eguale all' ardenza del suo appetito; non si sgomenta nè della collera dei cani, nè della malizia dei gatti, nè teme per fino la morsicatura de' serpenti, gli perseguita con estremo furore, gli assalta e gli uccide per quanto sieno velenosi, e quando comincia a sentire le impressioni del loro veleno, va in cerca degli antidoti, e singolarmente di una radice (b) che gl' Indiani

teralibus aequalibus subuniformibus. Voyage de Hasselquist. , art. iv. , pag. 191.

The Indian Ichneumon. Edwards, Hist. of Birds, fig. iv. , pag. 199.

Mustela pilis ex albido & nigricante variegatis vestita. Ichneumon, mus Pharaonis. Ichneumon ou la mangouste, vulgairement le rat de Pharaon. Brissl. Reg. anim. pag. 250.

Ichneumon. Viverra caudà è basi incrassatà sensim attenuata. Linn. Syst. nat edit. x.

(a) *Mihi ichneumon fuit utilissimus ad mures ex meo cubiculo fugandos... unum alui à quo murium damna plane cessurunt si quidem quotquot offendeat interimebat, longèque ad hos necandos fugandosque fele est ichneumon utilior. Prosp. Alp. Descript. Egypt. Lib. IV., pag. 235.*

(b) *Primum antidotum... radix est plantæ malaice*

hanno nominata dal suo nome, e che dicono essere uno de' più sicuri e più potenti rimedj contro la morficatura della vipere o dell' aspidè; esso mangia le uova del cocodrillo, come quelle delle galline e degli uccelli, uccide e mangia pure i piccoli cocodrilli (a),

Hampaddu-Tanah id est Fel terræ dicta à sapore amarissimo... Lusitanis ibidem Raja seu radix mungo appellata à mustelâ quâdam seu viverrâ Indis mungustia... appellata quæ radicem monstrasse & ejus usum... prima... prodidisse creditur... Indi igitur... præcipue qui Sumatram & Javam incolunt sive usum à mustelâ edocti sint sive casu quodam invenerint radicem pro explorato habent antidoto. Kæmpfer, *Amanit.* p. 574. — Nell' India vi è una radice, che non produce nè troneo, nè rami, nè foglie, la quale si chiama *chiri*, nome che trae da un animale, che fa solo conoscerla, e trovarla. Questo animale è grande come una martora, e le somiglia assai nella forma, fuorchè d'esserne più corpulento; il colore del pelo è scuro; è duro, teso e riccio come quello del cignale, ma men lungo; la coda è carnosa, liscia e unita come quella della martora. L' antipatia, che questo animale ha verso i serpenti è straordinaria; e pare che non si occupi in altro, che ad insidiarli.... I cacciatori hanno osservato, che va a dissotterare la radice, di cui abbiamo favellato, sia per risanarsi, sia per preservarsi dal veleno... si riguarda come il migliore antidoto, che siavi nell' India. *Voyage du P. Vincent Marie*, traduzione comunicata dal Sig. Marchese di Montmirail.

(a) L' *Iceumone* o ratto di *Pharaone*, è una specie di porchetto salvatico, grazioso e facile ad addimesticarsi, che ha il pelo riccio come un

quantunque sieno già fortissimi poco tempo dopo, che sono usciti dall' uovo ; e siccome la favola vien sempre dagli uomini soggiunta alla verità , si è preteso , che per virtù di questa antipatia pel cocodrillo, l'icneumone entri nel corpo di lui quando è addormentato, e che non ne esca se non dopo avergli lacerate le viscere.

I Naturalisti hanno creduto , che vi fossero molte specie d' icneumoni, perchè ve n'ha di più grandi e di più piccoli , e di peli differenti ; ma se si riflette, che essendo spesso allevati nelle case , hanno dovuto come gli altri animali domestici soffrire delle varietà, sarà facile persuadersi , che questa diversità di colore, e questa differenza di grandezza non dinotano , che semplici varietà , e non bastano per costituire delle specie , mentre ne' due icneumoni che io ho veduti vivi e in molti altri , le cui pelli erano lanugino-se , ho riconosciuti i digradamenti intermedj così per la grandezza , come pel colore , ed ho notato , che neppur uno era diverso

porco spinoso ; è nimico degli altri ratti , e sopra tutto dei cocodrilli ; non solo ne divora le uova , di cui si nutre , ma si avventa ancora animosamente ai piccoli cocodrilli , che ben fa farne preda prendendoli nel collo , in difetto della testa . *Description de l' Egypte , par Maillet , page 34.*

da tutti gli altri per alcun carattere evidente e costante; par solo, che nell' Egitto, dove gl'iceumoni sono per così dire domestici, sieno più grandi, che nelle Indie, dove sono selvatici (a).

(a) Questo iceumone [dice Edwards] veniva dalle Indie orientali, ed era assai piccolo; ne ho veduto un altro venuto dall' Egitto, ch' era più del doppio... La sola differenza, che vi avea, oltre la grandezza, fra i due iceumoni, si è che quello dell' Egitto avea un piccolo fiocco di pelo all' estremità della coda, laddove la coda di quello delle Indie terminava in punta, ed io credo, che ciò formi due specie distinte e separate, perchè quello delle Indie, ch' era così piccolo al paragone di quello dell' Egitto, tuttavia era giunto al sommo suo aumento. *Edwards*, pag. 199. *Nota*. Queste differenze non mi sono sembrate bastevoli per stabilire due specie atteso che fra i più piccoli, e i più grandi, cioè fra tredici, e ventidue pollici di lunghezza se ne trovano d'intermedj, come di quindici e diciassette pollici di grandezza. *Seba* che ha data la figura, e la descrizione. [Vol. I., pag. 66., *tav. XII.*] d' uno di questi piccoli iceumoni, che avea avuto vivo, e che gli era stato mandato da Ceylan, dice, ch' era bruttissimo, e che non si è potuto addimesticare; questa diversità di naturale potrebbe far pensare, che questo piccolo iceumone sia d'una specie diversa dalle altre: nondimeno esso rassomiglia esattamente a quelli, di cui abbiám parlato, che non v' ha dubbio che non sia lo stesso animale: d' altra parte posso accertare io stesso d' aver veduto uno di questi piccoli iceu-

I Nomenclatori, i quali non vogliono mai che un essere non sia che ciò ch'egli è, cioè che sia il solo del suo genere, hanno variato assai al soggetto dell'icneumone. Il Sig. Linneo ne aveva da principio fatto un tasso, e in seguito un furetto; Hasselquist dopo le prime lezioni del suo Maestro ne ha fatto pure un tasso; I Sig.ri Klein e Brisson l'hanno posto nel genere delle donnole, altri ne hanno fatta una lontra, ed altri un ratto; io non riferisco tali idee, che per far vedere il poco fondamento, che hanno nel capo stesso di quelli, che le creano, ed anche per farsi cauto in queste denominazioni, che chiamano generiche, e che quasi tutte son false, o almeno arbitrarie, indeterminate, ed equivoche (a).

moni, ch'era così domestico come dice il suo Padrone [il Sig. Presidente di Robien] che lo amava assai, che lo recava sempre nel suo cappello, e faceva a tutti l'elogio della sua graziosità e pulitezza.

(a) Hasselquist termina la sua lunga ed arida descrizione dell'icneumone con queste parole: *Galli in Aegypto conversantes qui omnibus rebus quas non cognoscunt, sua imponunt nomina ficta appellarunt hoc animal rat de Pharaon. Quod sequuti qui Latine relationes de Aegypto dederunt, Alpin, Belon, murem Pharaonis effinxerunt. Se quest' uomo avesse letto solamente Belon e Alpin, ch'egli era, avrebbe veduto, che non sono i Francesi, che hanno dato il nome di ratto di Fa-*

L' *iceumone* abita volentieri le rive dell' acque ; nelle innondazioni passa i luoghi elevati, e si avvicina sovente alle abitazioni per cercarvi qualche preda , cammina senza fare alcun romore , e secondo il bisogno cangia l' andatura ; talvolta porta la testa alta, raccorcia il corpo, ed ergesi sulle gambe ; altre volte si striscia, e si allunga come

raone all' *iceumone*, ma gli Egizj medesimi, ed egli si sarebbe attenuto da prendere da ciò occasione di parlare della Nazione Francese ; ma non ci dee sorprendere il trovare l' accusa di un pedante nell' opera di uno scolaro : infatti questa descrizione dell' *iceumone* , siccome quella della giraffa , e di alcuni altri animali dati da questo Nomenclatore , non potranno servire ad altro se non se a nojare i leggitori : 1. Perchè sono essi senza figure, nè il numero delle parole può supplire alla rappresentazione , un' occhiata vale in questo genere più che una lunga descrizione di parole : 2. Perchè sono queste di un latino barbaro , o piuttosto non sono di nessun linguaggio : 3. Perchè il metodo di queste descrizioni non è che una pratica, che ciascuno può seguire, e che non suppone nè ingegno, nè intendimento : 4. Perchè la descrizione essendo troppo minuta, i caratteri rimarchevoli, singolari e distintivi dell' essere, che si è descritto, vi sono confusi coi segni più oscuri, più indifferenti, e più equivoci : 5. Finalmente il numero troppo grande dei piccoli rapporti, e delle combinazioni precarie, onde è duopo occupare la memoria, stanca più il leggitore, che l' Autore, e lascia entrambi quali erano ignoranti. Una prova, che con questo metodo si omette

un serpente, spesso si siede sui piedi di dietro, e più sovente ancora si vibra come un dardo sopra la preda, che vuol ghermire; ha gli occhi vivi e denti di fuoco, la fisionomia delicata, il corpo agilissimo, le gambe corte, la coda grossa e lunghissima, il pelo ruvido, e sovente arricciato; il maschio e la femmina (a) hanno un'apertura

no-

di leggere, e d'istruirsi si è, 1. la falsa accusa che fa l'Autore ai Francesi al proposito del ratto di Faraone; 2. è l'errore, in cui cade dando a questo animale il nome Arabo *Nems*, mentre questa parola Araba è il nome del furetto, e non quello dell'icneumone; non era neppure mestieri saper l'Arabo per evitare questo mancamento, sarebbe bastato leggere i viaggi di quelli, che lo avevano preceduto nello stesso paese. 3. L'omettere le cose essenziali nel tempo medesimo, che si diffonde sulle indifferenti; per esempio egli descrive la giraffa così minutamente, come l'icneumone, e tralascia il carattere essenziale, che è di sapere se le corna sieno permanenti, o se gli cadano ogni anno; in venti parole più del bisogno non vi si trova la parola necessaria, e non si può giudicare dalla sua descrizione se la giraffa sia del genere dei cervi o di quello de' buoi. Ma abbastanza ci siamo fermati su una critica, che ogni uomo giudizioso non mancherà di fare, quando si sili opere gli verranno in mano.

- (*) Gli Abitanti di Alessandria nutrono una bestia nominata *ichneumon*, che si è trovata in Egitto. Si può addomesticare nelle case come un gatto, o un cane. Il volgo ha lasciato di appellarla col suo nome antico, perchè la chia-

notabile , e indipendente dai condotti naturali , una specie di borsa , in cui si filtra un umore odoroso ; si pretende , che l'ichneumene apra questa borsa per rinfrescarsi quando ha troppo caldo : il suo muso troppo acuto , e la sua bocca stretta gl' impediscono di afferrare e mordere le cose un po' grosse , ma fa esso supplire coll' agilità , e col coraggio all' armi , e alla forza , che gli mancano ; egli strozza agevolmente un gatto , quantunque più grosso e più forte di lui , spesso si azzuffa coi cani anche più grandi , e si fa rispettare da essi .

Questo animale cresce in poco tempo e non vive assai (a) ; se ne trovano in gran
Tom. XXVI. L

mano col loro linguaggio , ratto di Faraone . Ora noi abbiain veduto , che i contadini ne recavano dei piccoli al mercato di Alessandria , dove sono ben accolti per mantenere in casa a motivo che danno la caccia ai ratti . . . ai serpenti ec. Questo animale è astuto nel cercarsi il cibo . . . mangia indifferentemente d' ogni carne viva , come gli scarafaggi , lucertole , camaleonti , e generalmente ogni sorta di serpenti , ranocchi , ratti e forci ; è ghiotto degli uccelli , dei pollastri e delle galline : quando è corrucciato arriccia il pelo . . . ha un segno particolare il che è un gran buco tutto attorniato di pelo fuori del condotto degli escrementi quasi simile al membro laido delle femmine , il qual condotto egli apre quando ha caldo . Bellon , *Obs. feuil.* 95. verso .

(a) *Feles & ichneumon tot numero pariunt quot canes, vescunturque eisdem, vivunt circiter annos sex . Arist. Hist. anim. lib. VI. cap. 35.*

copia in tutta l'Asia meridionale (a), dall'Egitto fino a Giava, e par che se ne trovino anche nell'Africa fino al capo di Buona-speranza (b); non si può allevare con facilità, nè conservarlo lungo tempo nei nostri climi temperati qualunque diligenza si usi; il vento gli nuoce, il freddo l'uccide; per evitare l'uno e l'altro egli si strigne in giro, e nasconde la testa sotto le colce. Ha una

(a) *Mungos alunt rura calentis Asiae omnis, usque ad Gangem, etiam in iis regionibus in quibus radix mungo numquam germinavit.* Kœmpf. *Amenit.* pag. 574. — L'icneumone è un piccolo animale graziosissimo fatto quasi come le donnole di Francia.... ma di un colore incomparabilmente più vago.... Il bianco e il nero dominano su d'ogni pelo, e v'è una specie di rosso, che si mischia e confonde col bianco e col nero. La coda è vestita d'un pelo egualmente colorito e più lungo di quello del corpo. Ha la testa coperta d'un piccolo pelo corto; gli occhi sono grossi, e le orecchie corte e rotonde: questo icneumone avea due piedi e mezzo di lunghezza dalla testa fino all'estremità della coda.... veniva dal regno di Calcut, ed è stato recato in Francia in una nave della nostra squadra; visse a Parigi cinque mesi, e divenne assai famigliare. *Curiosit. de la Nat. & de l'Art. Paris, 1703., pag. 211.*

(b) L'icneumone è della grandezza di un gatto, ma ha la forma di un topo campagnuolo.... Tutto il suo corpo è coperto di peli lunghi, ruvidi, vergati e macchiati di bianco, nero e giallo. Questo animale, che è comunissimo nelle campagne del Capo, è un gran distruggitore dei serpenti e degli uccelli. *Description du Cap de Bonne-esperance, par Kolbu, Tome III. chap. 5.*

voce esile e dolce, una specie di mormorio, e il suo strido non si fa aspro se non quando si irrita e si percuote: del rimanente l'*ichneumone* era venerato dagli antichi Egiziani, e meriterebbe ancora oggidì d'essere conservato, poichè distrugge un gran numero di animali nocivi, e sopra tutto i cocodrilli, di cui sa trovare le uova, quantunque nascoste nell'arena; sono così numerosi i parti di questi animali (a), che sarebbe a temere della loro moltiplicazione, se l'*ichneumone* non ne distruggesse i germogli.

(a) Il maggior servizio, che l'*ichneumone* renda all'Egitto si è di spezzare le uova dei cocodrilli quante ne trova; ed è perciò, che gli antichi Egiziani gli porgevano un culto religioso. *Voyage de Paul Lucas*, Tom. III. , pag. 203. — Con ragione gli antichi Egiziani adoravano l'*ichneumone* ossia ratto di Faraone. Diceasi, che di quattrocento uova, che in ogni volta depone il cocodrillo, per preservarne alcuno dal furore di questo nimico mortale della sua specie, è costretto di trasferirle in alcune isolette, quando si è ritirato il Nilo. *Description de l'Egypte par Maillet*, Tom. II. pag. 129.



D E S C R I Z I O N E
DELL' ICNEUMONE o MANGOSTA.

L' Icneumone è preffo a poco della lunghezza della faina, a cui parimente raffomiglia per la fua figura, poichè ha piatta la fommità della tefta, l'eftrimità del mufo puntuta, la tefta piccola, le orecchie corte e rotonde, il collo corto e quafi egualmente groffo che la tefta, il corpo allungato, le gambe corte e la coda lunga, ma coperta di pelo men folto all'eftrimità che quella della faina.

Il pelo dell' icneumone è duro e colorato di biancaftro e di nericcio: quefti colori fi fuccedono l'uno all'altro tre, quattro o cinque volte nella lunghezza dei peli: il nericcio è poco carico, e vi ha una tinta di rofficcio ful pelo della gola, del petto e delle gambe: quello dell'eftrimità del mufo, della giuntura della mano e dei piedi è molto corto e di color mifchiato di nericcio e di roffo. I più lunghi peli hanno fino a due pollici e mezzo. Tra i detti peli duri vi ha una fpecie di lanugine più corta e di color rofficcio.

I denti, i diti e le ugne raffomigliano ai denti, ai diti e alle ugne della faina pel numero, per la pefitura e per la forma, eccettuati i due denti incifivi efteriori della mafcella fuperiore, che nell' icneumone fono a proporzione più piccoli.

Quello che ha servito di soggetto per questa descrizione era disseccato e imbottito; aveva ventidue pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda, ch' era lunga venti pollici.

Ho veduto un altro iceumone nello stesso stato che il precedente, e che gli rassomigliava perfettamente per la forma del corpo, per la qualità e pe' colori del pelo; ma era molto più piccolo, poichè non aveva che tredici a quattordici pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda, la cui lunghezza non era che di nove o dieci pollici. Ho parimente veduto un iceumone vivo [*tav. XVII.*, *fig. 2.*], ch' era presso a poco di questa stessa grandezza. Paragonando questi due iceumoni con quello che ha servito di soggetto per la presente descrizione, si trova una differenza sì considerevole, che fa credere che il piccolo iceumone fosse d' una specie differente da quella del grande (a): ma parmi che avvenga degl' iceumoni come delle donnole (b); esse sono di diverse grandezze, benchè della medesima specie. Ne ho veduto uno, ch' era disseccato e imbottito; perfettamente simile a quello, di cui ho già fatta menzione, e di grandezza mezzana tra i piccoli e l' grande, poichè aveva diciassette pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino

L 3

(a) Vedi il Regno animale, pag. 251.

(b) Vedi il Tomo XV. di quest' Opera, pag. 26.

all'origine della coda, che non era intera.

Vi son pure delle differenze (ne' colori del pelo degl' icneumoni : quello ch' è rappresentato [*tab. XVII., fig. 2*] ci è stato comunicato vivo dal Sig. Cavaliere d'Arcy, Socio della Reale Accademia delle Scienze. Questo icneumone era femmina: i lati, il disopra e 'l didietro della testa, - il collo, il petto, i lati del corpo, e la faccia esteriore del braccio e della coscia avevano un color biancastro mischiato di nero e di fulvo, perohè la punta della maggior parte de' peli era biancastra, e quella degli altri era fulva: essi avevan tutti un color grigio verso la radice, ed eran neri nel mezzo della loro lunghezza. Il pelo delle due labbra e del disotto della mascella inferiore era fulvo: sul corpo dal collo fino all' origine della coda eranvi, due fasce trasversali, che mettevano capo verso il mezzo dei lati del corpo: queste fasce erano alternativamente di color fulvo-chiaro e di color nero, e tanto meno apparenti, quanto più presso alla coda erano situate. Il basso delle gambe era nero: l' estremità della coda aveva lo stesso colore, con qualche apparenza di fulvo: il resto era mischiato di biancastro, di fulvo e di nero.

LA FOSSANA (a).

ALCUNI Viaggiatori hanno appellata la Fossana, *Ginetta di Madagascar*, perchè rassomiglia alla ginetta pei colori del pelo, e per alcuni altri rapporti: tuttavia è più piccola costantemente; e ciò, che c'induce a pensare, che non sia una ginetta si è, che non ha la borsa odorifera, che in questo animale è un attributo essenziale. Siccome eravamo dubbiosi su questo fatto, non avendo potuto procacciarci l'animale per notomizzarlo, così abbiamo per lettere consultato il Sig. Poivre, che ci ha mandata la pelle lanuginosa, e si è compiaciuto di risponderci nel tenore seguente: *Lyon 19. Luglio 1761.* „ La fossana che io ho recata da „ Madagascar, è un animale, che ha i co- „ stumi della nostra faina: gli abitanti dell' „ isola mi hanno assicurato, che la fossana „ maschio quando è caldo tramanda un forte „ odore di muschio. Quando io ho fatto „ impagliare quello, che è nel giardino del „ Re, io l'ho esaminato attentamente, non „ vi ho scoperta alcuna borsa, e non ho „ sentito odore alcuno. Ho allevato un ani- „ male somigliante alla cocincina, e un altro

L 4

(a) *Fossa* o *Fossane* nome di questo animale nel Madagascar, e che noi abbiamo adottato.

„ alle isole Filippine entrambi maschi , i
„ quali si addimesticarono ; io gli ho avuti
„ piccolissimi , e gli ho ritenuti poco più
„ di due o tre mesi ; non vi ho mai tro-
„ vata borsa nelle parti , che m'indicate ,
„ mi sono soltanto avveduto , che i loro escre-
„ menti avevano lo stesso odore di quelli
„ della nostra faina . Mangiavano carne e
„ frutti , ma preferivano questi , e manife-
„ stavano un gusto più determinato per gli
„ banani , che mangiavano ingordamente .
„ Questo animale è selvatico assai , e difficile
„ ad addimesticarsi , e quantunque allevato
„ da piccolissimo conserva sempre un' aria e
„ un carattere di ferocia , il che mi parve
„ straordinario in un animale , che si pasce
„ volentieri di frutti . L'occhio della fossana
„ non è a vederli , che un globo nero assai
„ grande , paragonato alla grossezza della
„ sua testa , il che dà a questo animale un'
„ aria cattiva .“

Noi siamo contentissimi di avere questa occasione di dare un contrassegno della nostra riconoscenza al Sig. Poivre , che pel piacere della Storia Naturale , e per amicizia con quelli , che la coltivano ha fornito il Gabinetto di un gran numero di cose rare e preziose di ogni qualità .

A nostro giudizio l'animale appellato *Berbè* nella Guinea è lo stesso della fossana , e conseguentemente questa specie si trova in Africa

siccome in Asia. „ Il berbè, dicono i Viag-
giatori (a), ha il muso più acuto e il
„ corpo più piccolo del gatto, è punteggiato
„ come la civetta. „ Non conosciamo noi
animale alcuno, a cui questi indizj cotanto
precisi convengano meglio, che alla fossana.

(a) Voyage en Guinée par Bosman, pag. 256.
fig. n. 1. pag. 252.



DESCRIZIONE DELLA FOSSANA.

LA fossana [*tav. XVIII., fig. 1.*] ha molta relazione alla ginetta per la figura del corpo e pe' colori del pelò; ma m'è paruto ch'essa ne sia diversa per un carattere essenziale, ch'è la borsa odorifera situata nella ginetta tra le parti della generazione e l'ano. Egli è vero ch'io non ho mai veduta una fossana intera, e quì non riferisco che la descrizione d'una pelle imbottita, ch'è nel Gabinetto. A questa pelle erano attaccate le mascelle e gli ossi de' piedi. La fossana ha; denti simili a quelli della ginetta, non solo pel numero, ma anche per la forma e per la situazione, e vi son cinque diti a ciascun piede. La fossana ha pure presso a poco le medesime tinte di grigio, di nero e di rosso, che si vedono sulla ginetta, ma su varie parti son diversamente distribuite: il frontale, la fronte, il disopra e i lati della testa hanno un color mischiato di bruno, di rossiccio e di grigio; al disopra dell'occhio, dal lato dell'angolo posteriore vi ha una macchia, ch'è d'un bianco sporco e leggermente tinta di giallo, e che ha quattro linee in circa di diametro: il disopra e i lati del collo e del corpo fino all'origine della coda hanno gli stessi colori, con fasce o macchie nere. Quattro fasce s'estendono

dal mezzo del collo lungo il dorso fino alla coda, ma non sono continuate che fino al mezzo del dorso: nel resto della loro lunghezza son composti di macchie situate molto vicine le une alle altre; vi si veggono delle macchie presso a poco simile sulla parte posteriore dei lati del collo, sulle spalle, su i lati del petto e del ventre, e sulla faccia esterna delle cosce. La maggior parte di queste macchie son situate su due linee in qualche modo parallele tra esse e alle fasce del corpo; eranvi tre di tali linee su ciascun fianco. Il labbro superiore, la mascella inferiore, la gola, il disotto del collo, il petto, il ventre, i contorni della vulva e dell' ano, e 'l disotto della coda presso alla sua origine hanno un color bianco-sporco, o biancastro: il restante della coda e la faccia esterna della coscia sono d'un color mischiato di rosso, di grigio e di bianco-sporco: la coda aveva in oltre dei mezzi anelli stretti e di color rosso, che non s'estendevano sul lato inferiore. Le gambe anteriori, la faccia interna della coscia, le gambe propriamente dette e i quattro piedi sono d'un bianco assai sporco e anche gialliccio.

La pelle di fossana, che ha servito di soggetto per questa descrizione aveva diciassette pollici di lunghezza dall'estremità del muso fino all'origine della coda, ch'era lunga otto pollici e mezzo.

IL VANSIRO (a).

QUelli che hanno parlato di questo animale l'hanno preso per un furetto, a cui in fatti somiglia per molti riguardi, tuttavia n'è diverso per caratteri, che a noi sembrano, sufficienti a costituirne una specie separata e distinta. Il vansiro ha dodici denti mascellari nella mascella superiore, laddove il furetto non ne ha che otto; e i mascellari inferiori, quantunque in egual numero di dieci in questi due animali, non si rassomigliano nè per la forma, nè pel sito rispettivo: altronde il vansiro è diverso pe' colori del pelo da tutti i nostri furetti, sebbene questi, siccome tutti gli animali, che l'uomo intraprende ad allevare, e a far moltiplicare, varjano assai in fra di loro perfino tra la femmina e il maschio.

Sembraci, che l'animale indicato da Se-

(a) *Vansiro*, parola derivata da *Vohang-shira*, nome di questo animale nel Madagascar. La provincia di Balta nel regno di Congo ha una moltitudine infinita di belle martore, che hanno il nome d' *Insire*. *Histoire générale des Voyages*, Tome V. page 87. *Nota*. Non vi sono martore nel Congo, e la somiglianza del nome ci fa credere, che l'insire del Congo potrebb' essere il vansiro di Madagascar.

ba (a) sotto la denominazione di *donnola di Giava*, ch'ei dice; che gli abitanti di quest' isola appellano *Koger-Angan*, e che dipoi il Sig. Briffon (b) ha nominato *furetto di Giava*, sia forse lo stesso animale del vansiro; almeno esso è, che fra tutti gli animali a noi noti più gli si avvicina; ma ciò, che c'impedisce a decidere egli è, che la descrizione di Seba non è abbastanza compiuta per istabilirne il giusto paragone, che farebbe necessario per giudicarne senza timore. Noi la sottoponiamo qui agli occhi del leggittore (c), onde possa egli medesimo confrontarla colla nostra.

-
- (a) *Mustela Javanica*. Ab incolis Javae Koger-angan vocatur. Seba, Vol. I. pag. 77. n. 4. tab. 48. fig. 4.
 (b) *Mustela supra rufa, infra dilute Flava, caudæ apice nigricante* *Viverra Javanica*. Le furet de Java. Briff. Regn. anim. pag. 245.
 (c) *Javanica hæc mustela, hic representata collo & corpore est brevioribus quam nostras; caput tegentes pili obscure spadicei sunt, rufi qui dorsum, dilute vero flavi qui ventrem vestiunt, caudâ interim in apicem acutum & nigricantem desinente*. Seba, Vol. I. pag. 72.

DESCRIZIONE.

DEL VANSIRO.


IL vansiro rappresentato sulla tavola XVIII., fig. 2. fu portato da Madagascar sotto il nome di *Voang-Shira*, di cui ho formato quello di vansiro per facilitarne la pronunzia. Questo animale è stato dato per un furetto: egli è imbottito, e colla pelle non restanvi che gli ossi de' piedi e della testa. I denti vi son tutti ben conservati, e rassomigliano presso a poco ai denti del furetto, della faina, dell' icneumone ec., ma ne son diversi per la situazione dei mascellari. Il vansiro ne ha dodici all' alto e dieci al basso: per questo carattere egli è ben diverso dalla faina e dall' icneumone, che al contrario hanno dieci mascellari superiori e dodici inferiori; egli è anche diverso dal furetto, che non ha che otto mascellari all' alto, e benchè il furetto ne abbia dieci al basso come il vansiro, pure si trovan tuttavia tra questi due animali delle differenze riguardo ai detti denti mascellari inferiori, che non si rassomigliano che pel numero, senza corrisponderli per la figura nè per la positura. Il vansiro adunque non è un furetto, e sembrami essere una specie d' animale particolare, che ha relazione al furetto, alla faina, e all' icneumone per la forma allungata del suo corpo, pel muso puntuto, per le orecchie corte ec.

Descrizione del Vanfiro . 199

Il pelo è men lungo di quello della faina e della martora, e i suoi colori sono gli stessi sopra tutte le parti del corpo: mirando l'animale da lungi sembra di color bruno carico, ma veggendolo da vicino si scorge che vi ha una lanugine bruna tra i peli sodi, e che questi peli non son bruni che verso la radice; il resto ha del nericcio e del rossiccio, i quai colori si succedono per via di piccoli intervalli fino alla punta. Questi due colori occupano successivamente tutta la lunghezza dei peli della coda. Quelli del corpo non son lunghi che sette o otto linee.

Vi son cinque diti a ciascun piede. I denti sono al numero di trent' otto, cioè sei incisivi e due canini in ciascuna mascella, dodici mascellari superiori, e dieci inferiori, come già si è detto.

Questo vanfiro ha tredici pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda, il cui tronco è lungo sette pollici; i peli s' estendono due pollici e mezzo al di là di esso.



FINIS

Adm. Libr. Mus. Nat. Hist. Paris

DESCRIZIONE
DELLA PARTE DEL GABINETTO
Che ha rapporto alla Storia Naturale
DELL' HAMSTER, DEL BOBAK,
DELL' ICNEUMONE,
DELLA FOSSANA E DEL VANSIRO.

Num. MCCXLII.

Questo è lo scheletro che ha servito di soggetto per la descrizione e per le misure degli ossi dell' hamster.

Num. MCCXLIII.

L'osso ioide d'un hamster.

Quest'osso è composto di cinque pezzi, una base e quattro corni, due piccoli e un grande. La base è molto lunga in paragone dei corni.

Num. MCCXLIV.

Un bobak.

Quest'animale è disseccato e imbottito: egli ha servito di soggetto per la descrizione del bobak. L'uno dei piedi di dietro n'è in parte tagliato per far vedere la struttura del pollice, ch'è diverso da quello della marmotta.

Num. MCCXLV.

Un icneumone lungo ventidue pollici.

Descrizione del Gabinetto . 201

Num. MCCXLVI.

Un icneumone lungo diciassette pollici.

Num. MCCXLVII.

Un icneumone lungo quattordici pollici.

Sembra che questi tre icneumoni siano della medesima specie, benchè siano di diverse grandezze: son simili per la qualità e pe' colori del pelo, ed anche per la forma del corpo per quanto se ne può giudicare su questi individui, che sono stati votati, disseccati e imbottiti. Le loro descrizioni fanno parte di quella dell'icneumone. Si dee presumere che le loro differenze di grandezza non provengano che dall'età, dal sesso o forse dal clima.

Num. MCCXLVIII.

Una fossana.

Num. MCCXLIX.

Un vanfiro.

Quest' animale, e quello ch' è sotto il numero precedente, furono portati da Madagascar dal Sig. Poivre: sono nello stesso stato che i tre icneumoni di sopra accennati, ed hanno servito di soggetti per le descrizioni della fossana e del vanfiro.



I MAKI (a).

Siccome si è dato il nome di maki a molti animali di specie differenti, così noi non possiamo usarlo se non come un termine generico, sotto il quale comprendiamo tre animali, che si rassomigliano bastevolmente per essere dello stesso genere, che sono pure diversi per un numero di caratteri sufficienti a costituire delle specie evidentemente diverse. Questi tre animali hanno una lunga coda, e i piedi di scimia; ma il loro muso è prolungato come quello della faina, ed hanno alla mascella inferiore sei denti incisivi, laddove tutte le scimie non ne hanno che quattro. Il primo di questi animali è il mococo (b), che è noto volgarmente sotto il no-

(a) Nota. Egli sembra, che la parola *Maki* sia derivata da *mocok* o *maucauc*, che è il nome, che si dà comunemente a questi animali a Mozambico e nelle isole vicine a Madagascar, onde sono originarij.

(b) *Mocok* o *mococo*, nome di questo animale nelle coste orientali dell' Africa, e che noi abbiamo adottato. „ L' isola di Johanna sulla costa di Mo-
„ zambico produce una specie di bestie, che ras-
„ somigliano alla volpe, e che hanno l'occhio
„ vivissimo; il pelo è lanoso e del colore del
„ forcio: la coda, che ha circa tre piedi di
„ lunghezza, è screziata di cerchi neri in distan-
„ za di un pollice; gli abitanti li chiamano

me di *maki dalla coda inanellata*. Il secondo è il mongous (a) detto volgarmente *maki bruno*; ma questa denominazione gli è stata mal applicata, perchè in questa specie vene ha di bruni interamente (b), di altri, che hanno le gote e i piedi bianchi (c), e d' altri ancora, che hanno le gote nere e i piedi gialli (d).

„ *mocok*. Quando si prendono molto giovani si addimesticano in breve tempo. “ *Voyage de Fr. Henri Grosse*; Londra, 1758. pag. 42. Si chiama pure questo animale *vary* nel Madagascar.
 „ Fra gli Ampatri e Meafalli vi sono molte scimmie bianche, che appellano *vary*, le quali hanno la coda vergata di nero e di bianco. “ *Voyage de Flaccout*, pag. 154.

Prosimia cinerea, caudâ cinclâ annulâ alternatim albis & nigris.... Il maki dalla coda inanellata. Briss. *Regn. anim.* pag. 222.

The maucauco. Edwards, *Hist. of Birds*, pag. 197. fig. *ibid.*

Catta. Lemur caudâ annulatâ. Linn. *Syst. nat.* edit. X. pag. 30.

(a) *Mongous*, nome di questo animale nelle Indie orientali, e che noi abbiamo adottato.

(b) *Simia sciurus lanuginosus fuscus*. Petiver *Gazophyl.* tab. 17. fig. 5.

(c) *Prosimia fusca*. Il maki. Briss. *Regn. anim.* pag. 220. *Prosimia fusca, naso, gatture & pedibus albis*..... Il maki dai piedi bianchi. Briss. *Regn. anim.* pag. 221.

The mongooz. Le mongous. *Glanures Edwards*, pag. 12. fig. *ibid.*

(d) *Prosimia fusca, rufo admixto, facie nigra, pedibus fulvis*..... Il maki dai piedi fulvi. Briss. *Regn. anim.* pag. 221.

Il terzo è il vari (a), appellato da alcuni *maki-pie*; ma non gli si conviene tal nome, perchè in questa specie, oltre a quelli, che sono pies, cioè bianchi e neri, ve n'ha de' perfettamente bianchi, e perfettamente neri (b). Questi quattro animali sono tutti originarij delle parti dell' Africa orientale, e specialmente di Madagascar, dove se ne trovano assai.

Il mococo è un animal grazioso, d'una fisionomia gentile, d'una figura avvenente e svelta, di un bel pelo sempre pulito e terso; è rimarchevole per la grandezza degli occhi, per l'altezza delle gambe di dietro, che sono assai più lunghe di quelle dinanzi, e per la sua bella ed ampia coda, che è sempre sollevata e sempre in moto, e su cui si numerano fin trenta anelli alternativamente neri e bianchi, tutti ben distinti e ben separati gli uni dagli altri; ha costumi placidi, e quantunque somiglj in molte cose alle scimie, nondimeno non ne ha la malizia, nè il naturale. Nel suo stato di libertà vive

(a) *Vari o Varicossi*, nome di questo animale nel Madagascar, e che noi abbiamo adottato. „ Ci „ sono nel Madagascar delle grandi scimie bian- „ che, che hanno delle macchie nere su i lati, „ e sulla testa, e che hanno il muso lungo, „ come la volpe; le nominano a Manghabey „ *varicossi*. „ *Voyage de Flaccourt*, pag. 153.

(b) *The black maucauco*. Le mococo nero. *Gleanures d'Edwards*, pag. 13. fig. *ibid*.

in compagnia, e si trova nel Madagascar (a) accoppiato a truppe di trenta o quaranta; in quello di cattività, non è incomodo, che pel moto prodigioso, onde si agita e scuote; e perciò solo si tiene sempre incatenato, perchè quantunque assai spiritoso e vivo non è nè selvatico, nè cattivo; si addimestica così, che si può lasciare in libertà senza temere che fugga; la sua andatura è obliqua come quella di tutti gli animali, che hanno quattro mani in luogo de' quattro piedi; salta in guisa assai graziosa, e più lievemente, che non cammina; è assai taciturno, e non fa udire la sua voce, che con un grido breve e acuto, che lascia per dir così sfuggire quando è irritato o sorpreso. Dorme assiso col muso inclinato e appoggiato al ventre: non ha il corpo più grosso di un gatto, ma, lo ha più lungo; e sembra più grande, perchè è più sollevato sulle gambe: il suo pelo quantunque morbidissimo al tatto, non è disteso, ma sempre diritto; il mococo ha le parti della generazione piccole e nascoste, laddove il mongous ha i testicoli grossissimi relativamente alla sua statura, e moltissimo apparenti.

(a) I vari che hanno la coda vergata di nero e di bianco, vanno a trenta, quaranta, a cinquanta. Somigliano ai varicosi. *Voyage de Flaccourt*, pag. 154.

Il mongous è più piccolo del mococo, ha come lui il pelo setoso e affai corto, ma un po' crespo; ha pure il naso più grosso del mococo, e molto simile a quello del vari. Ho avuto presso di me per molti anni uno di questi mongous, che era tutto bruno, ed avea l'occhio giallo, il naso nero e le orecchie corte; si dilettava di mangiarsi la coda, e ne avea consumate le quattro o cinque ultime vertebre; era un animale affai sordido e incomodo, perchè era necessario tenerlo incatenato; e quando poteva fuggire, entrava nelle botteghe del vicinato per cercare dei frutti, dello zuccaro, e sopra tutto delle confetture, di cui apriva le alberelle; riusciva poi molto difficile a ripigliarlo, allora mordeva crudelmente fino i più conosciuti da lui; grugniva quasi continuamente; e quando si annojava o si lasciava solo, si faceva udire molto lontano gracidando come la rana; era maschio, ed aveva i testicoli estremamente grossi rispetto alla sua statura; andava in cerca delle gatte e si soddisfaceva con esse, ma senza intima congiunzione e senza produzione. Temeva il freddo e l'umido, non si allontanava mai dal fuoco, e si teneva diritto per iscaldarsi: si nudriva con pane e frutti; la sua lingua era aspra come quella del gatto; e se si permetteva, leccava la mano perfino a farla rosseggiare, e finiva spesso coll'iscalfirla coi denti. Il

freddo dell' inverno dell' anno 1750. lo trasse a morire , quantunque non siasi mai partito dal cantone del fuoco ; era spiacevole ne' suoi movimenti ; e molto petulante istantaneamente ; nondimeno dormiva spesso di giorno , ma di un sonno così leggiere , che il menomo strepito lo risvegliava . Vi sono in questa specie de' mongous molte varietà , non solo riguardo al pelo , ma alla grandezza ; quello di cui abbiamo di sopra parlato era tutto bruno , e della statura di un gatto di mezzana grossezza . Noi ne conosciamo di più grandi e di affai più piccoli ; ne abbiamo veduto uno , il quale quantunque adulto , non era più grosso di un ghio ; se questo piccolo mongous non fosse simile in tutto al grande , sarebbe senza dubbio di una specie differente ; ma la somiglianza fra questi due individui ci è sembrata tanto perfetta eccettuata la grandezza , che noi abbiamo creduto di doverli ridurre entrambi alla specie medesima , senza distinguergli in seguito con un nome diverso , se non si provasse ; che questi due animali non si mischiano insieme , e che sono così diversi per la specie , come lo sono per la grandezza .

Il vari (a) è più grande , più forte e più

(a) Nota. Flaccourt , che appella il mococo *vari* , dà a questo il nome di *varicossy* : vi è tutta l'apparenza , che *cossy* sia un epiteto accrescitivo per

selvatico del mococo, ed è pure di una perversa ferocia nello stato di libertà. I Viaggiatori dicono „ che questi animali sono furiosi come le tigri, e che fanno tale strepito ne' boschi, che se ve n'è uno, pare, che ve ne siano cento, e che sono difficilissimi da addimesticarsi (a). “ In fatti la voce del vari partecipa alquanto del rugito del liono, e fa spavento a chi la prima volta lo sente; questa forza prodigiosa di voce in un animale, che è di mediocre grandezza dipende da una struttura singolare della trachea, i cui due rami si dilatano e formano una larga cavità prima di riuscire ai bronchi del polmone; è dunque diverso assai dal mococo pel naturale, siccome per la forma; ha generalmente il pelo assai più lungo, e singolarmente una specie di cravatta di peli ancor più lunghi, che gli circonda il collo, e che forma un carattere sensibilissimo, pel quale riesce agevole il conoscerlo; perchè

la grandezza, per la forza o per la ferocia di questo animale, che è in fatti diverso dal mococo per questi attributi, e per molti altri.

- (a) *Voyage de Flaccourt*, pages 153. & 154. *Nota.* Quando questo animale è preso giovane, perde apparentemente tutta la ferocia, e pare mansueto come il mococo. „ E' questo, dice il Sig. Edwards, „ un animale di un naturale socievole, dolce e „ pacifico, che non ha punto della malizia e „ della furberia della scimia. “ *Gleanures*, pag. 13.

perchè nel resto varia dal bianco al nero, nel pelame, il quale sebbene lungo, è morbidissimo, non è disteso all' indietro, ma si alza quasi perpendicolarmente sopra la pelle; ha il muso più grosso e più lungo a proporzione del mococo, le orecchie assai più corte e orlate di lunghi peli; gli occhi di un giallo dorato così carico, che sembrano rossi.

I mocochi, i mangous ed i vari sono dello stesso paese, e sembrano confinati nel Madagascar (a), a Mozambico e in altre terre vicine a queste isole; non pare, per alcuna testimonianza dei Viaggiatori, che se ne sian

Tom. XXVI.

M

(a) La provincia di Melagassa nel Madagascar è popolata da un gran numero di scimie di molte specie; se ne vedono di brune del colore del castoreo, col pelo ricciuto, colla coda larga e lunga, con cui, essendo questa ripiegata sul dorso, si riparano dalla pioggia e dal sole, dormono su i rami degli alberi come lo scojattolo. Del resto hanno il muso come la faina e le orecchie rotonde; questa specie è la meno nocciola e maligna di tutte. Le antavarre hanno lo stesso pelo di queste, ed hanno una specie di collare increspato intorno al collo: ve n'ha di bianche del tutto come la neve, della grossezza delle precedenti, e col muso lungo; grugniscono come i porci. *Relation de Madagascar, par F. Cauche, pag. 127. Nota.* Il mongous e il vari sono indicati con questo passo in una maniera confidabile; e appoggiato a questa autorità ho detto, che vi erano non solo dei vari neri e del colore di gazza, ma ancora degli interamente bianchi.

trovati altrove, e che quelli sieno nell'antico continente ciò, che sono nel nuovo le marmose, i cajopollini, i falangieri, che hanno quattro mani come i maki, e che, come tutti gli altri animali del nuovo mondo, sono assai piccoli in confronto di quelli dell'antico; e rispetto alla forma, i maki sembrano fare un digradamento tra le scimie dalla lunga coda e gli animali fessipedi, perchè hanno quattro mani e una lunga coda come le scimie, e tutt'insieme hanno il muso lungo come le volpi o le faine; tuttavia partecipano più delle scimie per le abitudini essenziali, perchè quantunque mangino qualche volta della carne, e che si dilettono di insidiare gli uccelli, sono tuttavia meno carnivori, che frugivori, e preferiscono anche nello stato di domestichezza i frutti, le radici e il pane alla carne cotta o cruda.



DESCRIZIONE

DEI MAKIS.

I Makis hanno il muso allungato come quello dei cebi, ma sono men grossi: rassomigliano a tutte le scimie, al carigueja, alla marmosa, al cajopollino, e al falangere per la forma de' piedi, ma hanno maggior relazione alle scimie che a quest'ultimi animali pe' denti, quantunque questo rapporto non sia esatto. I makis hanno, come tutte le scimie, quattro denti incisivi al disopra, ma ne hanno sei al basso, e per conseguenza due di più che le scimie; non ostante i makis non hanno in tutto che trenta sei denti, come i sapajous, poichè non hanno che dieci denti mascellari all'altro, mentre i sapajous ne hanno dodici. Il numero dei denti di tutte le altre scimie non è che di trentadue, perch' esse hanno di meno che i makis due mascellari nella mascella superiore, e due incisivi nell'inferiore. Il principal rapporto dei denti dei makis a quelli delle scimie consiste nel numero de' quattro incisivi alla mascella superiore, e la principal differenza si trova nel numero degl' incisivi del disotto, ch' è di sei nei makis, e solamente di quattro nelle scimie. Per distinguere i makis da tutti gli altri quadripedi a noi noti, basta unire i caratteri de' sei denti incisivi della mascella inferiore con quello della for-

ma de' piedi di dietro, che rassomigliano a quelli delle scimie; ma conviene necessariamente che questi due caratteri sieno insieme uniti; il numero de' denti incisivi sì del disopra come del disotto non basterebbe da se solo, perchè la maggior parte de' pipistrelli, il pecari e il babiroussa hanno, come i makis, quattro incisivi al disopra e sei al disotto.

I denti incisivi della mascella inferiore, che sono al numero di sei, e i cinque diti dei piedi posteriori più somiglianti a quelli d'una mano che a quelli d'un piede, formano adunque un carattere proprio e particolare ai makis; benchè questo carattere sia composto, è non ostante men complicato e d'un uso molto più facile di quelli che si son usati ne' migliori metodi di nomenclatura per distinguere i makis dagli altri quadrupedi. Secondo il metodo del Sig. Brisson (*), i makis son distinti da molti altri animali, 1. perchè loro non mancano denti; 2. perchè hanno denti incisivi; 3. perchè le due mascelle hanno denti incisivi; 4. perchè hanno unghie e non *subots*; 5. perchè hanno quattro denti incisivi al disopra e sei al disotto; 6. perchè i diti son separati gli uni dagli altri. Sebbene il pecari e il babiroussa rassomiglino ai makis pel numero de' denti incisivi, nondimeno il quarto carattere impedisce di confonderli co-

(*) Il regno animale diviso in sei classi.

gli altri , perchè il pecari e il babiroussa hanno *fabots* e non unghie come i makis . Confesso che la differenza dalle unghie ai *fabots* , unita al numero degl' incisivi , farebbe egualmente sicura che la forma del piede posteriore per fare il carattere distintivo dei makis : ma parmi che la forma del piede posteriore dovrebbe esser preferita , perchè gli animali che hanno i piè di dietro formati come quelli dei makis , son men numerosi degli animali che hanno *fabots* invece di ugne . L' Autore del metodo ha dato il sesto carattere per distinguere i makis dai pipistrelli , che , come i makis , hanno quattro incisivi al disopra e sei al disotto ; ma i diti dei piedi anteriori sono insieme uniti per mezzo d'una membrana . Vi ha un' eccezione a farli relativamente al numero degl' incisivi : il pipistrello , che abbiám chiamato il *ferro di lancia* , non ha verun dente incisivo nella mascella superiore , e non ne ha che quattro nell' inferiore . Non debbesi oppor questa cosa al Sig. Brisson come un difetto del suo metodo , poichè il pipistrello , di cui qui si parla , non era ancora stato osservato , quand' ei compose la sua Opera , benchè in questo paese esso sia comune .

Vorrei parimente trovare una ragione per difendere il Sig. Linneo a proposito d'un errore , che parmi essere nella sua divisione metodica dei quadrupedi (*) , relativamente al numero dei denti

M 3

(*) *Syst. Nat.* edit. X. , pag. 49.

214 *Descrizione dei Makis.*

del cinghiale, dei porci, del pecari, e del babiroussa, che hanno delle relazioni coi makis pel numero dei denti incisivi. Il Sig. Linneo dà otto denti incisivi inferiori ai porci e al cinghiale; io però ho osservati animali di questa specie in numero bastevole per credere che questi denti sono costantemente al numero di sei. Ho veduto un pecari e due teste di babiroussa, che parimente non avevano al di sotto che sei denti incisivi come i makis. Il Sig. Linneo ne dà loro otto, e forse non ha avuta occasione d'osservare egli stesso i denti del pecari e del babiroussa come quelli dei porci e del cinghiale. S'egli avesse veduta una testa di babiroussa, non avrebbe detto che i denti canini del di sopra forano l'osso della fronte (*), poich' essi non forano che l'osso della mascella superiore, almeno colla loro radice. Egli è vero ch'essi si ricurvano in alto, e possono accostarsi alla fronte colla loro estremità; ma non è verosimile che il Sig. Linneo abbia voluto dire ch'essi forano l'osso della fronte colla loro estremità: questo fatto avrebbe ben meritato d'essere più chiaramente annunziato.

(*) *Dentes lanarii (babiroussa) superiores II., perforantes cranium frontis, recurvati ut duo cornua.*
Syst. Nat. edit. X., pag. 50.

DESCRIZIONE

DEL MOCOCO.

IL mococo [*tav. XIX.*] ha molta somiglianza colle scimie per la forma del corpo e delle gambe, e per la struttura dei piedi. La testa però è differentissima, ed ha qualche relazione con quella della faina: il muso nondimeno e le orecchie son più lunghe, e gli occhi più grossi. Essa ha una figura triangolare, perchè si trova tanta distanza tra le estremità delle due orecchie, quanta dall'estremità di ciascuna fino all'estremità del muso. Il frontale ha alquanto la forma d'un arco; gli occhi sono affai sporgenti, e il collo è più lungo di quello della faina. La coda del mococo è lunghissima, e le sue gambe anteriori sono men lunghe di quelle di dietro. Ha i diti lunghi e ben separati gli uni dagli altri; l'estremità del pollice dei piedi posteriori è molto più grossa di quella dei diti. Le unghie son piegate in doccia e aguzzate; hanno una figura triangolare più o meno allungata.

L'estremità del muso, il contorno della bocca, le palpebre e l'interno delle orecchie del mococo, che ha servito di soggetto per questa descrizione, eran nudi e avevano un colore bruno-nericcio, che s'estendeva da ciascun lato del frontale fino all'angolo inferiore dell'occhio. Le palpebre ave-

vano molta grossezza , principalmente la superiore , la cui membrana interiore formava alcune pieghe , che s' estendevano dall' innanzi all' indietro . Questa palpebra aveva delle ciglia nere ; e trovavansi alcuni peli lunghi dello stesso colore , in forma di mustacchi , da ciascun lato dell' estremità del muso : eranvi pure peli simili sull' estremità della mascella inferiore al disopra degli angoli interiori degli occhi , e a qualche distanza al disopra degli angoli esteriori . Il pelo di questo animale era morbidissimo e molto folto . La faccia interiore del disotto dell' avan-braccio e la pianta dei piedi eran nude e di color nero . Il pelo dei lati del muso , quello della fronte , delle orecchie , dei lati della testa , della mascella inferiore , della gola , e del disotto del collo era bianco . Il pelo del petto , delle ascelle , della faccia interiore del braccio e dell' avan-braccio , del ventre , delle anguinaglie , della faccia interiore della coscia e della gamba , e quello del disopra dei piedi posteriori era d'un bianco sporco . I peli della testa e del disopra del collo avevano un color cenerino-bruno , eccettuato alla punta , ch' era grigia , cosicchè il colore di queste parti era mischiato di grigio e di cenerino-bruno . Il pelo della faccia esteriore del braccio e dell' avanbraccio , del dorso , dei lati del corpo , della groppa e dell' origine della coda , della faccia esteriore della coscia e della gamba era di color cenerino vicino alla radice : eravi un color fulvo-pallido al disopra del cenerino ,

e l'estremità era grigia, ma questo colore era più o meno esteso, cosicchè il grigio dominava sulla groppa e sulla faccia esteriore delle quattro gambe, mentre il dorso e i lati del corpo eran mischiati di grigio, di bruno e di fulvo. Il disopra dei piedi anteriori aveva un color grigio. Il pelo della coda era un po' più lungo e sembrava men fitto di quello del corpo; eranvi trenta anelli in circa, alternativamente bianchi e neri.

ped. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall'estremità del muso fino all'ano	1. 4. 6.
Altezza della parte anteriore del corpo	0. 10. 0.
Altezza della parte posteriore	1. 1. 0.
Lunghezza della testa dall'estremità del muso fino all'occipite	0. 3. 0.
Circonferenza dell'estremità del muso	0. 2. 3.
Circonferenza del muso presa sotto gli occhi	0. 3. 8.
Contorno dell'apertura della bocca	0. 2. 0.
Distanza tra i due nasali	0. 0. 1.
Distanza tra l'estremità del muso, e l'angolo anteriore dell'occhio	0. 1. 4.
Distanza tra l'angolo posteriore, e l'orecchia	0. 1. 1.
Lunghezza dell'occhio da un angolo all'altro	0. 0. 4.
Apertura dell'occhio	0. 0. 3.

Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi, seguendo la curvatura del frontale	o.	1.	1.
La stessa distanza in linea retta	o.	o.	8.
Circonferenza della testa tra gli occhi e le orecchie	o.	6.	8.
Lunghezza delle orecchie	o.	1.	o.
Larghezza della base, misurata sulla curvatura esteriore	o.	1.	6.
Distanza tra le due orecchie presa al basso	o.	1.	6.
Lunghezza del collo	o.	1.	10.
Circonferenza del collo	o.	4.	4.
Circonferenza del corpo presa dietro le gambe anteriori	o.	7.	3.
La stessa circonfer. al sito più grosso	o.	9.	o.
La stessa circonferenza dinanzi le gambe posteriori	o.	7.	o.
Lunghezza del tronco della coda	1.	7.	6.
Circonferenza all'origine	o.	3.	4.
Lunghezza dell'avan-braccio, dal gomito fino alla giuntura della mano	o.	4.	3.
Circonferenza della giuntura	o.	1.	6.
Lunghezza dalla giuntura fino all'estremità delle ugne	o.	2.	6.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone	o.	6.	o.
Lunghezza dal tallone fino all'estremità delle ugne	o.	3.	10.

La descrizione delle parti interiori del mococo è stata fatta sopra un soggetto , che non pesava che una libbra quattordici once e mezzo , perchè non aveva peranco acquistato tutto il suo accrescimento : anche la sua lunghezza non era che d'un piede un pollice e mezzo dall' estremità del muso fino all' origine della coda . La testa aveva due pollici e due linee di lunghezza , e cinque pollici e otto linee di circonferenza presa tra gli occhi e le orecchie . La circonferenza del corpo era di sei pollici e nove linee dietro le gambe anteriori , di sette pollici e mezzo alla metà nel sito più grosso , e di cinque pollici e otto linee dinanzi le gambe posteriori . La coda aveva un piede e cinque pollici di lunghezza .

L' epiploon si è trovato sottilissimo , e non passava il mezzo dell' addomine . Il fegato s' estendeva tanto a sinistra quanto a destra ; e lo stomaco era situato interamente a sinistra .

Il duodeno s' estendeva nel lato destro , ove si ripiegava all' indentro prima di unirsi al digiuno : questo intestino e l' ileo erano cortissimi e facevano i lor giri nella regione ombelicale e nel lato sinistro . Il cieco [A B C D , *tav. XX.*] era molto lungo e diretto da destra a sinistra nelle regioni iliache e ipogastrica . Il colon s' estendeva all' innanzi nel lato destro , passava da destra a sinistra dietro lo stomaco , si prolungava all' indietro nel mezzo dall' addomine fino al pube , ove si ripiegava per ritornare all' innanzi ; e finalmente ri-

passava all' indietro verso il retto .

Gli intestini tenui eran tutti presso a poco della medesima grossezza , eccettuato il duodeno , che aveva maggior diametro che gli altri nel mezzo della sua lunghezza . Il sito dell' unione del colon col cieco era il più grosso di tutto il canale intestinale . Il cieco [A B C D , *tav. XX.*] si diminuiva a poco a poco di grossezza in tutta la sua estensione , e si trovava più piccolo dell' ileo [E F] verso l' estremità [C D] , sulla lunghezza di due pollici in circa . Il colon [G H I] si diminuiva parimente di grossezza sulla lunghezza di quattro o cinque pollici , e in seguito era più piccolo dell' ileo : finalmente il retto era un po' più grosso verso l' ano . Le membrane di tutti gl' intestini erano sottilissime e trasparenti ; sul principio però del colon e del cieco si distinguevano tre fasce tendinose . Sviluppando il canale intestinale , ho trovato che il digiuno s' era raddepiato , e rientrava in lui stesso per la lunghezza di otto pollici .

La parte destra [A B , *tav. XXI.* , *fig. 1.*] dello stomaco era pochissimo allungata , cosicchè l' angolo [C] , ch' essa formava , si trovava a una piccolissima distanza dall' esofago [D] .

Il fegato era composto di due gran lobi e d' un piccolo ; l' uno dei grandi si trovava situato interamente a sinistra ; l' altro era diviso in tre porzioni per via di due scissure di diverse profondità . Il legamento sospensorio si trovava nella più piccola , e la vescichetta del fiele era nella più gran-

de e alla metà della parte sinistra di questo lobo. Il piccolo era attaccato alla radice e metteva capo al rene destro col lobo grande. Questo fegato era d'un color rossiccio mischiato di grigio interiormente e esteriormente : pesava un' oncia e cinquantaquattro grani.

La vescichetta del fiele era allungata e alquanto più grossa alla sua estremità che nel resto della sua lunghezza. Il suo piccinolo era assai lungo, e formava gomiti e sinuosità in maggior numero che quello della vescichetta del fiele del gatto. Ve n'erano quasi altrettante, quante sulle trombe della matrice degli altri animali. La vescichetta del fiele del mococo si ripiegava sulla faccia esteriore del fegato, al fondo della scissura, in cui era situata. Essa conteneva un liquor denso e tinto di giallo e di verde.

L'estremità inferiore della milza era curva al basso e un po' più larga della superiore : questa viscera però aveva presso a poco la stessa larghezza in tutta la sua estensione : era esteriormente di color rossiccio, e interiormente di color bruno : pesava trentotto grani.

Il pancreas era di forma irregolarissima ; non si poteva distinguerlo facilmente dalla grasscia, che lo circondava, massimamente nel lato sinistro. Vi ho scoperti due o tre rami, che mettevano capo al digiuno.

I reni eran quasi rotondi. Il destro si trovava più innoltrato che 'l sinistro di più della metà

della sua lunghezza . La cavità era a Tai poca , e nella piccola pelvi non v'era che un capezzolo .

La parte carnosà del diaframma era molto grossa . Il cuore si trovava situato nel mezzo del petto colla punta rivolta a sinistra : esso era quasi rotondo . L'aorta non si divideva che in due rami .

Il polmon destro aveva quattro lobi , tre eran disposti in fila , e non avevano veruna incavatura ; il quarto era il più piccolo , e rassomigliava al quarto lobo del lato destro della maggior parte degli altri animali , per la sua figura e per la sua positura vicino alla base del cuore . Il polmon sinistro non era composto che di due lobi , il secondo de' quali rassomigliava al terzo lobo del lato destro . Il primo era diviso per via d'una scissura in due parti ineguali , la posteriore delle quali era la più piccola .

La lingua era sottile , rotonda all'estremità , coperta di papille estremamente fine , e sparsa di piccoli grani bianchi . Sulla sua parte posteriore eranvi delle papille assai grosse , e sul mezzo della detta parte cinque glandule a calice , che formavano un arco di circolo , la cui concavità era all'innanzi .

Il palato era attraversato da nove o dieci solchi larghi e profondi : i primi formavano una convessità all'innanzi , e gli altri una concavità : essi erano interrotti nel mezzo da un piccol solco longitudinale , che s'estendeva lungo il palato , il cui colore era in parte bruno e in parte bianco .

Sul cervello eranvi poche sinuosità : esso non copriva il cervelletto che in parte ; ma il cervelletto rassomigliava molto più a quello delle scimie . Il cervello pesava tre dramme e due grani , e il cervelletto quarantaquattro grani .

La vulva [A, indicata da uno stiletto B, tav. XXI., fig. 2.] era formata in modo che la sua parte inferiore aveva molto maggiore estensione . L' orifizio [C, segnato da uno stiletto D] dell' uretra si trovava a quattro linee di distanza dall' ingresso della vagina . Il canale dell' uretra essendo imperfetto al sito del suo orifizio , formava al di là una doccia [E] lunga sette linee . La ghianda della clitoride era situata all' estremità della detta doccia ; e il prepuzio [F] s' estendeva anche quattro linee di lunghezza al di là della clitoride , e aveva la forma d' un cucchiajo . Il prepuzio e la doccia dell' uretra formavano un prolungamento lungo un pollice in circa , che aveva la somiglianza d' una verga ; ma esaminando la sua faccia posteriore , scorgevasi bentosto la doccia e gli orifizj della vulva e dell' uretra . La vagina [G H I] era molto lunga , e il corpo [K] della matrice molto piccola a proporzione . I testicoli [L M] avevano la forma d' un rene allungato , e si trovavano situati vicino all' estremità dei corni , e in parte involti nel padiglione della tromba : essi avevano un color biancastro . La vescica [N] era molto piccola , e aveva la forma d' un uovo .

pied. poll. lin.

Lunghezza degl' intestini tenui , dal			
piloro fino al cieco —————	4.	7.	0.
Circonferenza del duodeno —————	0.	2.	6.
Circonferenza del digiuno —————	0.	2.	0.
Circonferenza dell' ileo nei siti più			
grossi —————	0.	2.	3.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	1.	6.
Lunghezza del cieco —————	0.	6.	0.
Circonferenza del cieco al sito più			
grosso —————	0.	5.	6.
Circonferenza al sito più sottile —	0.	1.	3.
Circonferenza del colon nei siti più			
grossi —————	0.	4.	6.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	1.	6.
Circonferenza del retto vicino al colon	0.	1.	6.
Circonferenza del retto vicino all' ano	0.	2.	0.
Lunghezza del colon e del retto presi			
insieme —————	1.	10.	0.
Lunghezza del canale intestinale in			
intero , non compreso il cieco —	6.	5.	0.
Gran circonferenza dello stomaco —	0.	10.	0.
Piccola circonferenza —————	0.	8.	0.
Lunghezza del fegato —————	0.	2.	6.
Larghezza —————	0.	3.	1.
La sua maggior grossezza —————	0.	0.	6.
Lunghezza della vescichetta del fiele	0.	0.	8.
Il suo maggior diametro —————	0.	0.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della milza —————	0.	2.	3.
Larghezza dell' estremità inferiore —	0.	0.	6.

ped. poll. lin.

Larghezza dell' estremità superiore —	o.	o.	4.
Groffezza nel mezzo —————	o.	o.	2.
Groffezza del pancreas —————	o.	o.	$0\frac{3}{4}$
Lunghezza dei reni —————	o.	o.	$9\frac{1}{2}$
Larghezza —————	o.	o.	8.
Groffezza —————	o.	o.	6.
Lunghezza del centro nervoso del dia-			
framma , dalla vena-cava fino alla			
punta —————	o.	o.	8.
Larghezza —————	o.	1.	4.
Circonferenza della base del cuore —	o.	2.	6.
Altezza dalla punta fino all' origine			
dell' arteria polmonare —————	o.	1.	1.
Altezza dalla punta fino al sacco pol-			
monare —————	o.	o.	9.
Diametro dell' aorta preso esterior-			
mente —————	o.	o.	2.
Lunghezza della lingua —————	o.	2.	o.
Lunghezza del cervello —————	o.	1.	6.
Larghezza —————	o.	1.	2.
Groffezza —————	o.	o.	7.
Lunghezza del cervelletto —————	o.	o.	7.
Larghezza —————	o.	o.	11.
Groffezza —————	o.	o.	4.
Distanza tra l' ano e la vulva —————	o.	o.	7.
Lunghezza della vagina —————	o.	1.	4.
Circonferenza —————	o.	o.	9.
Gran circonferenza della vescica —	o.	3.	9.
Piccola circonferenza —————	o.	3.	1.

	pied.	poll.	lin.
Lunghezza dell' uretra —————	o.	1.	6.
Circonferenza —————	o.	o.	9.
Lunghezza del collo e del corpo della matrice —————	o.	o.	$2\frac{1}{2}$
Circonferenza del corpo —————	o.	o.	5.
Lunghezza dei corni della matrice —	o.	o.	3.
Circonferenza nei siti più grossi —	o.	o.	4.
Circonferenza all' estremità di ciascun corno —————	o.	o.	3.
Lunghezza della linea curva, che traversa la tromba —————	o.	o.	$4\frac{2}{3}$
Lunghezza dei testicoli —————	o.	o.	$2\frac{1}{2}$
Larghezza —————	o.	o.	$1\frac{1}{2}$
Groffezza —————	o.	o.	1.

Lo scheletro del mococo [*tav. XXII.*] rassomiglia più agli scheletri del carigucja, della marmosa, del cayopollino, del falangiere e di tutte le scimmie, per gli ossi del corpo, delle gambe e de' piedi che agli scheletri degli altri animali. Ma la testa del mococo rassomiglia in parte a quelle delle scimmie, e in parte a quelle degli animali, i cui nomi ho pur ora annoverati. Il muso è allungato come quello del carigucja, della marmosa, del cayopollino, del falangiere e degli altri quadrupedi dal muso lungo, come il cane, il tasso, l'orfo, il coati, ec. In tutti questi animali l'orlo osseo delle orbite degli occhi è interrotto in una porzione della sua circonferenza, perchè le apofisi orbitarie dell' osso della fronte e dell' osso della

gnancia, non sono bastevolmente lunghe per toccarsi e per compiere la circonferenza dell' orbita. All' opposto questa circonferenza è compiuta senza interruzione in tutte le scimie e nell' uomo. Per questo riguardo la testa dello scheletro del mococo ha maggior relazione con quella dell' uomo e delle scimie, che colla testa della maggior parte degli altri animali. Il cranio del mococo è quasi rotondo. Sull' osso frontale, tra le orbite e al disopra trovansi delle piccole depressioni. L' occipite non è che poco sporgente al di là del foro occipitale. I rami della mascella inferiore son larghi, corti e ricurvati. Al disotto dell' apofisi condiloidea, al sito del contorno di ciascun ramo, trovansi una terza apofisi.

I denti del mococo sono al numero di trentotto; ve ne son quattro incisivi nella mascella superiore, sei nell' inferiore, e sei mascellari da ciascun lato di ciascuna mascella. Gl' incisivi superiori son piccoli; quelli di mezzo son diretti obbliquamente all' innanzi e all' indentro, e lasciano tra essi un lungo spazio vuoto. Gl' incisivi del disotto son lunghi e stretti, principalmente i quattro di mezzo; quelli de' lati sono un po' più larghi. I canini della mascella superiore son piatti sul lato esterno; l' interno ha due facce longitudinali: questi denti son più lunghi di quelli della mascella inferiore, che non son diversi dai mascellari se non perchè sono alquanto più grandi. I primi due mascellari del disotto e i tre del disopra non hanno che una

punta: gli altri mascellari hanno ciascuno quattro punte, due sul lato esterno, e due sull' interno.

L'apofisi spinosa della seconda vertebra cervicale è molto larga dall' innanzi all' indietro, e forma un prolungamento all' innanzi. Le apofisi spinose delle altre vertebre cervicali son corte e sottili.

Vi sono dodici vertebre dorsali, e dodici coste, otto vere e quattro false. Lo sterno è composto di sette ossi: le prime coste, una da ciascun lato, s' articolano colla parte media del prim' osso dello sterno; l' articolazione delle seconde coste è tra il primo e il second' osso; quella delle terze coste tra il secondo e il terz' osso, e così in seguito fino alle settime coste, la cui articolazione è tra il sesto e 'l settimo osso dello sterno. Le ottave coste s' articolano colla parte anteriore del settimo osso.

Le vertebre lombari sono al numero di sette. L' osso sacro è composto di tre false vertebre, e la coda di trentatre.

L' osso dell' anca ha esteriormente e interiormente due facce longitudinali: la faccia interna inferiore e l' esterna superiore son molto strette; l' esterna inferiore è concava. Sul lato esteriore dell' osso, vicino alla cavità cotiloidea, vi ha un' apofisi. I fori ovali son grandi.

L' omoplata è allungato: la base e il lato anteriore fanno parte d' un arco di circolo quasi regolare.

Gli orli della doccia , ch' è al difotto della gi-
rella dell' osso del braccio , sono elevati , princi-
palmente l' esteriore , che ha poca grossezza . Vi
ha una resta sottile e sporgente lungo il lato ester-
no della parte inferiore del detto osso . Quello
del radio è curvo e allontanato dall' osso dell' ulna .

L' osso della coscia è molto lungo , quasi diritto
e cilindrico : esso ha un' apofisi situata sotto il gran
trocantere .

Il carpo è composto di dieci ossi , quattro nel
prim' ordine , quattro nel secondo e due sopran-
numerarj , il primo de' quali trovasi dietro il prim'
osso del prim' ordine , sopra la giuntura , che lo
separa dal prim' osso del second' ordine : quest' osso
soprannumerario è bislungo e aguzzo : il secondo
è situato al difotto del prim' osso del prim' ordine ,
e al disopra degli ultimi tre del second' ordine .

Nel tarso non vi sono che sette ossi .

Gli ossi dei diti dei quattro piedi rassomigliano
a quelli delle scimie , fuorchè il prim' osso del
metatarso , e le due falangi del pollice dei piedi
posteriori , che hanno maggior lunghezza a pro-
porzione degli altri quattro diti che in veruna
scimia , anche in quelle , che hanno il pollice de'
piedi posteriori più lungo che nelle altre scimie .

pied. poll. lin.

Lunghezza dall' estremità delle ma-

scelle fino all' occipite ————— O. 2. 11.

La maggior larghezza della testa — O. 1. 7.

Lunghezza della mascella inferiore

dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi con- diloidea —————	o.	2.	o.
Grosshezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore ———	o.	o.	$o \frac{1}{4}$
Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini ———	o.	o.	7.
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari —————	o.	o.	$9 \frac{1}{3}$
Lunghezza della detta apertura ———	o.	o.	6.
Larghezza —————	o.	o.	$3 \frac{2}{3}$
Lunghezza degli ossi proprj del naso	o.	o.	8.
Larghezza al sito più largo ———	o.	o.	$2 \frac{1}{3}$
Larghezza delle orbite ———	o.	o.	8.
Altezza —————	o.	o.	$8 \frac{1}{2}$
Lunghezza dei denti canini ———	o.	o.	$3 \frac{1}{2}$
Larghezza del foro della prima ver- tebra dall' alto al basso ———	o.	o.	3.
Lunghezza da un lato all' altro ———	o.	o.	5.
Altezza dell' apofisi spinosa della se- conda vertebra —————	o.	o.	2.
Larghezza —————	o.	o.	4.
Lunghezza dell' ottava costa, ch' è la più lunga —————	o.	2.	7.
Lunghezza dello sterno ———	o.	2.	3.
Lunghezza del corpo della quinta ver- tebra lombare, ch' è la più lunga	o.	o.	7.
Larghezza della parte superiore dell' osso dell' anca —————	o.	o.	7.

Lunghezza dell' osso dal mezzo della cavità cotiloidea , fino alla metà del lato superiore —————	o.	2.	0.
Lunghezza dei fori ovali —————	o.	0.	7.
Larghezza —————	o.	0.	6.
Larghezza del catino —————	o.	0.	11.
Altezza —————	o.	1.	6.
Lunghezza delle più lunghe false ver- tebre della coda —————	o.	1.	6.
Lunghezza dell' omoplia —————	o.	1.	8.
Larghezza nel mezzo —————	o.	0.	8 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell' nmero —————	o.	3.	1.
Lunghezza dell' osso dell' ulna ———	o.	3.	7.
Lunghezza dell' osso del radio ———	o.	3.	4.
Lunghezza del femore —————	o.	4.	9.
Lunghezza della tibia —————	o.	4.	2.
Lunghezza del peroneo —————	o.	4.	1.
Altezza del carpo —————	o.	0.	4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del calcagno —————	o.	0.	11.
Lunghezza del prim' osso del meta- carpo , ch' è il più corto —————	o.	0.	5.
Lunghezza del terz' osso del meta- carpo , ch' è il più lungo ———	o.	0.	9.
Lunghezza del prim' osso del meta- tarso , ch' è il più corto —————	o.	0.	10.
Lunghezza del terzo , ch' è il più lungo —————	o.	1.	1.
Lunghezza della prima falange del pollice de' piedi anteriori ———	o.	0.	5 $\frac{1}{2}$

232 *Descriz. del Mococo.*

	<i>piec. poll. lin.</i>	
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 2.
Lunghezza della prima falange del terzo dito —————	o.	o. 8.
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 5.
Lunghezza della terza —————	o.	o. 2.
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi posteriori ———	o.	o. 7.
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 4.
Lunghezza della prima falange del terzo dito —————	o.	o. 8 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 5.
Lunghezza della terza —————	o.	o. 3.



DESCRIZIONE

DEL MONGOUS, o sia MONGOSO.

IL mongoso [tav. XXIII.] è somigliantissimo al mococo [tav. XIX.] per la forma del corpo, delle gambe, dei piedi e dei diti; ma vi sono notabili differenze nella testa. Le orecchie son più corte, gli occhi un po' meno sporgenti, e il muso più lungo e più grosso. Il color del muso e del contorno degli occhi è nericcio; le palpebre son rosicce, e il disotto dei piedi e dei diti è bruno. Il pelo forma de' fiocchi presso a poco come la lana, ma non è d'una natura diversa da quella del pelo del mococo; esso ha maggior lunghezza sulla testa del mongoso che su quella del mococo; e nasconde quasi interamente le orecchie. Il mongoso, che ha servito di soggetto per questa descrizione, aveva una macchia nericcia nel mezzo della sommità della testa. La gola, il disotto del collo, il petto, il ventre, le ascelle, le anguinaglie e la faccia inferiore delle quattro gambe erano d'un bianco sporco, mischiato d'una tinta di fulvo più o men carico in differenti siti: tutto il restante del corpo e l'intera coda avevano un color cenerino-gialliccio, perchè i peli erano di color cenerino su tutta la loro lunghezza, eccettuata la punta, che aveva un color fulvo: questo colore era più visibile su i piè di dietro che in qualsivoglia altro sito.

Tom. XXVI.

N

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	1.	5.	0.
Altezza della parte anteriore del corpo —	0.	10.	0.
Altezza della parte posteriore ———	0.	11.	6.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite ———	0.	3.	6.
Circonferenza dell' estremità del muso —	0.	3.	0.
Circonferenza del muso presa sotto gli occhi —————	0.	4.	0.
Contorno dell' apertura della bocca —	0.	1.	10.
Distanza tra i due nasali —————	0.	0.	2.
Distanza tra l' estremità del muso, e l' angolo anteriore dell' occhio ———	0.	1.	5.
Distanza tra l' angolo posteriore e l' o- recchia —————	0.	1.	5.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro —————	0.	0.	5.
Apertura dell' occhio —————	0.	0.	4.
Distanza tra gli angoli anteriori de- gli occhi, seguendo la curvatura del frontale —————	0.	1.	3.
La stessa distanza in linea retta ———	0.	0.	11.
Circonferenza della testa tra gli occhi e le orecchie —————	0.	6.	4.
Lunghezza delle orecchie —————	0.	0.	10.
Larghezza della base, misurata sulla curvatura esteriore —————	0.	1.	6.
Distanza tra le due orecchie, presa			

pied. poll. lin.

al basso —————	o.	1.	11.
Lunghezza del collo —————	o.	1.	5.
Circonferenza del collo —————	o.	4.	6.
Circonferenza del corpo , presa dietro le gambe anteriori —————	o.	9.	o.
La stessa circonferenza al sito più grosso —————	o.	9.	4.
La stessa circonferenza dinanzi le gambe posteriori —————	o.	7.	o.
Altezza dal basso-ventre fino a terra , sotto i fianchi —————	o.	5.	3.
La stessa altezza sotto il petto ———	o.	4.	5.
Lunghezza del tronco della coda ———	1.	5.	6.
Circonferenza alla sua origine ———	o.	3.	4.
Lunghezza dell' avan-braccio dal gomito fino alla giuntura della mano ———	o.	4.	o.
Circonferenza della giuntura ———	o.	2.	o.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	o.	2.	8.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	o.	5.	o.
Lunghezza dal tallone fino all' estremità delle ugne —————	o.	3.	8.

Aprendosi l' addomine , la situazione dell' epiploon , degl' intestini e di tutte le viscere s'è trovata simile a quella delle viscere del mococo ; ma sviluppando gl' intestini non ho potuto levare l' epiploon dal disopra dello stomaco e la porzione che passa dietro lo stomaco , perchè le pareti anteriori

di questa porzione d'intestino , la parte del mesenterio , a cui era attaccata , la parte superiore dello stomaco , erano viziate , e unite insieme non formavano che una massa , e non potevano più esser separate le une dalle altre . Dopo d'aver aperta questa massa , ne ho tratto un grandissimo numero d'idatidi , la più grossa delle quali aveva due pollici di diametro e un pollice di grossezza . Ve n'erano altre in gran numero di differenti grossezze , le più piccole delle quali avevano poco più d'una linea di diametro : esse eran tutte piene d'un liquor chiarissimo , in alcune senza colore , e rossiccio nelle altre .

La figura dello stomaco e degl'intestini rassomigliava in generale alla figura degl'intestini e dello stomaco del mococo ; ma eranvi alcune differenze nella lunghezza degl'intestini , ed anche nella forma . Gl'intestini tenui non avevano che tre piedi e otto pollici di lunghezza , mentre questa misura medesima era di quattro piedi e sette pollici nel mococo . La lunghezza e la figura del cieco erano in questi due animali le medesime . La porzione del colon , ch'era di figura conica , aveva due volte altrettanto di lunghezza che nel mococo .

Il fegato e la vescichetta del fiele , la milza e i reni del mongolo non eran diversi da queste stesse parti vedute nel mococo , se non perchè la vescichetta del fiele non si ripiegava , come nel mococo , sulla faccia esteriore del fegato , e per-

chè il rene dextro era più innoltrato del finistro di tutta la sua lunghezza . Il fegato pefava un' oncia e tre dramme , e la milza trentatre grani .

Non eravi differenza veruna tra il diaframma , il cuore e il polmon dextro del mongofo , paragonali al diaframma , al cuore e al polmon dextro del mococo . Vi ha luogo a credere che la fteffa fomiglianza farebbeſi trovata nel polmon finistro , che nel mongofo era interamente difformato ed anche diſtrutto , poichè al luogo di queſto polmone non eravi che un gran ſacco voto .

La lingua del mongofo non era diverſa da quella del mococo , ſe non perchè vi erano di più due glandule a calice , che formavano una ſpecie di picciuolo dietro le cinque glandule , di cui ſi è parlato nella deſcrizione della lingua del mococo . Queſte ſette glandule eran diſpoſte in modo che rappreſentavano un' Y . Sul palato non eranvi che ſette o otto ſolchi , ch' eran tutti conveſſi all' innanzi . Il color del palato era interamente bruno . Il cervello e il cervelletto raffomigliavano a queſte ſteſſe parti vedute nel mococo : il cervello pefava cinque dramme e trenta grani , e il cervelletto una dramma e dieci grani .

La veſcica aveva una forma ovale molto allungata . I corni della matrice eran piatti e più larghi che nel mococo . Le trombe formavano un maggior numero di ſinnoſità , e i teſticolì erano più eſteſi e men groſſi : ma tutte queſte parti eran miſchiate con idatidi , che forſe avevano alterata

la loro forma. In generale la maggior parte delle viscere di questo animale eran viziate e difformate a segno, che non poterono servire a una descrizione sì circostanziata come quella del mococo.

La testa dello scheletro del mongolo è diversa da quella del mococo, perchè sull' osso frontale non vi è veruna depressione, e perchè gli ossi propri del naso sono più sporgenti all' innanzi che nel mococo. L'apofisi che si trova sul contorno de' rami della mascella inferiore ha maggior lunghezza; essa è curva e aguzza.

I denti rassomigliano a quelli del mococo pel numero, per la situazione e per la figura. I due incisivi di mezzo non son diretti all' indentro, come quelli del mococo.

L'apofisi spinosa della seconda vertebra cervicale si prolunga egualmente all' indietro che all' innanzi.

Nello sterno dello scheletro del mongolo, che ha servito di soggetto per questa descrizione, non ho veduti che sei ossi. Le settime coste s' articolavano colla parte media anteriore del quint' osso dello sterno: l' articolazione delle settime coste era contro il quinto e il sest' osso: le ottave coste s' articolavano colla parte anteriore del sest' osso dello sterno.

Nella coda non v' erano che ventitre vertebre.

Del resto lo scheletro del mongolo rassomigliava a quello del mococo.

Nel Gabinetto vi ha un piccolo animale dissecato e imbottito, che a prima vista non ha che

l'apparenza d'un ratto di mediocre grandezza poichè la sua lunghezza presa dall' estremità del muso fino all' origine della coda non è che di cinque pollici , e la coda è quasi altrettanto lunga . Ma osservando quest' animale darvicino , si comprende bentosto ch' esso rassomiglia al mococo e al mongofo per la struttura de' suoi piedi , per la figura del suo muso e pe' suoi denti incisivi , e ch' egli ha maggior relazione col mongofo che col mococo per la qualità del suo pelo , ch' è lanoso . Anche i suoi denti rassomigliano a quelli di quest' due animali .

Il pelo dei lati e del disopra della testa e del corpo , il pelo della coda , della faccia interna delle gambe e quello de' piedi , avevano un color fulvo-scolorito e rossiccio . Il frontale e il basso della fronte , la mascella inferiore tutt' intera , il labbro superiore , il disotto del collo , il petto , il ventre e la faccia interna delle quattro gambe erano di color biancastro sporco e tinto di gialliccio . Tutt' i piedi di quest' animale avevano un color cenerino verso la loro origine , il qual colore però non si vedeva , perchè i detti peli erano assai folli .

Descrizione del Vari . 241

pied. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	I.	8.	0.
Lunghezza della testa, dall' estremità del muso fino all' occipite ———	O.	3.	4.
Circonferenza dell' estremità del muso	O.	2.	8.
Circonferenza del muso, presa sotto gli occhi —————	O.	5.	0.
Contorno dell' apertura della bocca —	O.	3.	0.
Distanza tra i due nasali —————	O.	0.	$2\frac{1}{2}$
Distanza tra l' estremità del muso, e l' angolo anteriore dell' occhio —	O.	1.	8.
Distanza tra l' angolo posteriore e l' o- recchia —————	O.	1.	4.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro —————	O.	0.	5.
Apertura dell' occhio —————	O.	0.	$3\frac{1}{2}$
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi, seguendo la curvatura del frontale —————	O.	1.	1.
La stessa distanza in linea retta —	O.	1.	0.
Circonferenza delle testa, presa tra gli occhi e le orecchie ———	O.	8.	0.
Lunghezza delle orecchie —————	O.	1.	3.
Larghezza della base, misurata sulla curvatura esteriore —————	O.	2.	5.
Distanza tra le due orecchie presa al basso —————	O.	2.	6.
Lunghezza del collo —————	O.	2.	6.

	pied.	poll.	lin.
Circonferenza —————	o.	4.	8.
Circonferenza del corpo presa dietro			
le gambe anteriori —————	o.	9.	6.
Circonferenza al sito più grosso —	1.	o.	6.
Circonferenza dinanzi le gambe po-			
steriori —————	o.	8.	o.
Lunghezza del tronco della coda —	1.	5.	o.
Circonferenza all' origine ————	o.	4.	o.
Lunghezza dell' avan-braccio dal go-			
mito fino alla giuntura della mano	o.	4.	o.
Circonferenza della giuntura ———	o.	2.	10.
Lunghezza dalla giuntura fino all' e-			
stremità delle ugne —————	o.	3.	o.
Lunghezza della gamba dal ginocchio			
fino al tallone —————	o.	5.	10.
Lunghezza dal tallone fino all' estre-			
mità delle ugne —————	o.	4.	3.

Il peso di questo vari era di cinque libbre e un quarto : aprendosi l'addomine , gl' intestini si son trovati nella parte anteriore della detta capacità , perchè la vescica occupava tutta la parte posteriore fino alla metà della regione ombelicale . Questa viscera era distesa e piena d'urina , la cui ritenzione aveva senza dubbio cagionata la morte dell' animale . La vescica s' era eccessivamente dilatata , poichè aveva rispinti tutti gl' intestini nella parte anteriore dell' addomine .

Gl' intestini tenui eran tutti presso a poco della medesima grossezza , eccettuato l'ileo [A B ,

tav. XXV., fig. 1.] ch' era più piccolo a misura che s' avvicinava al cieco [CDEF]. Quest' ultimo aveva molta lunghezza e poco diametro, e si diminuiva di grossezza dalla sua origine fino alla sua estremità. Il colon [GH] era alquanto più grosso a due diti di distanza dal cieco che vicino al detto intestino: in seguito la sua grossezza si diminuiva a poco a poco fino al retto, che alla sua origine non era più grosso del colon, ma diventava più grosso verso l'ano.

Lo stomaco [*tav. XXV., fig. 2.*] era molto diverso da quello del mococo e del mongoso per la sua figura, poich' era molto allungato, massimamente nella sua parte destra [AB].

Il fegato era attaccato al diaframma e in parte guasto, ma rassomigliava al fegato del mococo e del mongoso pel numero e per la forma dei lobi, e per la direzione e per la figura della vescichetta del fiele. Il cattivo stato del fegato mi ha impedito di render conto del suo peso e delle sue misure, e di quelle della vescichetta del fiele e del diaframma.

La milza rassomigliava a quella del mococo e del mongoso per la figura e pel colore: essa pesava una dramma e diciotto grani. Il pancreas era ostrutto e difformato.

Il rene destro era più inoltrato che il sinistro della metà della sua lunghezza: erano amendue allungati: del resto rassomigliavano a quelli del mococo e del mongoso.

Il vari non era diverso dal mococo, nè dal mon-
goso per la forma, nè per la positura del cuore,
nè pel numero, nè per la figura dei lobi del pol-
mone; ma eravi una struttura rimarcabilissima nella
biforcazione della trachea-arteria [AB, *tav. XXVI*,
fig. 1.], ciascun ramo della quale s' allargava e for-
mava una specie di tamburro voto prima di metter
capo ai bronchi del polmone.

La lingua non era diversa da quella del mococo,
se non perchè le papille della parte anteriore era-
no un po' più grandi. L' epiglottide aveva un' in-
cavatura ben distinta sul mezzo del suo orlo. Il
palato era interamente di color nero, e non aveva
che otto solchi trasversali, ch' eran diretti come
quelli del palato del mococo. Il cervello pesava
sei dramme, e il cervelletto una dramma e ven-
tiquattro grani.

Le parti della generazione [*tav. XXVI*, *fig. 2*]
eran piccolissime tanto le esterne, quanto le in-
terne. L' orifizio del prepuzio si trovava alla parte
anteriore dello scroto. La ghianda [A] era cilin-
drica e terminava con un piccol fungo come la
ghianda delle scimie: questa parte rinchiudeva
un osso che non s' estendeva al di là dell' infer-
zione del prepuzio; esso era attaccato alla verga
con una delle sue estremità, ch' era adunca: l' al-
tra estremità era coperta dalla pelle della ghianda.

La verga [B] era sottilissima. I testicoli [CD]
avevano poca grossezza ed eran rotondi. I canali
deferenti [EF] avevano poca lunghezza: la so-

stanza inferiore dei testicoli era gialliccia . Ciascuna vescichetta femminile [G H] si ricurvava all' indentro alla sua estremità . Le prostatici [I K] erano ovali e situate tra le vescichette feminali e il collo della vescica [L], ch' era bislungo .

..... *piec. poll. lin.*

Lunghezza degl' intestini tenui dal pi-)

loro fino al cieco ————— 5. 2. 0.

Circonferenza del duodeno ————— 0. 2. 3.

Circonferenza del digiuno ————— 0. 2. 3.

Circonferenza dell' ileo nei siti più

grossi ————— 0. 2. 3.

Circonferenza nei siti più sottili — 0. 1. 9.

Lunghezza del cieco ————— 1. 2. 0.

Circonferenza del cieco al sito più

grosso ————— 0. 2. 6.

Circonferenza al sito più sottile — 0. 1. 0.

Circonferenza del colon nei siti più

grossi ————— 0. 3. 4.

Circonferenza nei siti più sottili — 0. 2. 9.

Circonferenza del retto vicino al colon 0. 2. 3.

Circonferenza del retto vicino all' ano 0. 2. 10.

Lunghezza del colon e del retto presi

insieme ————— 2. 4. 0.

Lunghezza del canale intestinale in in-

tero , non compreso il cieco — 7. 6. 0.

Gran circonferenza della stomaco — 1. 1. 0.

Piccola circonferenza ————— 0. 7. 0.

Lunghezza della milza ————— 0. 3. 0.

Larghezza dell' estremità inferiore — 0. 0. 8.

pied. poll. lin.

Larghezza dell' estremità superiore —	o.	o.	7.
Groffezza nel mezzo —	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Groffezza del pancreas —	o.	o.	1.
Lunghezza dei reni —	o.	1.	1.
Larghezza —	o.	o.	8.
Groffezza —	o.	o.	6.
Circonferenza della base del cuore —	o.	3.	4.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare —	o.	1.	4.
Altezza dalla punta fino al sacco pol- monare —	o.	1.	o.
Diametro dell' aorta preso exterior- mente —	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della lingua —	o.	2.	8.
Lunghezza del cervello —	o.	1.	7.
Larghezza —	o.	1.	8.
Groffezza —	o.	o.	9.
Lunghezza del cervelletto —	o.	o.	8.
Larghezza —	o.	1.	o.
Groffezza —	o.	o.	7.
Distanza tra l' ano e lo scroto —	o.	1.	3.
Altezza dello scroto —	o.	o.	6.
Lunghezza della ghianda —	o.	o.	6.
Circonferenza —	o.	o.	10.
Circonferenza del fungo —	o.	1.	6.
Lunghezza della verga dalla biforca- zione del corpo cavernoso fino all' inserzione del prepuzio —	o.	1.	1.
Circonferenza —	o.	1.	6.

	pied. poll. lin.		
Lunghezza dei testicoli —————	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Larghezza —————	o.	p.	5.
Groffezza —————	o.	o.	3 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dei canali deferenti ———	o.	3.	2.
Diametro nella maggior parte della loro estensione —————	o.	o.	o $\frac{1}{2}$
Gran circonferenza della vescica ———	o.	10.	8.
Piccola circonferenza —————	o.	6.	3.
Circonferenza dell' uretra —————	o.	o.	7.
Lunghezza delle vescichette feminali	o.	o.	8.
Larghezza —————	o.	o.	3 $\frac{1}{2}$
Groffezza —————	o.	o.	2.
Lunghezza delle prostati —————	o.	o.	4.
Larghezza —————	o.	o.	2.
Groffezza —————	o.	o.	1 $\frac{1}{2}$



IL LORIS (a).

IL loris è un piccolo animale, che trovasi in Ceylan, e che è notabilissimo per la grazia della sua figura, e per singolarità della sua forma: è forse fra tutti gli animali quello, che ha il corpo più lungo relativamente alla grossezza; ha nove vertebre lombari; laddove tutti gli altri animali non ne hanno che cinque, sei o sette, e da ciò dipende la lunghezza del suo corpo, che pare tanto

(a) *Loris*. *Loeris*, nome che gli Olandesi hanno dato a questo animale e che noi abbiamo adottato. *Elegantissimum animal musei D. Charleton*, Tancred Robinlon apud Râium. *Syn. quad.* pag. 161.

Simia parva ex cinereo fusca, naso productiore, brachiis, manibus, pedibusque longis, tenuibus, Belgis een Loris. *Ex India orientali*, Museum Petropolit. pag. 339.

Animalculum cynocephalum, *Ceylonicum*, *Tardigradum dictum*, *simii species*. Seba, *Vol. I. tab. 35. fig. 1. & 2.* Nota. L'Editore del gabinetto di Seba sembraci, che abbia fatta una doppia menzione, perchè questo animale è lo stesso di quello, ch'egli indica sotto la denominazione di *Cercopithecus Ceylonicus seu tardigradus*, tav. 47. fig. 1. Il Sig. Brisson, dopo Seba ha fatta la stessa doppia menzione sotto le denominazioni di *Scimia di Ceylan*, *Reg. anim.* pag. 190., e *Scimia cynocephala di Ceylan*, pag. 191.

Tardigradus. *Lemur ecaudatus*. *Mus. ad. Fr. 1. p. 3.* *Simia ecaudata unguibus indicis subulatis*. *Syll. nat. 5. n. 2. Linn. Syst. nat. edit. X. pag. 29.*

più lungo perchè non termina colla coda; tolta questa mancanza della coda, e questo eccesso di vertebre si potrebbe comprenderlo nel catalogo dei maki, perchè somiglia ad essi per le mani e pe' piedi, che sono quasi della medesima forma, ed altresì per la qualità del pelo, pel numero dei denti e pel muso acuto; ma indipendentemente dalla singolarità, che abbiamo accennata, e che lo distingue molto dai maki, ha pure degli attributi particolari. La testa è totalmente rotonda e il muso quasi a perpendicolo sulla stessa sfera; gli occhi sono eccessivamente grossi e vicinissimi in fra di loro; le orecchie larghe e rotonde sono munite al di dentro di tre orecchioni a foggia di piccola conca; ma ciò che è più rimarchevole ancora e forse unico si è, che la femmina orina colla clitoride, che è forata come la verga del maschio, e che queste due parti si rassomigliano perfettamente per la grandezza non meno che per la grossezza.

Il Sig. Linneo ha fatta una breve descrizione di questo animale (a) che ci è sem-

(a) *Statura sciuri, subferruginea, lineà dorsali subfusca: gula albidior linea longitudinalis oculis interjecta. Facies testà, auriculæ urceolatae, intus bifoliatae, pedum palmae plantaeque nude, ungues rotundati, indicum plantarum vero subulati. Cauda fere nulla, mammae 2. in pectore; 2. in abdomine versus pectus. Animal tardigradum, auditu excel-*

brata affatto conforme alla Natura; è pure
 ottimamente rappresentato nell' opera di Seba,
 ed a noi è sembrato lo stesso animale, di cui
 parla Thevenot ne' termini seguenti: „ Ho
 „ vedute nel Mogol delle scimie da un uomo
 „ portate da Ceylan, le quali si tenevano
 „ in gran pregio, perchè non erano più gros-
 „ se di un pugno, e perchè sono di una
 „ specie diversa dalle scimie ordinarie; han-
 „ no la fronte piatta, gli occhi rotondi,
 „ gialli e chiari come quelli di alcuni gatti:
 „ il muso loro è molto acuto, e la parte
 „ interna delle orecchie è gialla; non han-
 „ no coda quando io le ho osservate
 „ si tenevano ferme su i piedi di dietro, e
 „ sovente si abbracciavano: guardando fis-
 „ samente le persone senza corrucciarli (a).

lens, monogamum. Linn. *Syst. nat.* edit. X. pag. 30.

Nota. Questo animale non avendo coda, è duopo togliere da questa descrizione la parola *ferre*. Egli non pare che per le proporzioni del corpo, e delle membra sia lento a camminare o a saltare; ed io credo, che l'epiteto di *tardigradus* non gli sia stato dato da Seba, se non perchè si è immaginato di trovare in lui qualche somiglianza col pigro.

(a) *Vedi la Relazione di Thevenot, Tom. III. pag. 217.*

DESCRIZIONE

DEL LORIS.

IL loris [*tav. XXVIII., fig. 1.*] ha la testa rotonda, il naso sporgente, gli occhi grandi, le orecchie rotonde, il corpo lunghissimo e molto snello, il braccio, l'avau-braccio e la coscia sottili e allungati, la gamba grossa e lunga, e i piedi simili a quelli delle scimie. Il naso del loris, che ha servito di soggetto per questa descrizione, era sporgente in tutta la sua lunghezza, rispinto e rotondo all'estremità: le narici si trovavano situate da ciascun lato dell'estremità del naso: il labbro superiore era assai lungo e alquanto incavato nel mezzo; eravi un solco che dalla detta incavatura s'estendeva fino al naso. Gli occhi eran rotondi e poco l'un dall'altro distanti. Le orecchie eran larghe e situate molto basso; esse avevano nell'interno della loro conca tre orecchini in forma di piccole conche: due di essi si trovavano nel mezzo dell'orecchia, l'uno al disopra dell'altro, e il terzo vicino al suo orlo posteriore. Questo animale non aveva coda. I piedi eran grandi, massimamente que' di dietro [*tav. XXVIII., fig. 1.*]: ciascun d'essi aveva cinque diti; il pollice [A] dei piedi posteriori era a proporzione più lungo e più grosso dei diti, e allontanato all'infuori: tra questo primo dito e il secondo trovavasi un tu-

bercolo [B] formato dalla pianta dei piedi. Le ugne eran piatte, piccole e rotonde, eccettuata quella [C] del secondo dito dei piè di dietro, cioè del primo dito vicino al pollice: questo dito [D] era cortissimo, e la sua uña era al contrario molto lunga, curva e alquanto piegata in forma di doccia. Il quarto dito era il più lungo: il terzo e il quinto erano amendue egualmente lunghi.

Il pelo era finissimo e morbidissimo. Il contorno degli occhi era rossiccio o rosso, od anche rosso-castagno nel maschio. I lati della fronte, la sommità della testa, le orecchie, il disopra e i lati del collo, il garrot, le spalle, la faccia esterna del braccio e del gomito, il dorso, la groppa, i lati del corpo, la faccia esterna della coscia e della gamba erano di color rossicco, ma ciascun pelo non aveva questo colore che verso la punta; la sua radice era di color isabella o cenerino. Nel mezzo della fronte cravi una bianca macchia, che s'estendeva sul frontale tra gli occhi. L'estremità del muso, i lati della testa, la mascella inferiore e il disotto del collo avevano un color biancastro: il petto e il ventre eran mischiati di biancastro e di cenerino: la faccia interna del braccio, dell'avan-braccio, della coscia, della gamba e i piedi erano di color grigio tinto di biancastro o di gialliccio.

Il loris rassomiglia ai makis pe' denti, ma n'è diverso per tant' altri riguardi, che le differenze superano di molto le rassomiglianze: le principali

differenze consistono nella forma del muso , ch' è men grosso e men lungo di quello del makis , nella mancanza della coda , nella struttura delle parti della generazione della femmina , nelle coste , nelle vertebre lombari , ec. , che sono in maggior numero di quelle dei makis .

pied poll. lin.

Lunghezza del corpo intero , misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	o. 7. 6.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite ———	o. 1. 10.
Circonferenza dell' estremità del muso	o. 1. 8.
Circonferenza del muso presa sotto gli occhi —————	o. 2. 2.
Contorno dell' apertura della bocca —	o. 1. 1.
Distanza tra le due nari —————	o. o. 1 $\frac{3}{2}$
Distanza tra l' estremità del muso , e l' angolo anteriore dell' occhio —	o. o. 7.
Distanza tra l' angolo posteriore e l' orecchia —————	o. o. 6.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro —————	o. o. 4.
Apertura dell' occhio —————	o. o. 3.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi , seguendo la curvatura del frontale —————	o. o. 4.
La stessa distanza in linea retta. —	o. o. 3.
Circonferenza della testa , presa tra gli occhi e le orecchie —————	o. 3. 3.

pied. poll. lin.

Lunghezza delle orecchie —————	o.	o.	6.
Larghezza della base , misurata sulla curvatura esteriore —————	o.	o.	11.
Distanza tra le due orecchie , presa al basso —————	o.	1.	o.
Lunghezza del collo —————	o.	o.	7.
Circonferenza del collo —————	o.	2.	5.
Circonferenza del corpo , presa dietro le gambe anteriori —————	o.	4.	1.
Lunghezza dell' avan-braccio dal go- mito fino alla giuntura della mano	o.	2.	8.
Circonferenza della giuntura —————	o.	o.	8.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	o.	o.	11.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	o.	2.	10.
Lunghezza dal tallone fino all' estre- mità delle ugne —————	o.	1.	6.
Lunghezza delle ugne più grandi —	o.	o.	1 $\frac{1}{2}$
Larghezza della base dell' ugnà del pollice —————	o.	o.	1 $\frac{1}{2}$

Aprendosi l'addomine , ho veduto esser l' estre-
mità inferiore del fegato per contro le coste false ,
lo stomaco posto trasversalmente nella regione epi-
gastrica , e gl' intestini che non s' estendevano al
di là del mezzo dell' addomine . La matrice e le
altre parti della generazione occupavano l' altra
metà .

Il duodeno s' estendeva all' indietro nel lato fini-

stro fino al rene . I giri del digiuno erano nella regione ombelicale e nel lato sinistro ; e quelli dell' ileo eran pure nel lato sinistro sopra i giri del digiuno . Il cieco si trovava nella regione ombelicale sopra il digiuno , s' estendeva all' innanzi nel mezzo della regione ombelicale , e si ripiegava all' indietro contro lo stomaco prima di unirsi al retto .

Gl' intestini tenui avevano un piede e mezzo di lunghezza dal piloro fino al cieco , ch' era lungo un pollice e mezzo . Il colon e il retto presi insieme avevano sei pollici e mezzo di lunghezza ; onde il canale intestinale in intero , non compreso il cieco , era lungo due piedi e un mezzo pollice .

Tutti gl' intestini avevano presso a poco la medesima grossezza, eccettuato l' ileo [A, *tav. XXVIII.*, *fig. 2.*] ch' era il men grosso . Il cieco [BCD] era assai lungo e aveva minori ristignimenti che gli altri intestini .

Lo stomaco [*tav. XXVIII.*, *fig. 3.*] era di forma quasi ovale ; il suo fondo [A] aveva molta estensione ; la piccola curvatura [B] non formava quasi niente d' angole tra l' esofago [C] ed il piloro [D] .

Il fegato s' estendeva quasi tanto a sinistra , quanto a destra ; aveva quattro lobi , uno nel mezzo , uno a sinistra , e due a destra : quello di mezzo era il più grande , e aveva due scissure , che lo dividevano in tre parti : il legamento sospensorio passava nella scissura sinistra , e la vescichetta

del fiele si trovava nella destra. Il lobo sinistro era quasi egualmente grande che quello di mezzo. I due lobi destri erano più piccoli.

La milza era lunga e situata come nella maggior parte degli altri animali quadrupedi: aveva tre facce longitudinali, e la sua parte inferiore era molto più larga che la parte superiore.

Il rene destro era più inoltrato che il sinistro di tre quarti della sua lunghezza: essi avevano poca cavità.

Il polmone destro aveva quattro lobi, e il sinistro due, come nella maggior parte degli altri animali quadrupedi. Il cuore era quasi rotondo e diretto obliquamente a sinistra. Dall'arco dell'aorta uscivano tre rami.

Il palato era attraversato da sei larghi solchi: gli orli degli ultimi tre erano interrotti nel mezzo della loro lunghezza; e ciascuna delle loro parti era convessa all'innanzi. Anche gli orli del primo solco eran convessi all'innanzi.

Il cervello copriva il cervelletto quasi interamente. Il cervello aveva poche sinuosità, ma il cervelletto aveva le sue scanalature come quello degli altri quadrupedi.

I capezzoli eran grandi e al numero di quattro, situati sulla regione epigastrica, due da ciascun lato: le poppe eran gonfiate.

La verga [E, tav. XXVIII., fig. 1.] usciva fuori dell'addome tre linee di lunghezza, e aveva due linee di diametro. L'orifizio del prepuzio era

era a nove linee di distanza dall' ano . L' estremità della ghianda appariva all' ingresso del prepuzio . I testicoli [F G] si trovavano situati nei lombi allato alla vescica , il cui collo [H] era assai lungo . I canali deferenti [I K] avevano poca lunghezza .

Eránvi tre linee di distanza tra l' ano [A , tav. XXVIII. , fig. 4.] e la vulva [B] . La clitoride [C] usciva dall' estremità inferiore della vulva , ed era sì grossa , che sembrava occupare una parte della detta apertura ; aveva altrettanta e anche maggior grossezza che la verga del maschio , e altrettanta lunghezza fuori della vulva : la sua estremità era divisa in due piccoli rami e terminava con peli . Tra questi due rami ho trovato l' orifizio dell' uretra , poichè facendo entrar dell' aria nel detto orifizio , vi ho fatta gonfiar la vescica [D] . Fra tutti gli animali , ch' io ho anatomizzati , la femmina del loris è la sola , la cui uretra segue il corpo della clitoride , e fori la ghianda , come nella verga e nella ghianda de' maschi . L' uretra [E] era molto lunga , e la vagina [F G] anche più lunga : non eravi veruna comunicazione dall' una all' altra . I corni [H I] della matrice [K] erano molto corti . I testicoli [L L] avevano una forma ovale ; e le trombe [M M] erano molto apparenti . La vagina era lunghissima ; gli ossi delle anche avevano a proporzione maggior lunghezza che negli altri animali ; il catino aveva molta altezza , e l' uretra era assai lunga .

Essendosi aperta la vagina, vi si son trovate molte grinze in forma di piccole lamine longitudinali, che s'estendevano dalla vulva fino all'estremità del collo della matrice: il sito del suo orifizio non era distinto dalla vagina e dal collo della matrice che, per via d'un piccol ristagnimento pochissimo visibile. Nella stessa *figura 4.* si è rappresentato un rene [N], gli ureteri [OO], e una porzione [PQ] del retto.

La testa dello scheletro [*tav. XXVII., fig. 2.*] del loris è rimarchevole fra quelle di tutt'i quadrupedi, le cui ossa io ho vedute, per l'eccessiva grandezza delle orbite degli occhi, e per lo sporto degli ossi proprij del naso al dinanzi dell' orlo alveolare della mascella. Vi son tre coste ossee sul cranio, una trasversale sull' occipite, ed una longitudinale da ciascun lato della sommità della testa. Le orbite sono regolarmente rotonde; il loro orlo è continuato in tutta la loro circonferenza, sottilissimo e molto sporgente, fuorchè sulla mascella; sull' osso frontale forma un angolo quasi retto col resto del detto osso; al sito del naso le pareti delle orbite si toccano, e non son composte che d'una lamina ossea trasparente, che sembra non lasciar veruna comunicazione tra 'l naso e la fronte. Non ho veduto vestigio veruno di seni frontali. L' osso della guancia ha molta estensione; la maggior parte contribuisce a formare l' orlo sporgente dell' orbita. L' apofisi zigomatica ha parimente molta larghezza. Gli ossi proprij del naso sono assai lunghi; essi

si prolungano colla mascella due linee più all' innanzi che l'orlo alveolare , e formano nel loris un naso sporgente all' innanzi , che ha qualche relazione con quella del *requin* . Sul contorno dei rami della mascella vi ha una grande apofisi .

L'apofisi spinosa della seconda vertebra cervicale è molto più grande di quelle delle quattro vertebre seguenti .

Vi sono quindici vertebre dorsali , e quindici coste , nove vere e sei false . Lo sterno è composto di otto ossi , il primo ha la figura d'un triangolo quasi regolare , la cui base si trova all' innanzi . Le prime coste s'articolano colla parte anteriore del prim' osso dello sterno ; l'articolazione delle seconde coste è tra 'l primo e 'l second' osso ; quella delle terze coste tra 'l secondo e il terz' osso , e così in seguito fino alle ottave e none coste , che s'articolano colla parte anteriore dell' ottavo osso dello sterno .

Il loris ha nove vertebre lombari ; io non conosco verun altro animale , che ne abbia un sì gran numero : le loro apofisi sono assai corte .

L'osso sacro è molto stretto : esso m'è paruto composto di quattro false vertebre , e il coccige di cinque pezzi .

Gli ossi delle anche son quasi cilindrici nella maggior parte della loro lunghezza ; l'estremità anteriore è un po' più larga , e non s'estende che poco al dinanzi dell' osso sacro . Gli ossi pubi non toccansi l'un l'altro che col loro angolo , come

nell' uomo : il lor corpo forma un angolo quasi retto cogli ossi delle anche .

L' omoplata ha una figura triangolare ; il lato posteriore è molto più lungo dell' anteriore ; vi sono delle clavicole .

Gli ossi del braccio , dell' avan-braccio , della coscia e della gamba son quasi triangolari nella maggior parte della loro lunghezza : le loro apofisi e le loro tuberosità son piccole . L' osso del radio è il solo che abbia una sensibile curvatura .

M' è paruto che il carpo fosse composto di dieci ossi , come quello del mococo , e il tarso di sette .

Gli ossi dei quattro piedi han molta relazione con quelli delle scimmie , ma il pollice , il quarto e il quinto dito sono a proporzione più lunghi , cosicchè il quarto dito è il più lungo , e il secondo il più corto . Queste proporzioni son differentissime da quelle della mano dell' uomo .

I diti de' piedi posteriori son più lunghi di quelli de' piedi anteriori , ma hanno presso a poco le stesse lunghezze relative , eccettuato che il quinto dito è anche più lungo in paragone degli altri quattro .

pied. poll. lin.

Lunghezza dall' estremità degli ossi

propri del naso fino all' occipite — o. 1. 10.

La maggior larghezza della testa al

sito delle orbite ————— o. 1. 2.

Lunghezza della mascella inferiore

dalla sua estremità anteriore fino

pied. poll. lin.

all' orlo posteriore dell' apofisi con-			
diloidea	o.	1.	0 $\frac{1}{2}$
Groffezza della parte anteriore dell'			
osso della mascella superiore	o.	o.	3.
Larghezza della mascella superiore			
al sito de' denti canini	o.	o.	3 $\frac{1}{9}$
Distanza tra le orbite e l'apertura			
delle nari	o.	o.	5 $\frac{1}{3}$
Lunghezza della detta apertura	o.	o.	1 $\frac{1}{4}$
Larghezza	o.	o.	1.
Lunghezza degli ossi proprj del naso	o.	o.	5 $\frac{3}{4}$
Larghezza al sito più largo	o.	o.	1.
Larghezza delle orbite	o.	o.	7.
Altezza	o.	o.	7.
Lunghezza dei denti canini	o.	o.	2.
Larghezza del buco della prima ver-			
tebra dall' alto al basso	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza da un lato all' altro	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Altezza dell' apofisi spinosa della se-			
conda vertebra	o.	o.	0 $\frac{3}{4}$
Larghezza	o.	o.	1.
Lunghezza dello sterno	o.	1.	o.
Lunghezza del corpo della settima			
vertebra lombare, ch' è la più lunga	o.	o.	3.
Larghezza della parte superiore dell'			
osso dell' anca	o.	o.	9.
Lunghezza dell' osso dal mezzo della			
cavità cotiloidea fino al mezzo del			
lato superiore	o.	1.	1.

	pied. poll. lin.		
Lunghezza dei fori ovali	o.	o.	2 $\frac{1}{4}$
Larghezza	o.	o.	3.
Larghezza del catino	o.	o.	5.
Altezza	o.	o.	8.
Lunghezza dell' omoplata	o.	o.	9 $\frac{1}{2}$
Larghezza nel mezzo	o.	o.	6 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell' umero	o.	2.	0 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell' osso dell' ulna	o.	2.	5.
Lunghezza del radio	o.	2.	3.
Lunghezza del femore	o.	2.	7.
Lunghezza della tibia	o.	2.	5.
Lunghezza del peroneo	o.	2.	4.
Lunghezza del calcagno	o.	o.	4.



DESCRIZIONE
DELLA PARTE DEL GABINETTO
Spettante alla Storia Naturale
DEI MAKIS E DEL LORIS.

Num. MCCL.

Un mococo maschio.

Num. MCCLI.

Un mococo femmina.

Questi due animali son conservati nello spirito di vino.

Num. MCCLII.

Lo scheletro d'un mococo.

Questo è lo scheletro, che ha servito di soggetto per la descrizione e per le misure degli ossi del mococo.

Num. MCCLIII.

L'osso ioide d'un mococo.

Quest'osso ioide è composto di nove pezzi: i rami della forchetta sono a un di presso della medesima lunghezza che il pezzo di mezzo: i terzi ossi sono i più piccoli.

Num. MCCLIV.

Un mongoso.

Questa animale è nello spirito di vino, e rassomiglia all'individuo, che ha servito di soggetto per la descrizione del mongoso.

Num. MCCLV.

Lo scheletro d'un mongoso.

Questo è lo scheletro, che ha servito di soggetto per la descrizione degli ossi del mongoso.

Num. MCCLVI.

L'osso ioide d'un mongoso.

Questo osso è composto di nove pezzi, come quello del mococo.

Num. MCCLVII.

Una pelle di mongoso colla testa bianca.

A Questa pelle sono attaccati gli ossi della testa e dei piedi: essa è imbottita e rappresenta l'animale seduto, ch'è diverso dal mongoso riferito sotto il Num. MCCLIV., perchè ha bianchi i peli delle orecchie, dei lati e del disopra della testa.

Num. MCCLVIII.

Una pelle di mongoso co i piedi bianchi.

Questa pelle è in parte distrutta dall'antichità; nondimeno è imbottita, e sussiste tuttavia in guisa da far vedere che questo mongoso è diverso

dagli altri , perchè ha del pelo bianco sopra il muso e su i piedi .

Num. MCCLIX.

Una pelle di mongoso co i piedi fulvi .

IN questa pelle si son lasciati gli ossi della testa e dei piedi : è imbottita , e rappresenta l'animale nell'attitudine , ch'ei piglia quando si mette a sedere , e si serve de' suoi piedi anteriori per mangiare . E' diverso dagli altri mongosi , perchè ha il disopra e i lati del muso e della testa interamente neri , e i piedi di color fulvo .

Num. MCCLX.

Un piccol mongoso .

LA descrizione di questo piccol animale trovasi in seguito a quella del mongoso . Esso fu portato da Madagascar dal Sig. Poivre .

Num. MCCLXI.

Una pelle di vari .

Si son lasciati in questa pelle gli ossi della testa e dei piedi : essa è imbottita e preparata in guisa che rappresenta l'animale in una buona attitudine , e il bianco e il nero del suo pelo appajono in un contrasto molto visibile ,

Num. MCCLXII.

L'osso della verga d'un vari .

Quest'osso ha cinque linee e mezzo di lunghezza ; è più largo nel mezzo che alle due estremità , l'anteriore delle quali è adunca .

266 *Descriz. del Gabinetto.*

Num. MCCLXIII.

Un loris maschio.

Num. MCCLXIV.

Un loris femmina.

Quest' animale e il precedente son conservati nello spirito di vino, ed hanno servito di soggetto per la descrizione del loris.

Num. MCCLXV.

Lo scheletro d'un loris.

Questo è lo scheletro, che ha servito di soggetto per la descrizione e per le misure degli ossi del loris.

Num. MCCLXVI.

L'osso ioide d'un loris.

Quest' osso è composto di sette pezzi, e non se si sia interamente ossificato: in un soggetto più avanzato in età esso avrebbe forse avuti nove pezzi, come l'osso ioide dei makis.

Fine del Tomo XXVI.

INDICE.

<i>La Giraffa.</i>	pag. 3
<i>Il Lama e il Paso.</i>	20
<i>L'Unau e l' Ai.</i>	40
<i>Il Surikate.</i>	84
<i>Il Tarsiere.</i>	101
<i>Il Falangiere.</i>	106
<i>Il Coquallino.</i>	127
<i>L' Hamster.</i>	135
<i>Il Bobak e le altre Marmotte.</i>	161
<i>Le Gerboise.</i>	167
<i>L' Icnemone o sia Mangosta.</i>	177
<i>La Fossana.</i>	191
<i>Il Vanfiro.</i>	196
<i>I Maki.</i>	202
<i>Il Loris.</i>	248

Di M. de Buffon.

<i>Descrizione dell' Unau.</i>	57
<i>Descrizione dell' Ai.</i>	70
<i>Descrizione della parte del Gabinetto spettante alla Storia Naturale della Giraffa, dell' Unau e dell' Ai.</i>	78
<i>Descrizione del Surikate.</i>	87
<i>Descrizione del Tarsiere.</i>	104
<i>Descrizione del Falangiere.</i>	108
<i>Descrizione del Coquallino.</i>	129
<i>Descrizione della parte del Gabinetto spettante alla Storia Naturale del Surikate.</i>	21

<i>del Tarfiere , del Falangiere e del Co-</i> <i>quallino .</i>	132
<i>Descrizione dell' Hamster .</i>	145
<i>Descrizione del Bobak .</i>	165
<i>Descrizione dell' Icnemone o Mangosta .</i>	188
<i>Descrizione della Fossana .</i>	194
<i>Descrizione del Vansiro .</i>	198
<i>Descrizione della parte del Gabinetto , che</i> <i>ha rapporto alla Storia Naturale dell' Ham-</i> <i>ster , del Bobak , dell' Icnemone , della</i> <i>Fossana e del Vansiro .</i>	200
<i>Descrizione dei Makis .</i>	211
<i>Descrizione del Mococo .</i>	215
<i>Descrizione del Mongoso .</i>	223
<i>Descrizione del Vari .</i>	240
<i>Descrizione del Loris .</i>	251
<i>Descrizione della parte del Gabinetto spet-</i> <i>taute alla Storia Naturale dei Makis</i> <i>e del Loris .</i>	263

Di M. Daubenton .



T. UNAU

T. Viaro Scul.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 1.





Fig. 2.








Fig. 1.



Fig. 2.






Fig. 3.



Fig. 4.





LI AI PICCOLI


Ramifc.




LAI ADULTO

Ramifc.









Ram's sc.

IL SURICATE



11. 11. 7




II. TARSIERE


T. Viero inc.



IL FALANGIERE FEMMINA







IL FALANGIERE MASCHIO *T. Viero inc.*




Fig. 1.






Fig. 3.



Fig. 2.







Pencil.

L' HAMSTER




Fig. 1.



Fig. 2.







Fig. 2.





Fig. 1.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO





Ramiz sc.

L'ICNEUMONE



Fig. 1.






Fig. 2.



IL VANSIRO

Rossi sc.








IL MOCOCO


Ramus sc.














Kamufu

IL MONGOUS





IL LORIS

Ramus sc.




Fig. 2




Fig. 1.




Fig. 1.






Fig. 2.



Fig. 1



Fig. 2









Fig. 1




Fig. 2.

Fig. 4

Fig. 3





5790562



